








5 1.

12  
18  
2  
10









BERNHARDI VERZASCHÆ

Scholarchæ & Archiatri,

CENTVRIA PRIMA

Observationum Medicarum.

*Cui accesserunt*

CELEBERRIMORVM VIRORVM

consilia & epistolæ.

*Cum INDICIBVS necessariis.*



BASILEÆ

---

Typis JOHANNIS JACOBI DECKERI.

A. S. MDCC LXXVII.

Prostat AMSTERODAMI

apud HENRICVM WETSTENIVM

Bibliopolam.

U. C. M.

SERENISSIMO AC CELSISSIMO  
PRINCIPI AC DOMINO  
DOMINO

FRIDERICO MAGNO

MARCHIONI BADENSI  
ET HOCHBERGENSI  
LANDGRAVIO IN SAVSENBERG  
COMITI IN SPANHEIM  
ET EBERSTEIN  
DOMINO IN RÖTELEN  
BADENWEILER LAHR  
ET MAHLBERG &c.

DOMINO SVO CLEMENTISSIMO  
HANC OBSERVATION. MEDIC.  
CENTVRIAM PRIMAM  
HVMILIMA CVM OBSERVANTIA  
DEVOTISSIMOQ. OBSEQVIO  
INSCRIBIT ET OFFERT

BERNHARDVS VERZASCHA  
SENATOR BASILEENSIS.



SERENISSIME AC CEL-  
SISSIME PRINCEPS, DOMINE  
CLEMENTISSIME.



CTAVIVM CÆSA-  
REM AVGVSTVM,  
cùm ei quidam mo-  
dò exporrectâ manu  
modò retractâ libel-  
lum trepidus offerret, lepidè illum  
interrogavisse: *putasne te assem  
vel stipem elephanto exhibere?* re-  
ferunt *Macrobius & Suetonius.*  
Enimverò prudenter judicavit ju-  
diciosissimus OCTAVIVS, Marte  
invicto magnus CÆSAR, sed almâ

)\*( 2 pace

DEDICATIO.

---

pace major AUGUSTUS, nefandum esse flagitium, si ad Reges & Principes tanquam ad immites feras, siue elephantorum rectores atque domitores accedamus.

CORAM TE, SERENISSIME PRINCEPS, primam mearum observationum centuriam supplicis dextrâ offerendo intrepidus compareo, simulque felicia imperii auspicia, regimen gloriosum, vitam prolixam, magnitudinem Domûs perennitate florentem, & quæcunque imperantis fortunati Principis vota esse possunt, à Summo Cœli Terræque Monarchâ, cum unanimi Bonorum omnium applausu apprecor. Constantem hanc animi  
mei,

*D E D I C A T I O.*

---

mei firmitudinem persuasit gentili-  
tius FAMILIÆ TUÆ CELSISSIMÆ  
Favor, quem luculentis testimoniis  
comprobatum quotidie experior,  
& summisso devoti pectoris cultu  
deveneror. Quòd SERENISSI-  
MUS GENITOR TUUS, S. IMPE-  
RATORIÆ MAIESTATIS ET  
ROMANI IMPERII STATUUM  
SUPREMIUS CAMPI MARE-  
SCALLUS, irreparabili Totius  
Germaniæ damno cheu! nuper ter-  
ris exemptus, inter Archiatros suos  
me numerare dignatus fuerit, hoc  
unicum TUÆ SERENITATIS  
gratiæ debeo, Tuo enim instin-  
ctu, PRINCEPS OPTIME, nego-  
cium maturatum fuit, ut Proteo-  
rum

*DEDICATIO.*

---

rum, in quascunq̃ue fallacis Seculi  
formas sese mutantium, irriti cona-  
tus eliderentur, qui spartam Ar-  
chiatři dubiam mihi reddere vanis  
tentaminibus allaborarunt. Dum  
SERENISSIMUS PARENS, He-  
ros inclytus, inclinatis Romani  
Imperii Columnis atq̃ue labascenti  
Germanorum aureæ libertati auxi-  
lium certum fide facerrimâ non  
saltem offerret, sed & validissimè  
conferret, atq̃ue *Philippiburgum*,  
urbem naturâ, arte, milite, machi-  
nis validissimam, ab eo aggeribus  
cinctam, vallis obsessam, tormentis  
bellicis succussam, potentissimo  
etiam hoste vel castris admoliri  
non auso, victricibus armis expu-  
gnaret,



DEDICATIO.

---

gnaret , moderno IMPERATORI  
invictissimo , Rei Germanicæ post  
DEUM immortalem Statori unico,  
ac universo Orbi Teutonico de-  
monstravit , venerandam antiqui-  
tatem magna quidem nomina feræ  
posteritati commendavisse, sed æta-  
tem nostram nondum in effoetum  
Virtutum Heroicarum seculum in-  
cidisse , imò quod antiquæ tum  
Orientis tum Occidentis Heroum  
famæ sine cerussa opponere possit,  
in GENITORE TUO verè & fide-  
liter deprædicare : quippe in illo  
*Miltiadem & Timoleonta, Marcel-  
lum Romanum & Scipionem Afri-  
canum majorem, Camillum & The-  
mistoclem, Paulum Æmilium &*  
)\*( 4      *Epä-*

*D E D I C A T I O.*

---

*Epaminondam*, ac quicquid in maximis bellorum Ducibus prisca ætas suspexit, Germania afflicta, emissariis Momis frustra debachantibus, experta fuit.

Interim nec Tuæ Virtuti, SERENISSIME PRINCEPS, nec nominis immortalitati area defuit, utpote qui summam diligentiam noctes diesque adhibuisti, quò à truculenti hostis excursionibus, ferro & flammis cuncta devastantibus, Tuam ditionem liberares, sicque rebus admodum creperis prostratos Tuorum Subditorum animos ad meliorem spem erigeres. Hinc sæpius in mentem meam revoco, cum aliquando, CELSITUDINE  
TUA

*D E D I C A T I O.*

---

TUA præsente, consultum fuisset,  
in decumanâ hac Germaniæ rutubâ  
nil tutius nilque utilius esse, nisi ut  
STATIBUS PUBLICIS sibimet re-  
lictis, quilibet sua tantum commo-  
da curet, SERENITATEM TUAM  
respondisse, abominandum hoc  
consilium à rabulis & tenebrioni-  
bus approbari. Optimum Princi-  
pem non saltem sibi, sed etiam suis  
natum esse, ac honestum Reipubli-  
cæ civem omnibus privatis emolu-  
mentis publicam Patriæ salutem  
anteponere. O auream & Tanto  
Principe dignam vocem! Ita SE-  
RENISSIME PRINCEPS, tradux  
Heroum sanguis, MAIORUM  
TUORUM Virtutem, Famam, Glo-  
)\*( 5 riam

*D E D I C A T I O.*

---

riam, laudabili & memorando  
posteris exemplo imitaris. Hæ  
TIBI superandæ vel saltem susti-  
nendæ sunt. Magna Tuis oculis  
exempla domestica obversantur.  
Vix majora aut propiora aspicere  
TIBI contingit. Magnam spem  
sustines CELSISSIME PRINCEPS  
FRIDERICE MAGNE. Vndenih  
hil majus à TE expectandum, vel  
à DEO TRINO ET VNO calidissimis supplicationibus TIBI ap-  
precandum erit, quàm ut incom-  
parabili Virtute Tua, Pii, Felicis,  
Augusti Principis exemplar, Orbi  
Germanico ab hostis furibundi  
graffationibus liberato & optuma  
rerum

DEDICATIO.

rerum pace redonato, ad Nesto-  
reos annos repræsentare possis.  
Cum quo voto finio, .

*Perſcriptum Baſilee d. X. Martii,  
A. S. clo lcc LXXVII.*



LECTORI CANDIDO  
SALVTEM

**Q**Uod in edendâ observationũ  
Medicarum centuriâ primâ,  
Lector benevole, Tibilentũ nomen  
appareo, illud sanè gravioribus  
causis atq̃ fatalibus remoris adscri-  
bendum est. Institutum meum sus-  
flaminarunt dira pestis & epidemi-  
ca febris maligna, Patriæ dilectissi-  
mæ nuper infesta; industriæ obste-  
runt concatenata egrotorum avo-  
cationes & suscepta pro illorum sa-  
lute ad diversos Principes, Nobiles,  
Exteros itinera, imò omnem ferè  
spem surripuit librorum edendo-  
rum interstitio, cùm apud Germa-  
nos tristissimis istis temporibus, non  
amplius atramento, sed sanguine  
humano

P R Æ F A T I O.

---

humano scribatur, & publicus luctus, quem universalis calamitas Germaniæ candidis animis impressit, proh dolor! utramq; paginam absolvat.

Quia tamen à Viris excellentissimis, summis Seculi nostri Medicis, inchoata scriptionis continuatio repetitis vicibus desiderata & sæpius efflagitata fuit, ne malum nomen proclamarer, qui lentum me fuisse confiteor, denuo operi manum admovi, & favente Divini Numinis gratiâ, hanc primam observationum mearum centuriam ad finem perduxi. In hac, Lector candide, indefessum meum de familiâ Asclepiadeâ benè merendi studium ac laborem in primis cognosces, hoc unicum enim intendi, ut junioribus  
Medi-

## P R Æ F A T I O.

---

*Medicina Doctoribus via commoda porro monstretur, cui in praxi medicâ cum crescente nominis famâ insistere possint; hinc etiam reliquas remediorum formulas utiliores, quas post editum Riverium meum contractum sive medicine practica compendium, consilia & epistola praecellentium ævi nostri Medîcorum in lucem emissa mihi suppeditarunt, aut experientia rerum magistra apud agrotos confirmavit, centuriæ huic inserere necessarium duxi. Horum Virorum doctrinam raram & judicium acre promeritis laudibus extuli, nec ullius nomen ac famam temerè lacesivi. Interim ut salva mea esset innocentia & candor conscientia illibatus, discrepandum alicubi fuit*  
*à Viris*



## P R Æ F A T I O.

---

*à Viris quibusdam clarissimis, quorum merita non saltem agnosco, sed etiam veneror, hoc ipsum tamen cum debitâ honoris præfatione præstitum est, adductis simul rationibus, quibus omnem dissentiendi pruritus à me longius removeo. Convitia non Medicos sed mediastinos decent. DEUS pacis & concordie Autor homines ratione ac judicio, bestias rostro & unguibus armavit, ut quod istæ dilaniando ac lacerando exequuntur, illi ratiocinando & iudicando sine morsu perficere deberent. Vale feliciter Lector candide & studiis meis bono publico dicatis favere perge.*

Ad

\*\*\*\*\*

Ad

*VIRVM Ampliſſ. & Excellentiff.*

DN. BERNARDVM VERZASCHAM,  
Reip. Baſil. Senatorem, Scholarcham,  
Archiatrum meritiſſ. &c.

primam obſervat. Medicarum centuriam  
edentem,

*Epigramma.*

Ἦ δαῖδον βροτῶν γένος, ὅτ' ἀπερίστια ἔσαν  
Τείρε' κείνο γένος πανδοκῆς βασιλείαις.  
Δεῖ γὰρ ἀμπετέρῳ πῶλον εἰς ᾧδόμενα, κτερ,  
Σαῖο ἀλίζοντο, φέρτατε, πῆμα τόσον.

VER S I O.

**S**i miſerum mortale genus, quodd maxima turba  
Morborum excruciet tormine id omnigeno.  
O nos felices! queis, Te, Vir Maxime, damnum  
Propulſante, iſthinc noxia turba fugit.

obſ. m. p.

JOH. RODOLPHVS WETSTENIVS, FIL.  
Oratoriæ Prof. Baſil.



# BERNHARDI VERZASCHÆ Observationes Medicæ.



## OBSERVATIO I.

### *Cœliaca Passio cum Ischuria Singulari.*



JOHANNES PAVLI, Vir  
quingenta octo annorum,  
Serenissimi Principis FRI-  
DERICI Marchionis Ba-  
densis, &c. Cellissimi in glo-  
riam Germaniæ Principum  
Herois, Domini mei clemen-

tissimi, &c. *Præfatus Saufenburgensis & Rötelsis*, po-  
steaquam per aliquot annos cruciatibus arthriti-  
cis oppressus decubisset, ut tandem macies cor-  
poris universa obitum minitaretur, subito in cœ-  
liacam passionem incidit.

Ad illum vocatus observavi excrementa liqui-  
da, inæqualia, semi-chylosa: accessit admiran-  
dum symptoma suppressio urinæ: tetigi ve-  
sicam urinâ plenam, nec ullum calculi signum  
animadverti. Primo & secundo die sequentia re-  
media usurpavit. *R. amygdal. dulc. recent. excori. ʒss.*  
*sem. cucum. & melon. recent. excori. ʒ. ʒij. papav. alb. ʒij. aq.*

A

fragar.

fragar. malva ā. ℥iij. fiat emulsio pro duabus dosibus. ℞. Aq. malva. fragar. ā. ℥iβ. syr. althea Fernelij, corallor. ā. ℥j. fiat julepus pro una dosi. ℞. ol. nucistæ express. ℥ij menth. nardin. ā. ℥iij. cera q. s. fiat linimentum abdominis tepidè usurpandum. noctu sumpsit granum dimidium laudani opiatum, cujus compositionem in River. contr. libr. X. cap. VI. proposui: Tertio die jussi sequentem clysterem injiccre. ℞. herb. violar. malva heder. terrestr. alth. ā. Mj. flor. sambuci melilot. ā. Pj. sem. anisi ℥ij incisa bulliant parum in lacte, in colat. ℥x. solve mell. violar. rosar ā. ℥iβ. F. clyster. Regioni vesicæ sequentes sacculi alternatim imponebantur. ℞. herbar. 4. emollient. ā. Mij. veronic. Mj. flor. sambuci Pij. sem. lini ℥j. incisa dentur ad sacculos duos lacti incoquendos. eodem die prædictam emulsionem & julepum etiam usurpavit, unde urinam in parva quantitate reddidit, quæ tamen mox rursus supprimebatur. Ad virium robur conservandum seq. aqua cardiaca usus fuit. ℞. aq. cardiaca. in exercitat. de apoplex. §. XI. descripta, melissa, fragar. fl. tilia. ā. ℥j. cinnam. ℥ij. julep. rosati, syr. citri, ā. ℥β. confect. alkerm. ℥j. Misce. Die quarto lethargus supervenit, qui illum quinto die sub vespèram accedentibus lipothymiis è medio sustulit. Mirandam hancce ischuriam ab obtuso vesicæ sensu ortum traxisse, nullus dubitavi, nervos enim vesica in collo ab osse sacro & in corpore à nervo sexti paris recipit, hos si stupor occupet, sensum vesica amittit, nec irritamento rei molestæ afficitur, sicque urinam retinet.

Scio mihi contrarium esse Fernelium lib. VI. de part. morb. & symptom. cap. XIII. cujus hæc sunt verba. Ischuria causam Galenus plerumq. refundit in obtusum

sum vesicæ sensum, ob quem illa se impleri non sentit, nec idcirco ad excretionem irritatur. At certè urina quamdiu patentem liberamq; viam habet (ut in iis, qui ob calculum facti sunt) nullo propellente aut excernente prolabitur, & suo pte impetu foras excidit: una igitur suppressæ urina causa est adstrictio vel obstructio. Sed respondeo I. Falsum est Galenum Ischuriæ causam PLERVNQVE in obtusum vesicæ sensum refundere. contrarium patet ex lib. VI. de loc. affect. cap. IV. Συγκάλει δὲ ὀυρὰν ὀνείας τῆς αὐτοῦς γλῆσσος πρὸς ἐντρίσιον ὅρον. accidit propter labefactatum sensum vesicæ, ut urina retentio ALIQUANDO contingat. II. Rectè asserit Amplissimus Beverovicus lib. de calcul. ren. & vesic. cap. II. quod hujus controversiæ solutio pendeat à facultate, qua functiones suas vesicæ expedit; h. e. urinam retinet ac expellit: utraque partim naturalis, partim animalis, quod & Galenus prædicto loco profiteatur. Naturalis est, quatenus urina in vesicæ fundo obliquarum fibrarum ministerio retinetur, & ad exclusionem rei molestæ ac irritantis stimulo vesicæ sensu expellitur. Animalis est, quatenus pro voluntatis arbitrio sphincteris muscoli beneficio sistitur, & ope musculorum abdominis urina excernitur, hinc modo tardius modo celerius ad arbitrium nostrum urina redditur aut cohibetur, quod si sponte & suo pte impetu foras excideret, quando via patens & libera est; in homine sano indefinenter efflueret.

Ast objicitur: in hominibus sanis meatus clauditur à musculo sphinctere, qui à natura conditus est, ut ductui urinario tanquam præfectus exitum occluderet, ne quoties aut copia aut prava quali-

tate homines gravat, præter voluntatem urina exiliret. Sed an non hoc indicat? à sensu hanc functionem dependere: adde, quod in ægris, licet nulla adsit aut adstrictio vel obstructio, quas unicas ischuriæ causas *Fernelius* ponit, urina tamen spontè non effluit, sed arbitrio eorum vel cohibetur vel excernitur. Quod de calculosis affertur, parum ad rem facit: nam cum in iis dissectus sit musculus spincter, retinendi facultate impedita per apertum & declive vulnus urina sponte elabitur, nec penitus tamen cessat animalis facultas, fibræ vesicæ & sphincteris ab urinæ acrimonia stimulis ac proinde excretionem juvantibus.

Unde nequaquam dubitandum, in amplissimo hoc Præfecto (cujus viscerum principaliorum functiones jam à multis annis debilitatæ erant) vesicæ sensum adeo labefactatum fuisse, ut ipsa velut stupore affecta urinam reddere non potuerit.



## OBSERVATIO II.

*Rara Urinæ Suppressio.*

**M**ERCATOR celebris omnimodam urinæ suppressionem inopinatò passus fuit, quæ raro exemplo usque ad diem vigesimum primum duravit, ita ut toto temporis tractu vix aliquot urinæ guttas reddiderit. Cum Affinis Medicus suus ordinarius D. *Felix Platerus* Senator & Archiater meritissimus tunc temporis decubisset ex erysipellate, statim à principio morbi me vocavit.

vocavit. Præmisso examine, quoniam æger de insigni dolore circa ductum ureteris sinistri vomituque enormi conquerebatur, adstantibus prædixi, calculum in uretere sinistro hære, & urinæ viam occludere. Sed quærebant, cur serum à rene dextro per ureterem in vesicam non prolabatur? unde æger urinam reddere possit: liberè illis respondi, hoc per consensum fieri, nam licet non SEMPER tamen SÆPIVS uno rene obstructo alterum officio suo fungi non posse. Primo die ad vesperam sequentia præscripsi. *Rx. amygdal. dulc. recent. excortic. ʒiij. semin. cucum. melon. rec. excortic. ā. ʒij. papav. alb. ʒj. aq. fragor. ʒij. malua, veronica, ā. ʒiʒ. sacch. ros. tab. ʒij. F. emulsio pro duabus dosibus. Rx. rad. acetos. ʒʒ. fragar. ʒij. liquir. ras. ʒj. C. C. usli ʒiij. incisa coq. in aq. font. ad mensur. duas colat. detur pro potu ordinario. Rx. Syr. corallor. citri, ā. ʒiʒ. granator. ʒj. spir. sulphur. gt. x. misce. cum cyatho prædicti decocti aliquot cochlearia horum syruporum plena æger commiscuit, & ordinariè bibit, vinum enim propter insignem renum calorem & imminentes podagricos dolores ipsi interdictum fuit. Secundo die ob summam vomitus molestiam & virium dejectionem sequentia remedia ordinavi: *Rx. conserv. rosar. rubr. ʒj. borragin. roob ribium ā. ʒʒ. cort. citri cond. ʒij. confect. alchem. hyacinth. ā. ʒj. syr. corallor. q. s. F. mixtura, de qua pro lubitu quantitas nucista sumatur. Rx. ol. nucista express. ʒiʒ. still. arantior. macis, ā. ʒʒ. F. balsamum, quo superius orificium ventriculi illinatur. Tertio die Æger balneo emolliente tepido aliquoties utebatur, è cujus egressu locus renum convenienti linimento inunctus & elyster injectus fuit: *Rx. rad. alth. ʒij. lilior. alb. ʒj.***

*herb. 4. emollient. ā. Mij. flor. sambuc. Pij. sem. lini ʒiβ. incisa-*  
*dentur ad usum balnei. R. Vnguent. rosat. ʒβ. santal. ʒij.*  
*ol. nymph. q. s. F. linimentum. R. rad. ononid. ʒj. herb. he-*  
*der. terrestr. betonic. veron. parietar. ā. Mj. fl. sambuci Pi.*  
*sem. lini ʒβ. coq. in aq. font. q. s. in colat. ʒx. solve electuar.*  
*lenit. ʒj. benedict. laxat. ʒβ. mell. rorismar. ol. chamem.*  
*ā. ʒj. F. clyster. Quarto die consului, ut Ager mane &*  
*vesperi de spiritu terebinthinæ in cochleari aqua*  
*fragorum pleno aliquot guttulas sumat, balneo &*  
*clystere utatur. Quinto die sequentem potiunc-*  
*ulam duabus vicibus sumendam præscripsi.*  
*R. aq. fragor. heder. terrestr. ā. ʒij. sal. fabar. ononid. ā. ʒβ.*  
*tartar. vitriol. gr. vj. misce. Sexto die balneum & clyf-*  
*ma repetita fuerunt. Septimo die sequentem ju-*  
*lepum consului. R. Aq. fragor. ononid. ā. ʒij. syr. alth. F.*  
*citri ā. ʒj. F. julepus pro duabus dosibus. Octavo die, quo-*  
*niam alvus fuerat adstricta, & abdomen serosis*  
*humoribus repletum, sequente syrupo commodè*  
*usus fuit. R. syr. flor. persicor. ʒij. aq. fragar. ʒj. F. po-*  
*tiuncula cum regimine diata sumenda. Nono die jule-*  
*pum quinto die præscriptum sumpsit. Decimo &*  
*undecimo balneum & clysterem prædictum usur-*  
*pavit. Duodecimo die, quum vires deficere inci-*  
*perent, cardiacum præscripsi. R. aq. cardiac. officin.*  
*fragor. meliss. ā. ʒj. sacch. rosat. tab. ʒij. margarit. prepar.*  
*ʒj. F. cardiacum. Decimo tertio, quarto, quinto,*  
*sexto & septimo, balneum, julepos & clysteres*  
*prædictos usurpavit. Decimo octavo post ejectum*  
*clyisma sequentem julepum sumpsit. R. Aq. fragor.*  
*ʒj. fl. tilie, borragin. ā. ʒj. syr. granator. citri. ā. ʒj. julep. rosat.*  
*ʒij. F. julepus pro duabus dosibus. Decimo nono rursus*  
*clyster injectus fuit. Vigesimo die ob metum con-*  
*vulsio-*



vulsionum aquam meam epilepticam cum cardica officinali mixtam præscripsi, quam in *exercit. de apoplex. §. XII.* proposui. Die vigesimo primo fortissimum animi deliquium me præsentē Ægrum invasit & vitæ finem imposuit.

Interim Cognati fide digni mihi retulerunt, prædictam de renum sympathia sententiam *non-nemini* displicuisse, affirmanti absurdum esse, rene uno obstructo alterum in reddenda urina inutilem fieri, forsan quia Clarissimus Vir D. *Casparus Bauhinus lib. I. theatr. anatomici cap. XXII.* scripsit: rene uno obturato seri tamen attractio & profusio non cessat: aut quoniam *Fernelius lib. VI. de part. morb. & symptom. cap. XIII.* aurem vellicabat, inquiens: *si alterius duntaxat ureteris via obstructa est, haud quaquam supprimitur urina, per alterum enim perlabitur.*

Hinc propter manifestam judiciorum discrepantiam Uxor & Cognati ex ultima Mariti petitione me rogarunt, ut cadaver aperiretur, quod Dn. *Francisco Platero, Magni Felicis Plateri Filio, Medicinæ Doctori meritissimo, & Samuele Braunio Chirurgus exercitato* præsentibus factum fuit. Invenimus viscera infimi ventris principaliora, ventriculum, hepar & lienem à naturali statu nequaquam deflectentia: ren sinister distensus ab humoribus serosis stupenda magnitudine apparuit, quo dissecto serum abundanter effluxit, & arenulæ copiosæ rubicundissimæ se manifestarunt, calculum autem semen cucumeris referentem in principio ureteris reperimus: ex sero putrescente ren foetorem dextro illæso & sano contrahere incepit. Aperto thorace mox fluctuans in cavitate  
seru m

serum se nobis obtulit, quod tamen pulmonibus & cordi nullam labem intulit, sic ut nequaquam dubitandum, saltem uno aut altero ante obitum die (quo Æger de imminente suffocatione anxius conquerebatur) serum in cavitatem thoracis regurgitasse, ubi hydropem pectoris brevi produxisset, nisi inopinata lipothymia Ægrum è medio sustulisset.

Quam iniquè autem meam de renum sympathia sententiam ut absurdam nonnemo traduxerit, & quod alii Medici exercitatissimi ante me idem observarint, necessarium duco, hoc illis, qui Viri Clarissimi effata tanquam Apollinis oracula venerantur, testimoniis omni exceptione maioribus demonstrare. Magnus Ævi nostri Anatomicus Joannes Riolanus lib. II. anthropogr. cap. XXVI. testatur: NON SEMEL observavi monitus à Foresto, uno rene obstructo alterum inutilem & vietum reddi, propriâq; actione destitutum urina fluxum intercipere: quæ verba, quasi Foresti essent, cum Riolani sint, ipsemet D. Bauhinus in margine dicti loci apposuit. Amplissimus Johannes Beverovicus, Dordracenus Senator & Medicus, in libro singulari de calculo renum cap. I. se IDEM vidisse profitetur. Vir Excellentissimus Johannes Löselius Regiomontanus Anatomicus in scrutinio renum artic. I l. §. IV. asserit: uno rene obstructo vicinus ob sympathiam HÆRD RARO inutilis redditur, lotiumq; vel stillatim egeritur vel P R O R S V S supprimitur. Celeberrimus Dominicus de Marchettis, Professor Patavinus, in sua anatomia cap. V. affirmat: laeso uno rene, ut alter officium præstet, VIX contingere potest, propter M V-  
T V V M inter se consensum, & affectus enim unius alteri FA-

CILÆ communicatur. Quapropter Magnifici Viri  
*Johannis Jonstoni* verbis concludo, quæ in notis  
 eruditissimis ad titul. XXXIV. COACAR. pranotion  
 D LXXXIX. reperiuntur. SYMPATHIÆ renum  
 in officii societate MAGNA VIS est.



## OBSERVATIO III.

*Vagitus Uterinus.*

**H**Onesta Fœmina, annos triginta quatuor  
 nata, ultimo graviditatis mense, cum ma-  
 ne è lecto surgeret, fœtum in utero vagire  
 audivit, quod etiam adstans Maritus animadver-  
 tit. Hi maximo perculsi terrore statim me voca-  
 runt, uxorque insigniter perterrefacta profusis la-  
 crymis enarravit, quàm triste sibi omen acciderit:  
 Jussi illam esse erecto animo, cum etiam aliæ Fœ-  
 minæ gravidæ ejulatum uterinum sine ullo augu-  
 rio sinistro expertæ sint. Tandem meis acquievit  
 monitis, & post quatuordecim dies absque ullis  
 portentis, quod vana pertimiscebat, indiciis pue-  
 rum feliciter in lucem edidit.

Recensui hanc historiam Avia: meæ honoratis-  
 simæ, quæ octuagenaria & antiquæ Fidei Matrona  
 plurimis parturientibus fœminis auxiliatrice ma-  
 nu feliciter adstitit, illa mihi retulit, aliquot fœmi-  
 nas sibi de vagitu uterino conquestas fuisse, quæ  
 tamen singulæ fortunatim infantes enixæ sint.

Sic Princeps Eruditorum *Claudius Salmasius* ad

A § inter.

interpretationem *sect. IV. aphor. LXXIX. p. m. 198.* refert nobilem fœminam *Lugduno-Batavam* narrasse, fratris sui uxorem instante partitudinis tempore vagitum infantis in utero audivisse, & obstupefactam excitasse accubantem Virum dormientem, qui ejulatum percepit, sed nihilominus illa feliciter peperit. Ita Amplissimus *Antonius Deusingius* in dissertatione *de generatione fœtus in utero part. III. sect. I. §. XLIX.* recitat, quod *D. Monæus* Collega, dum adhuc in vivis esset, ipsi retulerit, suam uxorem infantis in utero ploratum audivisse, idemque Uxori *D. Salmuthi & Grænevolti* accidisse. Illustri Fœminæ contigit in cœnaculo post epulas unâ cum Marito & Sacellano domestico aliisque sedenti, sentire insignem in ventre commotionem, quæ vestes adeo concussit, ut ab astantibus cerne-  
retur (gravida tum erat & octavo mense fœtum gestavit) subitò vox audita est, cujus originem, unde venerat (de embryone nil suspicati) conjicere non poterant: mox tamen & secundò perturbari insigniter Matronæ ventrem & vestes conspiciunt, ac simul clamorem tanquam inde provenientem audiunt: dum hæc mirantur & invicem de portento conferunt, tertio eadem omnia eveniunt tam clarè, ut attentiores jam facti eum ex utero provenire non dubitarent: vivit etiamnum puella illa in materno utero loquax, vitaque satis salubri fruitur, uti Vir experientissimus *Gualterus Needham* Medicus *Anglus* in eleganti sua disquisitione anatomica de *formato fœtu cap. III* perhibet.

CHRISTIANI Secundi, Regis *Danorum*, vagitum

gitum in utero materno editum ex Annalibus *Danicis* recenset Flos Medicorum illibatus & Suadæ medulla, *Thomas Bartholinus cent. I. histor. anatom. rarior. I.* unde ex accuratissimo Tanti Viri judicio superstitiosi sunt illi, qui propter ejulatum uterinum utpote à causis naturalibus ortum Rebus publicis malè ominantur: non vagitus sed pessimi mortalium mores & Divorum contemptus Civitatem evertunt: Vagientes & sibi & Marri & Reipublicæ subinde felicia portendunt: Sibi, quia robur indicant, & perfectas ad partum accelerandum partes doloresque judicandos. Matrem bonæ spei esse plenam jubet vagitus, vivere foetum & ad promovendum partum sic satis esse validum: Reipublicæ & Principi fausta est acclamatio, nam ille vagiens apud *Livium* Io triumphale cecinisse fertur. Quod si augurio sinistro auditi nonnunquam sint vagitus, casui potius adscribendum quàm consilio naturæ: emendentur in melius mores, Sponsore *Bartholino* nulli vagitus nocebunt.



## OBSERVATIO IV.

*Ascitis Tympanitica.*

**E**minæ quadraginta annorum abdomen stupendum in modum ex ascite tympanitica intumuit: convenientia remedia in *River, contract. lib. XI. cap. VI.* proposita (quorum ope

ope plures ab hoc morbo liberavi) diligenter usurpavit, sed malum cessare noluit, hinc ob metum suffocationis me aliquoties per omnia sacra rogavit, ut tumorem umbilici vesiculæ ad instar pellucidum compunctione aperirem. Respondi, hanc medendi methodum me non magnificare, illamque incassum esse, si viscera corrupta sint. Tandem precibus adstantium urgentissimis victus, cultello acuto vesiculam aperui, & spacio duodecim dierum octodecim mensuras aquæ sensim eduxi; at decimo tertio die cum accessissem, subitanea lipothymia ægrotam è medio sustulit: posteaquam observarim, abdomen ex emissionem feri non multum detumuisse, hinc illud præsentem Matre & Sorore aperui; mox serum in tanta copia effluxit, ut triginta mensuras superaret, in super etiam intestina corrupta, hepar & lien scirrhum reperi.

Quod autem paracentesin parvi æstimem, causa est præcipua, quoniam ab illa licet exactè administrata vix ac ne vix centesimus evadit, præsertim cum ægri demum morbo diutius protracto illam desiderent, quando videlicet contaminata viscera spem vetant inchoare longam. Nonnulli contendunt, apertionem esse faciendam in principio morbi, antequam viscera insignem labem contraxerint, sed tunc illam non summè necessariam esse judico, quum isto tempore tutioribus remediis morbus profligari possit. Perpendant paracenteseos Patroni judicium, quod *Nicolaus Tulpus magnificus Consul Ambsterodamensis, lib. II. observation. medic. cap. XXXIIX. de apertione umbilici protulit. Dissectio ventris hydropici, quam Græci*

*παραλυσιν* vocant, antiquum quidem est remedium sed admodum anceps, displicuit id olim *Erasistrato*, neque etiamnum placet omnibus, utpote raro utile & sæpe noxium, damnum autem ipsius ut irreparabile, sic auxilium erit infidum, quippe non tam curat, quàm curationi viam facit, ex hauriendo magis aquam quàm ipsum fontem. Quocirca facilius invenies manum secantis, quàm verum vel ordinem vel secandi tempus, ne dum exactam educendi humoris copiam, quæ tamen nisi convenerit ad amissim cum viribus ab infido morbo labefactatis, necesse est perire, quisquis vitam suam tam ancipiti aleæ commiserit, in qua tam fortuitum est vincere quàm necesse perdere. Sed dicat quis? neminem ex artis lege secare, nisi prius de virium robore ac viscerum integritate constet: sed cui viscera valida & vires illæ sæ, cum raro aqua inter cutem affligit, vel etsi affligat, plerumque tantum temporis in medicamentis per alvum educentibus consumitur, ut vix de scalpello cogitetur, nisi ubi jam viscera præ morbi longitudine vitiata sint. Quod remedium propterea serius adhibitum magis mortem maturat quàm differt: effluens namque humor quantum hydropici corporis debilem calorem imminuit, tantum quoque spiritus plus nimis evanidos dissipat: Imò quo celerius aqua à sectione profluit, eò citius vitæ alias diutius forsan duraturæ filum abrumptur. Paupercula ascite laborans, judicata plurium Medicorum calculis satisfereudo sectioni ventris, admisit Chirurgum abundè circumspectum, à quo licet vitaretur ritè tendinum concursus, neque

emitte-

emitteretur plus aquæ, quàm par erat, nequirit tamen ipsa sospes evadere; sed accensa graviore febre, sive ex motu sive ob aquameductam, incidit postridie ejus diei in sudorem prius quidem calidum sed mox frigidum, & ex eo haud diu post in ipsam mortem.

Concludo verbis *Simonis Pauli*, *Regii Medici Dani* celeberrimi, *quadripart. botan. class. sec. p. m. 162.* Sanctè testari possum (in gratiam Medicinæ Candidatorum praxin auspicantium hæc addo) me non recordari ullum unquam hydropicorum his in oris servatum, quibus paracentesis imperata fuit.



## OBSERVATIO V.

*Bubonocela.*

**M**ercatoris Servus ex gravioris sarcinæ portatu in sinistro inguine bubonocelen passus fuit, hanc pudore suffusus cum nemini manifestaret, illa tandem in abscessum degeneravit: unde vocavit me Herus; qui fidelitatem servi commendans petiit, ut ipsi succurrerem: accersito Chirurgo jussi emplastrum contra rupturam applicare, insuperque sequentem potionem vulnerariam præscripsi. *℞. radic. tormentill. consolid. maj. bistort. ā. ʒss. herb. sanicula, pyrola, alchimil. agrimon. ā. Mj. flor. rosar. rubr. papav. rhead. granator. ā. Pij. sem. anisi. ʒiʒ. incisa & contusa dentur ad sacculum ex sindone albo, cui dua mensura vini albi mediocris & una aqua fontana affundan-*



affundantur, ac mane & vespere cyathus plenus bibatur. Inde vulnus consolidatum fuit, & servus iste convenienti subligaculo utens munia consueta sine insigni impedimento rursus subire potuit.



## OBSERVATIO. VI.

*Vermiculus Cerebri.*

**C**um Delemontum superioribus annis ad *Canonicum* Literatum febre quartana laborantem vocatus essem, Civis *Delemontanus* annorum quinquaginta me invisit, qui de acutissima cephalæa per duos annos durante conquestus fuit: inveni illum ἀπύρετος sine febre, dolorem pungentem, stabilem, ad processus mammillares vergentem incusavit, unde sæpius sternutabat. Præscripsi pro curationis principio sequentem sacculum. ℞. rad. scorzonæ. ℥iij. cort. tamar. ℥ij. herb. betonic. verben. ā. M℞ cichor. major. ā. Pi. summit. centaur. min. absinth. ā. Ps. folior. fenn. el. ℥iij. rad. helleb. nigr. pp. ℥iij. cremor. tart. ℥iij. sem. anisi ℥iij. coriandr. pp. ℥iij. incisa & contusa dentur ad sacculum ex sindone albo, cui mensura vini albi veteris affundatur, de qua alternis diebus mane ℥vj. cum regimine diata sumantur. Finito hujus vini potu sequens apozema purgans etiam bono cum levamine bibit. ℞. rad. pœon. ℥j. herb. betonic. verben. borragin. fragar. ā. M℞. coq. in aq. fontan. q.s. in colat. ℥iij. infunde per noctem folior. fenn. elect. ℥ij. rad. helleb. nigr. pp. ℥j. sem. anisi ℥iij. mane bulliant par. in colat. solve syr. betonic. & flor.

& flor. persicor. ʒ. ʒiſs. aq. cinnam. ʒj. F. s. a. apozema, de quo alternis diebus ʒiij. cum regimine diata ſumantur. Ex uſu horum remediorum dolor mitigatus fuit, ſed me per literas monuit, ſe circa proceſſus mammillares dolorem acutum cum pruritu narium & ſternutationis conatu percipere, hinc pulverem ſternutatorium ſequentem præſcripſi. R. Flor. lilior. convall. betonic. major. ʒ. ʒj. ambr. griſ. moſchi oriental. ʒ. gr. j. F. pulvis ſubtiliſſimus: hunc dum per aliquot dies uſurpaſſet, vermiculum cum magna portione mu- ci inopinatè emunxit, & ſic dolor circa proceſſus mammillares, pruritus narium & ſternutationis conatus deſiit.

Quoniam vermiculus iſte cum muco excretus fuit, illum in cerebro genitum fuiſſe, nullus dubitavi, nam in hac putreſcentis pituitæ officina vermes generari, teſtimoniis magnorum Virorum comprobabo. Admirationem ſuperat Lutetiana puella, in vico Delphino annorum XII. cui curatis variolis tantus capitis dolor diuturnuſque ſuper- venit, ut tribus menſibus nec dormire, nec requieſcere nullas dolore inducias concedente potuerit: tandem cum tabida obiiſſet, ſtatim aperto cranio præſentes Medici totam cerebelli ſubſtantiam, qua ad dextrum vergit, à reliquo corpore ſejunctam nigraque tunicam involutam deprehenderunt: hæc tunica rupta latentem vermem vivum & piloſum duobus punctis ſplendidis loco oculorum prodidit, ejusdem ferè molis cum reliqua cerebelli portione, qui duarum horarum ſpacio ſupervixit: hujus anomali abſceſſus fuit oculatus teſtis Guido Patinſ Mediciſ Parisienſis ingenio & erudi-

eruditione inter primos conspicuus, uti *Bartholinus* in libro de *angina epidem. exercit. III. & centur. I. histor. anat. LXIV.* refert, ubi simul indicat, quod O. W. (puto *Olaum Wormium* indigitare) *Dania & Orbis Ornamentum*, catarrho molesto post febriculam vexatus, cum frequenti dolore capitis post cibum sumptum ingravescente, è naribus vermiculum emunxerit. Aliud exemplum *Joel Langelotius*, *Archiater Gottorpianus*, in *Thomæ Bartholini centur. II. epistol. LXXIV.* proponit: nuper cum in *Dithmarsia* agerem, retulit Medicus ibi Ordinarius, vermem se manu sua contrectasse digiti medii longitudine, qui è capite per nares foeminæ exire coactus fuit hoc modo. Foemina rustica, istius loci incolà, cum per multum tempus diros capitis dolores sensisset, tandemque ii adeo increvissent, ut instar maniacæ hinc inde discurreret, venit ad Pastorem pagi *Neukirchen* famosum tunc inter rusticos Med. Practicum, qui non ita pridem vivis excessit: is statim consuetum sibi in cephalalgiiis ptarmicum miserculae adhibuit, quo caput vehementer concussum unà infaustum hospitem loco movit, eque naribus exire compulit, quo facto immanis capitis dolor statim conquievit. Sic ancillæ Chirurghi acerbè ac longè ex capite dolenti neque ullis remediis adjunctæ, tulit tandem suppetias vermis è naribus prorumpens longitudine medii digiti, uti *Tulpius lib. VI. observat. medic. cap. XI.* perhibet. Plura exempla apud *Fabricium Hildanum lib. I. observat. IIX. Saxoniam lib. I. med. pract. cap. II. Forestum lib. XXI. observat. XXII. Schenckium lib. I. observat. V. de dolore capitis ex vermibus, Rossæum epist. med. X. Zacutum*

*lib. I. prax. med. admirabil. observat. VI. reperiuntur.*



## OBSERVATIO VII.

*Potus Sanguinis Humani in  
Epilepsia.*

**S**uperstitiosi Ethnici, veteratoriis Dæmonum præstigiis infatuati, calidum recenter jugulari hominis sanguinem, tanquam singulare remedium, epilepticos bibere jusserunt, ut ex *Plin. lib. XXIX. histor. natur. cap. I. & Cels. lib. III. de re medic. cap. XXIII.* elucescit. Satanicum hoc inventum, ad nostra usque tempora devolutum, etiam hoc seculo plurimos Christianos effascina- vit, sed quàm infelicissimo successu detestandum istud auxilium usurpetur, historiæ sequentes abundè demonstrabunt.

Rustici opulenti Filius, viginti duorum anno- rum, ab ineunte ætate convulsionibus epilepticis obnoxius fuit, sic ut singulis septimanis ter aut quater paroxysmus rediret. Boni Parentes nullis sumptibus pepercerunt, quò Filius à miserando hoc malo liberari posset. Sed omnia incassum. Illos candidè monui, morbum hunc, quoniam à primis incunabulis Filium comprehenderit, vix eradicari. Tandem per pagos vagabundus Agyr- ta simplicibus Parentibus persuasit, ut Filius ca- lentem decollati hominis sanguinem bibat: quo factò

facto post aliquot dies calamitosus iste Iuvenis in maniam incidit, & vinculis ferreis coerceri debuit: duravit hic furor ultra mensem, simulque singulis diebus horrendo spectaculo paroxysmi epileptici multoties redierunt, tandem gravissima apoplexia miserrimum hunc Adolescentem è medio sustulit.

Sic *Lambertus Vitellius*, florentis ætatis adolescens, apud excellentissimum *Tulpium lib. IV. observat. medic. cap. IV.* posteaquam à frequentibus morbi comitialis insultibus plurimas molestias perpeffus esset, tandem ultima experiri decrevit, & quamvis invitus ad execrandum humani sanguinis potum confugit, quo tremula manu, averfis oculis, pallida facie ac horrente universo corpore in oblucentes fauces violenter infuso, tantum abest, terribilem morbum inde imminutum fuisse, ut potius plurimum incrementi sumpsit, habueritque multo pejus se æger quàm ante Thyesteam hanc mensam: unde factum, quò præ augescentis mali vehementia corruerit præceps in ignem, exusto illic vehementer crure & excitata tam ingenti gangræna, ut necesse fuerit (quò cætera femoris pars tuta foret) emortuum crus ferrula præcidere, quo remedio quantumvis ritè latis administrato, occidit tamen ipsum postridie ejus diei major morbi comitialis vehementia. In quod ipsum præsens vitæ periculum licet nequaquam inciderit adulta quædam Virgo, ejusdem jugulati juvenis sanguinem bibens, adeo tamen non recuperavit horrendo hoc remedio amissam valetudinem, ut potius in iisdem modo non & periculosioribus comitia-

lis morbi scopulis permanferit, nolente DEO ex-  
crandum hoc piaculum ulteriore experimento  
confirmari.

Porro quàm detestabilis fit humani sanguinis  
usus, rarâ historiâ lectu dignâ confirmat *Johannes*  
*Langius* olim quinque Electorum Palatinorum Ar-  
chiater, lib. I. epist. med. LXXI. Pastor sicarius & ho-  
micida duos filios habuit, quos sibi in latrocinii  
subsidium ascivit, ast cum Pater juniorem ad tam  
sæva obeunda facinora pusillanimum agnovisset,  
occiso in sylva *Othonis* tabellario, qui à recto itinere  
deviaverat, Pater panem sanguine occisi madi-  
dum Filio esurienti edendum præbuerat, quo de-  
gustato tanquam Dæmonis æstro percitus sese ad  
quævis perpetranda flagitia longè audaciorem fa-  
ctum, dum de eo & Patre ac Fratre supplicium su-  
meretur, ingenuè confessus est.



## OBSERVATIO. IIX.

*Empyema Thoracis.*

**P**osteaquam Filius sex annorum optimæ  
indolis & spei, per duos menses empyema-  
te thoracis laboraret, ac interim omnia in  
pejus ruerent, tandem & ego in consilium vocor.  
Magni Patris illectus amore comparui, & præmis-  
so examine observavi, Puerum istum pleuritide  
cum febre continua correptum fuisse, unde suppu-  
ratio in cavitate thoracis manifesto ægri damno  
succre-

succrevit. Cum autem vidissem, pus subcruentum & cœnosum per vulnus effluere, totumque corpus febre lenta consumi, Venerando D. Parenti, ob promptam operam lata occasione magnum, quem opera testabuntur, affectum pollicenti, cheu de restituenda Filii lectissimi valetudine spem præbere non potui, nam experientia & Hippocrate teste scēt. VII. aphor. XLIV. ὁπόσοι ἔμπυοι καίονται ἢ τέμνονται, ἢ μὲν τὸ πύον καθαρὸν ῥύη καὶ λελυκὸν ἀφεγγίνονται. ἢ δὲ ὑφαίμεον καὶ βορβορώδεις καὶ θυσώδεις, ἀπώλυνται. quicunque suppurati uruntur aut secantur, siquidem pus purum & album fluat, evadunt. Si vero subcruentum & cœnosum ac graveolens, pereunt. Interim ne industrium hunc puerum sine remedio derelinquerem, ad promotionem puris & mitigationem febris lentæ sequentem trageam ac electuarium præscripsi. R̄. Pulv. cachectic. Quercet. ʒj. spec. diarrhod. abbat. ʒij. oculor. cancr. prap. ʒij. corn. cerv. philos. prap. ʒj. corall. rubr. prap. ʒ℥. sacch. rosat. tabul. ʒiij. F. s. a. tragea. R̄. Looch. de pulmon. vulp. ʒij. conserv. rosar. rubr. fl. betonic. ā. ʒj. rad. consol. maj. cond. ʒ℥. spec. diatragac. frig. ʒij. diarrhod. abb. ʒj. syr. farsar. jujub. ā. q. s. F. s. a. electuarium. Ad conservandum robur virium sæpius aquam cardiacam in exercitatione mea de apoplex. §. XI. descriptam usurpavit, cui margaritæ jussu meo præparatæ admiscebantur. Nihilominus proh dolor! morbus non desit, sed tandem phthisis pulmonum & febris hectica, lento serpentibus gradu, elegantem istum puerum, cum acerbo Parentum luctu, rebus humanis exemerunt.

Monendi heic sunt juniores Medici, in pleuritide adeo necessariam esse venæsectionem, ut illa nunquam omitti debeat, etiam in mulieribus

B 3

men-



menstrua patientibus, gravidis, senibus & pueris, Tories autem sanguis mittendus, quoties inevitabilis necessitas extorserit, quæ sæpius adeo præceps est in pernici hoc morbo, ut grande sit paucarum horarum momentum, & quod vespere facile curasses, id in crepusculo plerumque videas immedicabile, ac cum certa desperatione conjunctum. Proinde si ullibi hîc saltem acri circumspeditione opus est, ne præpostera omittendi sanguinis formido inducat prægnantes, puerperas ac pueros in periculosum pectoris suppuratum, à quo paucissimi liberantur. Quæ enim hæc dementia est? primum metuis exile brachii vulnusculum & leve sanguinis dispendium, deinde verò incidis securi ipsum thoracem, & elicis inde non aliquot sanguinis uncias, verum integras pelves pure refertas, interdum per aliquot menses sed sæpius per plures annos. Vita hæc vada ô Medice! satius quippe est, prudenter vitam prorogare, quàm timidè mortem maturare, improvida namque sollicitudo sævitia est non lenitas, ne dum securitas sed speciosa temeritas: secanda itaque vena in pleuritide cuicunque ætati & sexui, uti Amplissimus *Tulpius lib. II. observat. medic. cap. I.* nos severè adhortatur.



OBSER-





## OBSERVATIO IX.

*Calculus Renis Sinistri.*

Ancilla vetula adhuc superstes (cujus in *River. contr. lib. XIV cap. I.* mentionem feci) in paroxysmum nephriticum acerbissimum incidit, nam terebra perforari ureterem sinistrum lanientata fuit: usurpatis *julepis, emulsionibus, clysteribus & linimentis*, quorum formulas dicto loco proposui, tandem ferè minimi digiti magnitudine & crassitie calculum cum urina excrevit, quem instar lapidis preciosi cum innumeris aliis lapillis aservat: hunc calculum dum in *Mercatoris Integerrimi* ædibus nonnemo conspexisset, imperiosus pernegavit, illum à rene expulsum esse, cum ureteres tantam capacitatem adipisci nequeant, ut talis calculus stupendus transire queat, hinc ex scrupulo hoc pluribus injecto diu hæsitavit præclari Viri, an calculus esset renis sinistri? quam statim hoc Ancilla ex ore Heri rescivit, liberè edixit: dicant Alii, quicquid velint, egometipsa sub finem dolorum experta sum, juxta ductum ureteris sinistri calculum in vesicam cum impetu ruentem. Ut impactum hoc dubium solvatur, non opus est cum Clarissimo *Baubino* Patre ex *lib. I. theatr. anatom. cap. XXIII.* respondere: *ureteres figura teretes palmum circiter longi, paleam latitudine imitantes, concavi, in mulieribus autem lati, recti & breves, hinc minore cum dolore calculos rejiciunt: nam Magnus Riolanus in animadversio-*

nibus ad hunc locum ostendit, ureteres pares esse & latitudine & progressu tam in viris quàm in mulieribus, nec majori facilitate calculos ejiciunt à renibus per ureteres, facilius à vesica foris extrudunt. Insuper apud Anatomicos nostro hoc seculo celebratissimos Thomam Bartholinum Danum, Nathanaelem Highmorum Anglum, Johannem Veslingium Patavinum, & alios de hac ureterum sexus masculini & foeminini differentia, altum est silentium.

Quod Ancilla hæc calculum tantæ magnitudinis è rene sinistro reddiderit, ex dilatatione ureteris hoc accidisse, magnorum Virorum testimoniis fultus adhuc assero. Bartholinus Pater lib. I. instit. anatom. cap. XIX. in calculosis dissecatis sæpe vidit cavitatem ureterum duos digitos admittere, imo æqualem intestinis fieri, magno Patre major Filius observavit. In calculosis, qui lapillos vi parturiunt, ureteris cavitatem ita dilatari, ut post obitum in apertis cadaveribus digiti crassitiem æquare visa fuerit, Riolanus lib. II. encheirid. anatom. cap. XXIX. attestatur. Fernelius lib. VI. de part. morb. & symptom. cap. XII. asserit, se in iis, qui jam pridem doloribus nephriticis assueti erant, usque adeo dilatatum ureterem comperisse, ut in eum major digitus immitti posset: Imo ipsemet Bauhinus Pater in dicto Theatri sui loco ureteres in calculosis sæpe ad modum INTESTINI alicujus dilatari affirmat, cur igitur lapillus minimi instar digiti non transiret? Nicolaus Tulpinus illustris Reip. Amsterodamensis Consul & Archiater lib. III. observat. medic. cap. VI. testatur, se vidisse ureteres tam amplos ob calculos illac crebroque transeuntes, ut in se haud gravatè digitum humanum admiserint,

miserint, unde nequaquam dubitandum, quod propter hanc causam anus septuagenaria & uxor cujusdam Præfetti societatis *Indiæ Orientalis*, unico impetu trecentos amplius calculos minxerit, uti Idem *Lib. II. cap. XLVII.* refert. *Johannes Lindenius Magni Nominis Professor Practicus Lugduno-Bata-vus, lib. II. medic. physiol. cap. V. artic. X.* asserit, ureteres hoc beneficii à natura habere, ut transmissio calculo nunquam postea ad priorem angustiam contrahantur, inde *Ambsterodami*, cum sub umbone *Antonii Patris* in notitiam praxeos & hominum duceretur, vidit in mercatore calculum nuce myristica majorem, istâ viâ in vesicam pervasisse. *Domini-cus Panarolus Professor Romanus pentecost. IV. observat. XXXI.* in suppressione urinæ mortuis & à se aper-tis ureteres ad exitum lapidis ita dilatatos bis ob-servavit, ut digiti circumferentiam adæquarent. Sic *Gothofredus Mæbius, Professor Jenensis* excellen-tissimus, in Viro nobili lapillum dactyli nucleum æquantem, per eundem angustum spacio se-ptem mensium transeuntem conspexit, sequenti-bus, licet etiam satis magni essent, cum minore molestia exeuntibus, uti in *fundam. medic. physiol. cap. XVII.* perhibet.



## OBSERVATIO X.

*Lethargus.*

**V**IR Nobilis quadraginta annorum, obe-sus, catarrhis obnoxius, sæpe floribus *Li-beri Patris* conspersus, subito in veterum

B 5

inci.

incidit, ita ut à Domesticis vix expergeri potuerit. Vocatus magna cum difficultate illum è profundo somno excitavi, sed oculos propter inexplabilem dormiendi propensionem vix attollebat, quapropter iussi statim sequentem clysterem injicere. *R. rad. alib. ʒj calam. ʒß. herb. betonic. ruta, pullegii, malva. ā. Mj. fl. lil. convall. chamem. ā. Pj sem anisi ʒij. croci metallor. in nodul. liq. ʒß. coq. in aq. font. q. s. in colat. ʒx. sol. elect. diacatholic. ʒj. hier. picr. Logad. ʒß. ol. ruta, chamem. ā. ʒj. sal. gem. ʒj. F. clyster. Hocejecto ob febrem continuam lentam venæsectio in brachio dextro instituta, & ad vesperam vesicatorium cervici admotum fuit. *R. pulver. cantharid. subtilis. ʒj. euphorbii ʒß. ferment. & ac. t. q. s. F. massa pro vesicatorio. Pro cerebri affecti robore conservando seq. aquam præscripsi. *R. aq. epileptic. & cardiac. nostr. ā. ʒij. cerasor. nigr. ʒj. julepi rosat. syr. citri, ā. ʒß. Misce: de qua aliquoties plenum cochlear exhibitum fuit. Formulam aquæ epilepticæ & cardiacæ reperies in exercitat. de apoplex. S. X. & XI. Sequenti balsamo tempora ac nares illinebantur. *R. ol. destill. angelic. ruta, rorismar. salv. succins. ā. ʒß. balsam. peruvian liq. ʒj. ol. nucista express. q. s. F. balsamum. Secundo die sequentem potiunculam purgantem sumpsit. *R. elect. de succorosar. ʒß. aq. betonic. q. s. F. potiuncula. Tertio die, cum fere in eodem statu ægrotum observassem, clyster repetitus, & sub vesperam cucurbitulæ cum scarificatione scapulis admotæ fuerunt. Quarto die mane seq. pilulas præscripsi: *R. extr. cochiar. catholic. ā. ʒß. castor. gr. ij. ol. salv. gt. j. F. pil. XI. deaur. Quinto die ratio cinatio & memoria officium suum rursus subire ince-******

inceperunt, nam ad interrogata mihi & adstantibus convenienter respondit.

Antequam ipsi valedicerem, monui, ut præse-  
vationis loco mane & vespere seq. electuario vel  
tragea utatur. R. *conserv. rosar. rubr. betonit. ā. ʒj. ma-  
jor. rad. cichor. cond. nuc. indic. cond. ā. ʒʒ. spec. marchion.  
ʒʒ. diambra. ʒʒ. confect. alkerm. ʒj. mithrid. opt. ʒij. syr.  
poeon. q. s. F. electuarium. R. spec. aromat. caryoph. dia-  
trionsantal. ā. ʒij. diamoschi dulcis, diamb. ā. ʒj. ol. cin-  
nam. gt. iij. sacch. opt. ʒiij. F. s. a. tragea. Porro vere  
& autumnō venæsectionem instituere jussi, si prius  
corpus seq. sacculo purgatum fuerit. R. *rad. poeon.  
cichor. ā. ʒij. herb. betonit. hepatic nobil. ā. Mj. major. Pj.  
fol. senn. elect. ʒij. agaric. rec. troch. ʒʒ. rhabarb. elect. ʒij.  
sem. anisi. ʒj. fœnic. ʒʒ. macis. ʒj. incisa & contusa dentur  
cum sacculo ex sindone albo, cui mensura vini albi veteris af-  
fundatur, de cujus colatura mane alternis diebus cum regimi-  
ne diata ʒvj. sumantur.**



## OBSERVATIO XI.

### *Convulsio Rara.*

**R**usticus dives territorii *Austriaci* cum Vici-  
no prolixas habuit rixas, unde à verbis ad  
verbera devenit: hic lapillum pedi-  
bus proximum arripuit, & vulnus temporibus si-  
nistris illius inflixit. Vocatus Chirurgus debitum  
fecit officium & convenientia applicavit remedia.  
Cum quinto die horrendæ convulsiones in oppo-  
sita

fitâ parte accessissent, ad ægrum invisendum rogatus fui: declinante paroxysmo Pharmacopolam jussi sequentem clysterem injicere. *R. rad. alth. ℥j. pæonia, ℥ß. herb. betonic. salvia, parietar. malva, ā. Mj. sem. anisi ℥ij. coq. in colat. ℥viij. solve elect. hie. picr. Log. ℥j. mell. antbos. ℥ij. F. Clyster. sæpius per os aliquot guttas olei succini cum aqua mea epileptica sumpsit, unde convulsionem remiserunt, sed non omnimodè cessarunt, nono enim die tanto cum impetu aggressæ sunt Ægrum, ut illum è medio sustulerint. De proxima harum convulsionum causa celebres Chirurgiæ Scriptores consului, sed salvo aliorum judicio solus dubium hoc egregiè solvit Germanorum Chirurgorum Antesignanus, *Fabricius Hildanus centur. II. observat. II X.* Oppositus, id est, partis sanæ musculus dum fungitur officio suo, maxillam ad se trahit, læsus vero quia interim quiescit, fit ut maxilla versus partem sanam non sine maximo dolore & vitæ discrimine trahatur, unde convulsio hæc rara originem ducit.*



## OBSERVATIO XII.

*Ophthalmia.*

**M**ercator quadraginta annorum ex *Franco-*  
*sortensibus* nundinis autumnalibus domum  
 rediens, in ipso itinere defluxionem in  
 utrumque oculum passus fuit: vocatus ad illum  
 observavi insignem oculorum rubedinem, cum  
 lacrymis,

lacrymis, dolore & calore continuis, insuper venulæ oculorum ita turgebant, ut adstantes vix cernere potuerit. Primo die sequentem potionem purgantem usurpavit. *℞. folior. fenn. elect. ℥℔. sem. anisi ℥j. cremor. tartari ℥ij. aq. euphras. cichor. ā. q. s. infunde per noctem, mane bulliant parum, in colat. ℥iiij. solve syrup. ros. sol. simpl. ℥℔. misce.* Secundo die larga venæsectio in brachio dextro instituta fuit: tertio die seq. potiuncula utebatur. *℞. elect. de succo rosar. ℥℔. aq. euphras. q. s. Fiat potiuncula.* quarto die vena in brachio sinistro aperta erat: quinto vesicatorium cervici admotum & seq. collyrium præscriptum fuit. *℞. aq. euphras rosar. albar. ā. ℥℔. trochisc. albi Rhaf. s. o. tutie præp. ā. ℥℔. F. collyrium,* quo linteo-  
la imbuta & expressa repidè mane & vesperi palpebris imponebantur, nec non guttulæ aliquot oculis instillabantur, unde rubedo & dolor imminuebantur. Sexto cucurbitulæ cum scarificatione scapulis admotæ fuerunt: septimo die sequens electuarium ad visus robur conservandum præscripsi. *℞. conf. rosar. rubr. ℥j. euphras. betonic. ā. ℥℔. flor. rorismar. ℥ij. rad. cichor. cond. roobribium ā. ℥vj. pulver. herb. & flor. euphras. ℥ij. syr. pæon. q. s. F. electuarium,* de quo pro lubitu quantitas nucis moschata sumatur. Unde malum cessare & omnia symptomata mitigari inceperunt. Ad reliquias inflammationis oculorum tollendas usus erat unguento officinarum nostrarum ophthalmico, cujus formula sequens est & inventio magnis Zuingeris debetur. *℞. Tutie præparat. ℥j. camphor. ℥j. ærugin. æris gr. xij. aq. rosar. butyr. recent. ā. ℥vj. F. s. a. unguentum.* Usus illius est, dimidij pisi magnitudinem canthis oculorum ophthalmia laboran-

borantium immittere. Toto morbi decursu diætā convenientem observavit, qualem in *lib. II. River. contr. cap. IIX.* proposui. Cum sæpe contingat, quod ophthalmiæ sint periodicæ & certis quibusdam intervallis revertant, Ægrum monui, ut singulis mensibus circa novilunium cucurbitulas cum scarificatione scapulis affigere jubeat, elapsisque aliquot diebus octodecim de sequentibus pilulis utatur. *℞. extr. pilul. luc. major ℥j. aurear. sine quibus ā. ℔. cochiar. ℥j. magist. radic. jalap. ℔. ol. fœnic. gt. vj. misce diligenter, formentur pilula ex ℥j. numer. xvij. deaur. ntur & dentur in scatula.* Mane jejuno stomacho sequentem trageam usurpavit. *℞. spec. de nuc. moschata ℔. aromat. rosat. diatrionsantal. dianthos, ā. ℔. herb. & flor. euphras. ℔. corall. rubr. prepar. ℔. ol. fœnic. gt. xij. sacch. opt. ℥vj. F. s. a. tragea.* Formula specierum de nuce moschata in officinis Basileensibus consuetarum, quæ magno cum fructu pro cerebri & oculorum robore præscribuntur, sequens est. *℞. Nuc. moschat. opt. ℥j. cinnam. elect. ℔. garyophyll. ℥ij. folior. major. rorismar. betonic. lavendul. ā. ℥ij. F. pulv.* Tempore hoc opportuno autumnali vinum medicamentosum ex musto recenti paretur. *℞. rad. enula, fœnic. ā. ℥ij. caryophyll. ℔. lign. sassaf. ℥ij. herb. betonic. chelidon. major. euphras. hepatic. nobil. ā. Mij. scabios. verben. heder. terrestr. centaur. min. ā. Mij. baccar. junip. ℥ij. concisa in XL. mensuris musti recentis infundantur, quod si deferbuerit, de illo cyathum plenum mane & apud prandium pro primo haustu evacuae e conduit.*

Antequam huic observationi finem imponam, adhortandi sunt juniores Medicinæ Doctores, ut in cura ophthalmiæ sequentes animadversio-



adversiones diligenter observent, quibus sedulò notatis periculosum hunc affectum feliciter extirpabunt. I. in medela veræ ophthalmiæ venæ selectio semper imperanda est, quantum enim utilitatis generolum hoc remedium afferat, historiâ lectu dignissimâ ostendit Galenus in libro de curandi ratione

asperitates, à quibus oborta caligine agrotus magis magisq;  
dolebat, ac inflammatio fluxioq; acerbabantur: his inquam  
conspēctis cognitaq; omni ratione curationis, qua Medicus ille  
usus fuerat, me quidem assidue in suburbium venire posse ne-  
gabam, ceterum ex usu esse, ut triduum ut minimum homi-  
nem parvis temporum intervallis inspicerem. Permite igitur  
illum mihi, si videtur, tres hosce dies, imo vero, inquit, ut fa-  
cias obsecro, gratiamq; habeo, quin jam hominem tecum ad  
edes tuas adduc. Venit autem circiter horam quintam, ac  
prima protinus detractione tres sanguinis libras exhausti, dein-  
de hora nona aliam, à quibus mirificè oculis apertis inunctus  
est postero die mollium collyriorum quopiam. hinc est, quod  
idem Galenus in præcedenti cap. XIV. dixerit:  
ὁρίσας τε ποσάκις ὀφθαλμῶν ἰχυροῦσας ἐν τοῖς ἑσπέραις ἡμέραις  
ἢ καὶ ὅτε φλεβοθμία τῆς ὁμειώσεως καλεμένης φλεβὸς τετρα-  
μῆνης. dolores oculorum gravissimos saepe intra unicum horam  
compescuit venasectio è directo, quam humoralem vocant.  
Imo in ophthalmia inveterata venam jugularem  
tutò aperiri posse eleganter demonstrat Fabricius  
Hildanus centur. IV. observat. XIII.

II. Cum juxta auream Hippocratis sententiam  
sect. VI. aphorism. XVII. ὀφθαλμίων τε ὑπὸ ἀφροσύνης λεφθῶναι,  
ἀγαθόν, ophthalmia laborantem alvi profluvio corripere, bonum  
sit, Medicum Naturæ ministrum oportet, in legiti-  
ma ophthalmiæ cura convenientes supra indica-  
tas purgationes semper præscribere: hinc iterum  
Galenus lib. XIII. method. medend. cap. XI. accuratè  
monet: ἔ γάρ ὁ λόγος μόνον ἀλλὰ καὶ ἡ πρῶτη δεικνύσιν, ἄλλω  
ἄλλω μοδίῳ κίνησιν ἀρμόττειν. Ἐθέλω γοῦν εἶναι τῶν ἀρε-  
κίων φλεγμαίνων ὀφθαλμῶν, αὐτῶ μόνῳ τῷ καθαρῶναι ἀπὸ τῆς  
πάσας γαστρός ἡμέρα μιᾷ διεκπύεσθαι. non enim ratio solū  
verum etiam usus ipse indicat, aliam alij parti vacatione  
congruere, siquidem ex iis, quibus oculi inflammatione ten-

tari coeperant, nonnullos sola purgatione per alvum una die  
sanatos vidisti.

III. Præmissis convenientibus istis evacuationibus, repetita videlicet venæsectione & purgatione, demum ad topica & collyria transeundum, nam primis statim diebus si repellentia oculis admoveantur, illa humorem in oculos impetu ruentem, plerumque & dolorem ac inflammationem adaugent: hinc Galenus comment. sect. VI. aphorif. XXXI. τῶν ὀφθαλμικῶν ἰατρικῶν τινὰ τῶν τότε ὄντων ἐν Ῥώμῃ ὅτι ὀκλιμῶντες, quendam ex Ocularibus Medicis tum in urbe Roma spectatissimum justis de causis reprehendit, cui ab initio statim καθυεῖα τῶν ἐμπλαστικῶν τι ἅμα καὶ ἀμυδρῶν, χαρτῶν collyrio meatus obducente & dolorem sedante utendum esse videbatur, οἷα τότε ἀπὸ ψιμμουθίου σπιγλυμμένῃ καὶ ἀμύλῃ καὶ μέλαντι συνωθέντα. μάλιστα γὰρ αὐτὸς ἀναγλίσσατο τὸ ἐπιρρίψαι ἡλπίξει ἀπὸ τῶν ἐμπλαστικῶν. ναρκωθέντες τι ἅμα ἀπὸ τῶν ναρκωτικῶν τὴν αἰσθησιν. ἐγὼ δὲ ἐξ ἀρχῆς ὑπέπτως ἔρχετο πρὸς τὴν ἰατρικὴν τῶν φαρμάκων, ὅτι γὰρ ἀνατρέπει τὸ σφοδρὸν τῶν ἰσχυμάτων, ἀλλ' ἐκείνους καλύπτει. καὶ ἀπὸ τῶν θερμῶν μὲν ὄντων αὐτῶν, ἰσχυρῶς συνεισάγει τὸν κεραιώδη. πολλῶν δὲ ἀπὸ τῶν κατὰ τὴν παροξυσμῶν σφοδρῶς, ὥσπερ ῥιζομήκων. ἐφ' οἷς οἱ μὲν καὶ μεγάλως εἰς ναρκωτικὸν τὸ φάρμακον, ἀφορήτως συμβαίνει εἶναι τὰς ὁδύνας. εἰδ' ὅπως εἰς ναρκωτικὸν ὡς καὶ τῆς μεγίστης φλογμοῦ ἀναισθητικῶν ἐργάζεσθαι τὰς ὀφθαλμικὰς ἀναγκὰς ἐστὶν ἅμα καὶ τὴν ὀπτικὴν δύναμιν, ὡς μὲν ἔχει παυσανὸς τῇ ὀφθαλμικῇ, ἢ παντελῶς ἀμυδρὸν, ἢ μὲν ὅπως αὐτὸς ὅσῃ, ἅμα δὲ ὑπολείπεσθαι καὶ οὐκ ἰσχυρῶς ἀπὸ τῶν χιτῶν δύναμιν. qua ex cerussa lota, amylo & papauere componuntur: sic enim maxime per emplastica oculus iste Medicus sperabat inhibere, quod influebat & simul sensum torpescere per stupefactoria. Ego autem ab initio talia medicamenta suspecta habui, neque enim vehementer fluxiones reprimunt, sed excerni impediunt, hinc si humores acres fuerint, corneam exulcerari contingit, si vero multi absque acrimonia hu-

mores influant, cornea extenditur ac vehementer irritatur, quasi illa rumpatur, è quibus nisi medicamentum fuerit maximè stupefaciens, intolerabiles dolores accidunt, sin autem fuerit adeo stupefaciens, ut inde oculi maximam inflammationem non sentiant, necesse est, simul facultatem visionis damno affici, ut ægroti cessante inflammatione aut prorsus debilitè aut omnino nihil videant, simulq; prædurum aliquem affectum difficulter medicabilem in oculorum tunicis relinqui. Et hæc de principalioribus in curanda ophthalmia nunquam intermittendis animadversionibus dicta sufficiant.



## OBSERVATIO XIII.

*Menstruorum rejectio per  
vomitum.*

**R**eligiosa Virgo Franciscana triginta annorum ab aliquo tempore imminutam menstruorum fluxionem observavit, quam omnimoda suppressio sequuta fuit, unde tandem sanguis per superiora exitum sibi acquisivit. Illa Superiorum permisso Basileam venit, & magno perculsa timore mihi retulit, se jam per quatuor menses stato menstruum nunc omnino suppressorum tempore vomitum sanguineum pati. Monui illam cordato esse animo, affectum istum ultimum nondum minari, præsertim si motus menstruum ordinarius ope convenientium remediorum concilietur. Hinc ipsi sequentem sacculum purgantem præ-

tem præscripsi. *R.* rad. bryon.  $\mathfrak{z}\text{ss}$ . rubia tinct.  $\mathfrak{z}\text{ij}$ . herb. marrub. alb. artemis. chamadr.  $\mathfrak{a}$ . *M.* summit. centaur. min. absinth.  $\mathfrak{a}$ . *Pj.* folior. fenn. elect.  $\mathfrak{z}\text{ijss}$ . agaric. rec. trochisc.  $\mathfrak{z}\text{ss}$ . sem. anisi  $\mathfrak{z}\text{ij}$ . cremor. tartar.  $\mathfrak{z}\text{iiij}$ . incisa dentur ad sacculum ex sindone albo, cui mensura vini albi veteris asfundatur, de qua mane alternis diebus  $\mathfrak{z}\text{vj}$ . bibantur. Usurpato hoc vino purgante & saphenâ utriusque pedis apertâ sequens balneum paretur. *R.* rad. liq. albor. bryon.  $\mathfrak{a}$ .  $\mathfrak{z}\text{iss}$ . herb. 4. emollient. puleg. meliss. matricar.  $\mathfrak{a}$ . *Mij.* femin. lini  $\mathfrak{z}\text{iss}$ . incisa dentur pro balneo: cum aliquoties hoc balneo usa fuisset, menstrua redierunt, & vomitus sanguineus cessavit.

Quemadmodum in religiosa hac Virgine per ventriculum menstrua suppressa transitum inveniunt, sic in aliis fœminis per alia loca exitum quæsi verunt, cum enim vasa sanguinea universum corporis humani ambitum comitentur, iussa naturæ ab aggravantibus menstruis semetipsam exonerantis libenter exequuntur. Hinc mirum non est, quod Bononiâ ad Joannem Prevotium consilii causa scriptum fuerit, Religiosa Fœmina menstrua suppressa per dentis alveum erupisse. Sic Joannes Baptista Soncinus mulierem novit, cui menses nunquam fluxerunt, sed imminente huic purgationi tempore consueti magna sanguinis copia è dextra tibia erupit aperta ulceris crusta, uti excellentissimus Joannes Rhodius centur. III. observat. medic. L. & LI. attestatur. Simile exemplum de serva Hafniensi proponit Thomas Bartholinus centur. I. histor. anatom. rarior. XVI. Ancilla Viri cujusdam apud nos Reverendi & Clarissimi operibus culinariis defatigata in pedum tumorem incidit, quo rupto & diligenter

expurgato ulcere convaluit: instante mensium periodo solita sponte sua tumor rursus disruptus sanguinem copiosè profudit, quod sæpius eodem modo contigit; sanguis enim, qui propter vasorum uterinorum obstructionem à consueta via fuit exclusus, aliam elegit, eamque ob tumores prægressos debiliissimam: solet ita natura unius defectum alia ratione compensare præsertim in evacuatione sæminis ad salutem necessaria. Sic idem Bartholinus recordatur, *Dominicum Salam* Medicum *Patavinum* mulierem quandam plethoricam per sectionem salvatellæ curasse, cui ex angulo oculi menses fluebant. De menstruis suppressis per gingivas, mammas, pulmones, umbilicum & alias vias evacuatis exempla reperies apud *Thomam Bartholinum* centur. V. *histor. anatomic.* XXXII. *Joannem Schenckium* lib. IV. *observat. medic. p. m.* 634. *Ambrosium Pareum* lib. XXIII. cap. LII. *Zacutum Lusitanum* lib. II. *prax. medic. admirand. observat. C. & CI.* *Amatum Lusitanum* centur. II. *curation. medicinal.* XXI. *Ludovicum Mercatum* lib. I. *de mulier. affectib.* cap. VII. *Reimbertum Dodonaum* *observat. medic. cap.* XV. *Philippum Salmuthum* centur. II. *observat.* XII X.



## OBSERVATIO XIV.

*Humoris aquei regeneratio.*

**H**umor aqueus in anteriore oculi parte positus est, ut instar propugnaculi objectus crystallino splendorem externi luminis affatim

affatim irruentem obtundat, & tanquam conspici-  
 cilium rerum simulacra crystallino majora repræ-  
 sentet: sic videmus eos, qui in minutissimis rebus  
 occupantur, ampullam vitream aquâ limpidissi-  
 mâ plenam lumini objicere, ut radiorum à tergo  
 collectione res minimas distinctius accuratiusque  
 cernant, quod è judicio *Bartholiniano* maximus Or-  
 bis Anatomicus, *Joannes Riolanus lib. IV. anthropogr.*  
*cap. IV. ante nonneminem* monuit. *Andreas Laurentius*  
*quondam Academiæ Monspeliensis Cancellarius,*  
*lib. XI. anatom. cap. VII.* humorem aqueum oculi vi-  
 ventem & spermaticam esse asserit. *Riolanus* dicto  
 loco excrementum esse affirmat. *Nonnemo*, quid  
 statuendum sit, diu ambiguit, posteaquam autem  
 apud *Riolanum* legerit, quod humor aqueus in pulli  
 oculo punctione extractus intra quindecim dies  
 regeneretur, humorem excrementitium esse fateri  
 oportuit. Sic etiam in hominum oculis aqueum  
 humorem renasci ostendit *Galenus lib. I. de symptom.*  
*causis cap. II.* παραδόξον μὲν τοι ἔστι καὶ ἐκ ἐπιστάτης γιγνώσκειν  
 ἐπὶ παιδὸς ἐκαστάμεθα, νυκτὸς ὡς ῥαφεία καὶ τὴν κόρη. ἐκκρ-  
 εῖν γὰρ ὁβίως ἔκ ὑδατῶος ὑγρῆς, καὶ ἡ κόρη μὲν ἐξήρτο μικρο-  
 τέρα, καὶ ὅλῃ δὲ ὁ περιτοειδὴς ἐφάνη βυσσώτερος. ἀλλ' ὕστερον  
 διαπραγμάμενος ὁρθῶς ἔβλεψεν, ἀθροισθείσης δηλονότι καὶ βραχυ-  
 τῆς αὐτοῦ ἐκρυσίσης ὑγρότητος. *incredibile quiddam nec fie-*  
*ri vulgo solitum in puero vidimus, qui stilo in pupille loco fue-*  
*rat compunctus, nam cum statim effluxisset aquosus humor,*  
*tum pupilla ipsa minor est redditâ, tum tota cornea apparuit*  
*rugosa, ceterum sanatus postea rectè vidit, collecto scilicet pau-*  
*latim eo humore, qui effluxerat. Ita testatur Realdus Co-*  
*lumbus quondam Anatomicus Romanus, lib. X. de re*  
*anatom. se propriis oculis vidisse, humorem aqueum*  
*ob vulnera prorsus effusum nihilominus spacio*

temporis renatum, ita ut æger læso oculo deinceps cernere potuerit. *Franciscus Plazzonus* puero duodecim annorum medebatur, cui corneâ pertusâ humor aqueus oculi totus effluerat, sed intra binos menses spontè sic reparatus fuit, ut oculi usus ipsi omnino ob reliquarum partium constitutionem humidam redditus fuerit, uti confirmat *Rhodi* *centur. I. observat. medic. LXXXII.*

Ego in *Nobilissimi Viri Filiola* similem casum observavi; hæc dum levibus de causis cum fratre altericaret, iste iracundia percitus cultellum scriptorium apprehendit, & sororis oculo vulnus infligit, unde humor aqueus effluxit, Vocatus præsentem Chirurgum jussu sequens collyrium anodynum & exsiccans tepidè sæpius admove. *R. aq. plantagin. ℥iij. rosar. sanicul. euphras. ā. ℥j. trochisc. alb. Rhas. cum opio ℥ij. tutiæ præpar. ℥j. croci orient. ℥ß. Misce:* hoc collyrium inflammationem compescuit, vulnus siccavit & sanavit, hinc post aliquot menses humor aqueus succrevit, nam visus sed debilior cum summo Parentum gaudio rediit. Quàm insignes autem in vulneribus istis oculorum sanandis collyria anodyna & exsiccantia vires possideant, elegantî historia comprobat *Tulpius lib. I. observat. medic. cap. XXX.* Sagitta decidens ex altiori loco tam latè pupillam cujusdam Equitis Filio discidit, ut non tantum aqua oculo inclusa effunderetur, sed quoque membrana uvea concideret, hebescente inde adeo visus acie, ut ne admotum candelæ lumen conspiceret: unde plurimùm consternari Parentes & frequentius ingemiscere Familiares, sed prostratos haud parum ereximus eorum exemplo,



exemplo, quibus regenita aqua usuram amissi luminis restituisset, ac proinde animum non abjiciendum, sed ab aliis exemplum capiendum, nobis quod ex usu fiet. Quæ monita tantum valere apud ægrum, ut nihil non remediorum admiserit, inter quæ primas tenuere collyria anodyna & exsiccantia, quibus adeo benedixit Deus, ut inducta vulnere cicatrice, oculi aqua deperdita iterum succreverit, & pulsa caligine gratissimum visus officium redierit, sed naturali imbecillior ob cicatricem uveæ à vulnere relictam apparuit.



## OBSERVATIO XV.

*Pleuritis Periodica.*

**S**acerdos in Diœcesi Episcopatus Basileensis, triginta annorum, singulis annis, verno tempore, pleuritidem periodicam passus fuit, ab hac illum quinquies sequente methodo liberavi. E' directo lateris affecti in brachio bis venæsectionem instituit, & latus dolens sequente linimento tepidè inunxit. *R. unguent. resumpt. & alth. Fernel. ā. ℥℔. ol. amygdal. dulc. q. s. F. linimentum,* post venæsectionem ad sanguinis ebullitionem & fluxionem sistendam sequentibus julepis usus fuit. *R. aq. papav. erratic. scabios. ā. ℥iij. syr. alth. Fern. granator. ā, ℥i. spir. sulphur. gt. viij. F. julepus pro duabus dosibus,* *R. aq. farfar. ℥iij. acetos. ℥iij. scabios. ℥ij. syr. papav. erratic. ℥℔. spir. sulphur. gt. xij. F. julepus pro tribus dosibus.*

Quando natura incepit materiam peccantem per anacatharfin evacuare, tunc ægrotus rotulis, syrups vel electuario ad lubitum usus fuit, quorum formulas in *River. contract. lib. VI I. cap. II.* annotavi: per totum morbi decursum vino abstinuit, & pro potu ordinario sequens decoctum bibit. *R. rad. acetos. fragar. liquir. ras. ā. ʒij. jujubar. recent. par. iiij. sem. anisi. ʒj. incisa coquantur in aq. font. ad mensuras duas, & colatura detur.* Tandem cum sexta & ultima vice pleuritis rediisset, illa usurpatis frustra omnibus prædictis remediis in peripneumoniam transivit, & Ægrum è medio sustulit, ita ut *Hippocratis aphorismus XI. sect. VII.* verus sit: *ἐπὶ πλῶξις δὲ περιπνευμονία κακόν.* pleuritidi superveniens peripneumonia, malum.

Ut verum fatear, in proximam hujus pleuritidis periodicæ causam sedulò diu inquisivi, & Veterum ac Recentiorum scripta in lucem edita consului, tandem apud magnum *Riolanum lib. III. anthropogr. cap. IIX.* legi, se vidisse, quòd illa corpora pleuriticis affectionibus sæpissimè tententur, quorum vena *ἀζυγὴ* vel sine pari unicam tantum valvulam habet, nam in hacce vena sine pari valvulas ab *Amato Lusitano centur. I. in schol. observat. LI.* indigitatas sæpius observavit. Unde *Riolanus* miratur, quòd *Clarissimus Bauhinus*, qui istas valvulas nec in hominibus nec in brutis observare potuit, ex ipsius *anthropographia* edoctus, in editione secunda *Theatri Anatomici* sententiam non mutarit, (quod tamen in musculorum abdominis descriptione, iisdem *Riolani*, sed suppresso ejusdem nomine, adductis rationibus præstitit, uti *Riolanus* in animadversionibus suis ad *Theatrum Bauhini* expressè refert,) & illum nominatim val-

tim valvularum sine pari Propugnatorem adducens refellere non ausus fuerit, fortasse quoniam illas plurimis Germanis Medicinæ Studiosis privatim & publicè ideo demonstraverat, ut Academiarum Germaniæ Professoribus Anatomicis referrent, valvulas ostio venæ sine pari præfectas existare. Sed in situ & usu valvularum *Riolanus* ab *Amato* dissentit, nam hic illas foris intro spectare voluit, ut remeanti sanguini obsisterent, ille autem intro foras reduci demonstravit, ut impetum affluentis sanguinis sustinerent, ac refluenti cederent. Quippe natura prævidens incommoda, quæ partibus ex plenitudine vasorum evenire solent, elegans artificium excogitavit: etenim in partibus declivioribus & quæ continuo moventur, vasorum orificiis membranulas tanquam repagula apposuit, ut illis repentinus sanguinis fluxus sisteretur. Quum igitur thorax ob respirationis necessitatem perpetuo moveatur, ne sanguis in venam sine pari affatim ruens pleuritidem inferret, benigna Paterens ut huic incommodo prospiceret, duas vel tres valvulas tanquam ostiola vel repagula in caudice venæ sine pari alternatim disposuit: prima est in exortu venæ, duæ aliæ directè oppositæ in medio caudice sunt affixæ, quæ affatim irruenti sanguini resistunt, sed remeanti cedunt. Hoc *Riolanus* in animadversionibus ad theatrum anatomicum *Baubini* reperit, dicens: qui diligenter & accuratè principium venæ sine pari emergentis à trunco cavæ inspexerit, manifestè deprehendet duas valvulas futurum reflexas affatim irruenti sanguini obsistere, nec ejus refluxum impedire: *Guernerus Rolfincius*

immortale illud Medicorum Decus & inocciduum Jenensis Academiæ Lumen, quamvis diu contrarium senserit, *meliora tamen edoctus* ( ut ipse candido animo *lib. V. dissertat. anatomic. cap. XXIX.* profiteatur ) hanc rem commoda occasione perveltigandam suscepit, & valvulas illas adesse deprehendit, non tamen tam ingentes, quales sibi imaginatus est *Amatus*, neque respondent valvulis vasorum cordis, sed exiguæ sunt, ut plurimum tres in caudice venæ sine pari alternatim positæ: prima in exortu, duæ in caudice medio directè oppositæ affatim sanguini irruenti obsistunt, & remeanti cedunt.



## OBSERVATIO XVI.

*Phthisis Pulmonum.*

**D**N. THOMAS LÛTZLERVS, Canonicus *Delemontanus*, Viri Summi, DN. THOMÆ HENRICI, Suffraganei *Basileensis*, Theologi non saltem meo sed & aliorum elogio inter suos Primarii &c. Nepos ex Sorore, posteaquam consiliis & remediis exercitatorum Medicorum diu usus fuisset, phthisin ab ulcere pulmonum metuens, *Basileam* appulit, & auxilium meum enixè sollicitavit. Ex præmissis examine satis superque collegi, pulmones exulceratos esse: quippe molestissima tussis illum noctesque diesque afflixit, sputa purulenta apparuerunt, febris lenta noctu emicuit,

emicuit, universus corporis habitus maciem contraxit, sudoribus matutinis corpus diffluit, sub vesperam pedes intumuerunt, & de quo in primis conquestus fuerat, difficillime ac sæpius cum metu suffocationis respiravit. Consideratis ad artis trutinam istis symptomatibus prædixi ægroto, me de restituenda sanitate prospera magnam spem polliceri non posse, & cum methodus medendi longiorem temporis moram requirat, consului, ut rursus *Delemontum* peteret: sed ille respondit, ego querulam valetudinem meam Tuo candori committam, & apud Avunculum meum in pago *Hegenheim* commorabor, ut ad arbitrium me invisere possis. Unde sequentia remedia præscripsi. *R. spec. diatrios simpl. 3℔. diatrag. frig. 3℔. confect. alkerms. 3j. faccul. aronis 3℔. ol. anisi gt. viij. sacch. opt. aq. scabios. & farfar. solut. 3iiij. F. s. a. rotula pro ægroti arbitrato usurpanda. R. radic. liquir. ras. 3℔. ireos florent. 3ij. jujubar. recent par. viij. herb. pulmonar. farfar. scabios. ā. Mj. incisa coq. in aq. font. ad ℔j. circiter, decoctum coletur & clarificetur, additaq. sacchar. ℔s. denuo coq. ad consistentiam syrapi, cui admisce pulmon. vulp. juxta normam *Zuelferi* prepar. 3j. conserv. rosar. rubr. fl. betonic. ā. 3vj. spec. diatr. simpl. 3ij. diatrag. frig. 3j. diarrhod. abb. 3℔. ol. anisi ʒj. F. looch sive electuarium molle, de quo pro lubitu quantitatem nucista æger sumat. Pro potu ordinario sequens decoctum bibit. *R. rad. china rec. 3℔. liquir. ras. 3ij. herb. agrimon. scabios. farfar. veronic. ā. M℔. sem. anisi 3ij. coq. in aq. font. ad mensuras duas. Posteaquam ista remedia per aliquot septimanas usurpasset, liberius respiravit & facilius materiam purulentam excrevit, Hinc meliora speravit Ægrotus. Verum sub*  
finem*

finem sextæ septimanæ foetidissimum pus incredibili abundantia excreare incepit, unde nequaquam dubitavi, vomicam in pulmonibus ruptam fuisse, tandem gravis lipothymia superveniens Ægrum è medio sustulit.



## OBSERVATIO XVII.

*Asthma calculosum.*

**I**ohannes Georgius Gisingerus, Antiqui Monasterii Bellelagiensis Religiosus, & Cœnobii ad portam cœli Præpositus, Vir quinquagenario major, ob insignem cerebri frigidioris humiditatem, destillationibus ad thoracem maximè obnoxius, cùm à contumaci paroxysmo asthmatico vitæ periculum metueret, me die IIX. Septembris A. S. M. DC. LXIX. vocare iussit. Comparui & apud illum observavi gravem! spirandi difficultatem cum stertore & sibilo conjunctam, hinc erecta saltem cervice respirare potuit. Ad vesperam Pharmacopola sequentem clysterem injecit. R̄. rad. bryonia ℥i℥. herb. parietar. beton. agrimon. malv. ā. Mj. flor. sambuci Pj. semin. leni ℥℥. coq. in aq. fontan. q. s. in colat. ℥x. solve mell. anthos. ℥ij. elect. hier. picr. Logad. ℥j. F. Clyster. Mane sequentem potiunculam purgantem sumpsit: R̄. Mann. Calabr. elect. ℥i℥. vini alb. veter. q. s. F. potiuncula: unde aliquoties deiecit. Ad piritam viscidam dissolvendam & bronchia pulmonum obstructa aperienda sequen-

sequentibus remediis usus est. *Rx. aq. antiaſthmatic.*  
*℥ij. elixir. vit. Matthioli, ℥j. cinnam. ℥iij. ſacch. roſat. tab.*  
*℥℔. M. concedatur cochlear plenum pro arbitratu agri. Rx.*  
*ſyr. alth. Fernelii, hyſſopi jujub. ā. ℥j. oxym. ſcyllitic. ℥℔. aq.*  
*cinnam. ℥ij. M. eodem modo uſurpetur. Rx. ſpec. diſſol. ſimpl.*  
*℥i℔. diamb. diamoſch. ā. ℥℔. ol. aniſi gt. viij. ſacch.*  
*opt. aq. ſcabiſ. & cinnam ſolut. ℥iij. F. s. a. rotula pro ar-*  
*bitrio ſumenda. Ex horum remediorum uſu pitui-*  
*tam viſcidam incredibili quantitate exſcreavit, &*  
*quod mirandum aliquot lapillos piſi magnitudi-*  
*ne friabiles exſpuit. Cum melius ſe haberet & li-*  
*berius reſpiraret, ſequens apozema præſcripti. Rx.*  
*rad. enula ℥℔. polypod. quern. liquir. raf. ā. ℥ij. herb. mar-*  
*tub. alb. capillor. Vener. hyſſopi, farſar. ſcabiſ. ā. Mj. flor.*  
*violar. Pj. jujubar. recent. ficum recent. ſiliquar. recent.*  
*ā. ℥ij. coq. in aq. fontan. q. s. in col. Th℔. infund. per no-*  
*ctem folior. ſenn. elect. ℥ij. mane bull. par. in colat. ſolv. ſyr.*  
*ſi. perſicor. ℥iij. F. s. a. apozema, de quo alternis diebus ℥iij.*  
*cum regimine diata magno cum levamine ſumpſit. Inſuper*  
*præſervationis loco aliquoties cochlear plenum*  
*aquæ anti-aſthmaticæ uſurpavit, cujus compoſi-*  
*tionem in exercitat. de paralyſi S. II. propoſui.*

Anno M. DC. LXXI. die XIIIX. novembr. rediit  
 graviffimum hoc aſthma, à quo iſſdem remediis li-  
 beratus fuit, poſteaquam magna in copia pituitam  
 glutinoſam ſubſequutis rurſum lapillis friabilibus  
 exſcreaverit; ſed loco apozematis, à quo abhor-  
 ruit, ſacculum purgantem deſideravit. *Rx. rad. enu-*  
*la ℥ij. cort. tamar. ℥i℔. herb. betonic. agrimon. veronic. pul-*  
*monar. ſcabiſ. farſar. ſummit. abſinth. ā. Pj. folior. ſenn.*  
*elect. ℥i℔. aganic. rec. trochiſc. ℥℔. ſem. ſanic. aniſi. ā. ℥j.*  
*inciſa & contuſa dentur ad ſacculum ex ſindone albo, cui*  
*meſura*

mensura vini albi veteris affundatur, de cujus colatura mane alternis diebus cum regimine dieta ζυψ. sumantur.

Tandem Anno M. DC. LXXIV. die V. Januarii. difficillimum hoc asthma tanto cum impetu ægrum invasit, ut erecta cervice sedens vix ac ne vix respirare potuerit, hinc adhibitis frustra prædictis aliisq; remediis catarrhus suffocans bonum istum Præpositum è medio sustulit.

Miranda lapillorum à pulmonibus per tussim excreatio in memoriam mihi revocavit historiam, quam olim apud Galenum lib. IV. de loc. affect. cap. IX. legi, digna certè, cum Galenus non ad omniū manus perveniat, ut huic observationi annectatur. Βήτων τις ἐκ χρόνου πολλῷ καὶ πύων ὀλίγα καὶ γλίχρα, χαλαρίων μικρῶν παρορμήσεων ἀνέβηξε ἡ. καί μοι κομίσας ἔδειξεν αὐτό. καὶ πάλιν ἕτεροι ὅμοιοι καὶ μὲν πολλὰς ἡμέρας. ἰδοὺ δὲ μοι ξεσπινδρῶν ὁ γλίχρῶν ἐκείνῳ χυμὸς, ὃν ἀνέπνευσεν ἐμπροσθεν, οἷς τοιαύτῳ εὐστασι ἐρχοῖτο. καὶ ἀπὸ τούτων αὐτῷ φάρμακα ἰδίδωσι πίνειν ὅποια καὶ τοῖς ὀφθαλμικοῖς ἀρμόζει. καὶ πίνων γὰρ αὐτῷ, ἰλάττωσα μὲν ἔπνευ. ὅσα χαλαρία, καὶ ἀπὸ πλείονων ἡμερῶν ἢ πρὸσθεν, καὶ μὲν ἐπαύσατό γι πολλοῖς ἔτεσιν πάχων ἕως αἵματι τῆς τελείας. μεγέθει δὲ ὡς ὅσα χαλαρία τοῖς καλυμμένοις ὀφθαλμοῖς ἴσα καὶ ὅσα πλείον, ἔτι δὲ ὅτι καὶ μείζων τότεν ὥσπερ γὰρ καὶ μικρότερον. καὶ ἄλλως δὲ τινες ὁμοίως ἐκείνῳ πίνοντες ἰδρασάμενοι, ἔτι συχνὰ ζήσαντες, ἐνίοις μὲν αἵματι δόποθάνοντας, ἐνίοις δὲ ἐκ ἀναπνευστικῶν ὀργάνων παθεύοντες, καὶ μὲν αἵματι γὰρ τις ἐκ τέτων ἔπνευσεν. Quidam diuturna tussi vexatus & pauca eaq; viscida exspuens, quippiam grandinibus parvis haud absimile excreavit, ac deferens illud mihi ostendit, atq; rursus non ita multo post aliud quoq; attulit. unde conjeci, lentum illum ac viscidum humorem, quem antea exspuere solebat, ad hujusmodi compagem pervenisse: quomobrem medicamentum ei in potu dedi, quod anhelosis auxiliatur: atq; ita factum est, ut minorem exspueret grandinem, atq; longiore quàm antea intervallo, neq;

pluribus



pluribus deinceps annis mitigari potuit affectus, quin tandem moreretur. Caterum grandines ipsa magna ex parte erui magnitudinem aquabant, quamvis interdum majores interdum minores esse viderentur, atq; alios quoq; similiter quidem spueri, sed nihilominus in multos annos vitam extendere vidimus: quorum alii aliam ob causam, alii vero ob instrumentorum respirationi inservientium affectum mortui sunt, quamvis nihil cruoris exscrearent.



## OBSERVATIO XIIX.

*Ranula sub Lingua.*

**N**obilissimi Viri Filiolus octo annorum post exantlatas variolas ranulam sub lingua passus est: cum tumor mollis & laxeus apparuisset, præmisso conveniente medicamento purgante, jussi ranulam scalpello aperire, unde materia albumini ovi è fracta recenter testa fluenti. simillima promanavit. Vulnus sequenti gargarismo sanatum fuit. *Rj. aq. plantag. prunell. sanicul. ʒ. ʒj. mell. rosat. ʒß. F. gargarismus.* In hujus affectus curatione diligenter animadvertendum est, demum ranulæ apertionem esse instituendam, quando manifesta tumoris suppurati indicia apparent, ut sequenti observatione *Thomas Bartholinus centur. I. bistor. anatom. LXXXIIX.* eleganter ostendit. Juvenulæ Uxori Molitoris elapsa æstate post febrem epidemicam sub lingua congestus fuit per *melicaris* tumor ovi columbini magnitudine rotundus, durus ru-

rus rubensque, ut dolore molesto lingua retrorsum protrusa & loquela impedita sit & deglutendi facilitas. Consultus super hoc tumore Chirurgus *Martinus Sixtus* apertionem prudenter subterfugit, quia abscessus necdum maturus totusque rubens, si aperiat, vel inflammationem vel cancrum minaretur. Interea per D. *Jacobum Suabium*, Practicum Urbis eruditum, corpus debita methodo fuit præparatum. Transactis hebdomadis sex ad nos venit, ut præsentibus Medicis Chirurgoque ranulæ huic consuleretur. Vocatus & ego vidi ranulam pallidiorem, digitisque utrinque apposis deprehendi suppuratam esse, materiamque in tunica crassa fluctuare, unde apertionem suasi. Levi scalpelli incisione rupta tunica, qua à venulis libera conspiciebatur, profluxit ilico ovi albumine similima materia, quantum cochleari non ita angusto excipi poterat. Detumuit ranula, & paucis inde diebus in altero latere nova incisione pertusa parrem ejusdem liquoris copiam egressit, sicque liberati suæ reddita lingua & loquelam & deglutitionem more solito promovit.



## OBSERVATIO XIX.

*Pterygium.*

**I**llo novem annorum post superatas magno cum vitæ periculo variolas ex angulo Oculi dextri majore membranula prodiit, quæ ex incuria incrementum sumpsit & pupillam ag-

lam aggressa visionem impedivit. Ad illum vocatus sequentem potiunculam purgantem præscripsi. *℞. folior. fenn. elect. ʒij. sem. fœnic. ʒβ. crem. tartar. ʒij. aq. euphras. betonic. ā. q. s. infund. per noct. mane bull. par. in colat. ʒij. solve syr. flor. persicor. ʒβ. F. potiuncula:* hæc cum levamine ægroti aliquoties repetita, & vesicatorium cervici appositum fuit: postea sequens collyrium usurpavit: *℞. aq. rosar. albar. euphras. ā. ʒvj. fœnic. ruta, ā. ʒiij. vitriol. alb. ʒβ. virid. aris. gr. v. F. collyrium.* hoc cum per duos menses usus fuisset, macula evanuit, & visus magno cum Parentum & ægri gaudio rediit.



## OBSERVATIO XX.

*Gravida menstruata.*

**N**Ovi præclaræ indolis Fœminam, quæ prægnans ordinarium menstruorum fluxum sine noxa vidit, imo cùm aliquando infantem lactasset, statoque tempore menstrua fluxissent, nihilominus illa graviditatis immemor fœtum robustum enixa est. Unde elucescit effatum Hippocratis veritate perpetua non inniti, quando sectione V. aphorism. LX. ait: ἢ γυναικὶ ἐν γαστρὶ ἐχέσθαι αἱ καθαίρειται πορεύονται, ἀδυνάτοι τὸ ἔμβρυον ὕγιαίνουσιν. Si mulieri uterum gestanti purgationes prodeant, impossibile est, factum sanum esse. Hinc rectè illum explicat Galenus, καὶ ὁ καθαίρειται πληθυντικῶς εἰρημνόν, καὶ τὸ πορεύονται μετ' αὐτῷ λεγόμενον, ἐνδείκνυται μὴτε ὀλίγον εἶναι τὸ ἐκχευόμενον αἷμα, μὴ ἅπαξ ἀλλὰ καὶ πολλάκις καὶ πολὺ. Ὁ γὰρ ἅπαξ ἢ ὀλίγος ἐκέρχεται,

καὶ ἐν ἐπιφάνειαι πολλαῖς ἀνδρὶ τῷ περιττῷ ἢ τῷ ἰσχυρῷ.  
 & verbum purgationes numero plurali dictum, & ipsum  
 verbum prodeant, adjunctum, non esse paucum illum, qui  
 excernitur sanguis, neq; semel sed saepius & multum: qui  
 enim semel aut bis parvus excernitur, in multis apparet absq;  
 hoc, quod fœtus patiat. Quapropter de nimio men-  
 struorum profluvio, quo & mater & fœtus ma-  
 gnā virium jacturam patitur, aphorismus inter-  
 pretandus erit.

Simile exemplum observavit Magnus Bartholi-  
 nus centur. III. histor. anatomicar. rarior. XIII. in mulie-  
 re juvencula Hafniensi, quæ quoties uterum gerit,  
 ordinarios mensium fluxus sentit: fœtus inde ni-  
 hil mali patiuntur, quos masculos & robustos fe-  
 liciter eniti solet. Hinc ex acerrimo Tanti Viri ju-  
 dicio aphorismus Hippocrateus non semper succedit  
 in plethoricis, quibus tantum superest sanguinis,  
 ut nisi ille vel venæsectione extrahatur, vel mensi-  
 bus erumpentibus imminuatur, aut abortus peri-  
 culum vel gravidæ exitium immineat; uterum  
 enim pertransire necessum non est, quum ex iis ve-  
 nis profluat, quæ utrinque in uteri cervicem infe-  
 runtur. Cui volupe legat Viri Eruditissimi Joh.  
 Claudii de la Courvee commentarium de nutritione  
 fœtus in utero, ubi totus in eo est, ut demonstret  
 fœtum non sanguine, sed solo chylo  
 in utero nutriri.





## OBSERVATIO XXI.

*Febris quartana.*

**F**ebris quartana Medicorum opprobrium auditur propter *τὸ ἀποκατακλινέσθαι*, quoniam illa medicamentis difficulter expugnatur, hinc multivarias remediorum formulas Experientissimi Practici proponunt & extollunt. Ego quamdiu praxin medicam favente Divini Numinis aura exercui, inter plurima nullum sacculo purgante præstantius remedium observavi, quem illis diebus, quando paroxysmi non urgent, Ægroti usurpant, & postea in brachio sinistro venam aperiunt. Hinc Clarissimi *Mercatoris Filius* viginti annorum præterito anno, posteaquam sequente sacculo usus fuisset, & venam in brachio sinistro aperuisset, à febre quartana liber evasit. *Rj. rad. enulæ ʒij. cort. tamanic. ʒiʒ. arantior. ʒʒ. herb. betonic. agri- mon. veronic. carduibened. summit. centaur. min. ʒ. Pj. folior. senn. elect. ʒij. agaric. recent. trochisc. ʒʒ. cremor tartari ʒiʒ. sem. anisi ʒj. coriand. preparat. ʒʒ. incisa dentur ad sacculum ex sindone albo, cui assundantur aqua fontana ferventis ℥ij. vini albi mediocris ℥ij. infusa stent per noctem, postea manè ʒvj. cum regimine diætæ usurpentur.*


Animus erat, aliquot remediorum formulas Generoso Dn. *Axelio de Taupadel*, REGIS GALLIARVM Colonello, &c. contra febrem quartanam præscriptas, huic observationi etiam annectere, illasque Universi Medicorum Ordinis candido judi-

cio submittere, præsertim cum à Viris fide dignis  
perceperim, remedia coram Nobilissima Uxore,  
Domina Maria ab Erlach, &c. à malevolis Cenfori-  
bus tanto impetu sugillata fuisse, ut etiam prædi-  
cta Matrona omnibus aliàs virtutibus polita, ini-  
quis istis Cavillatoribus aurem præbuerit, & fi-  
dem nimia credendi facilitate adhibuerit. Cum  
autem Dn. Henricus Wentzius Pharmacopœus me-  
dicamenta paravisset, formulas ab ipso severè re-  
petii, qui adhibita omni diligentia illas invenire  
non potuit, hinc sanctè asseveravit, incuria dome-  
sticorū distractas esse, quod etiam præsentibus Vi-  
ris candidis liberè attestatus est. Interim nequa-  
quam dubitandum, Obrectatores istos, antequam  
in meas formulas virgulam censoriam strinxerint,  
illas procul dubio prius inspexisse. Quapropter  
velo pallidæ invidiæ tandem remoto in publicam  
lucem prodeant tetrici Censores isti, & Erudito  
Orbi demonstrent, meam medendi methodum,  
quam cum prædicto Dn. Colonello institui, artis no-  
stræ principiis adversari.



## OBSERVATIO XXII.

*Casus Medicinalis & Responsum  
De Calculis Renum.*

 Ir inclytâ apud nos famâ conspicuus ante  
aliquot annos me invisit, & de symptoma-  
tibus variis conquestus fuit: præmisso  
examine illi indigitavi, verendum esse, ne calculi  
in re-

in renibus lateant; sed ille propter imperiosam *nonnullorum* in arte dictaturam diu anxius & dubius, certam sententiæ meæ fidem adhibere noluit, hinc aliquoties me rogavit, ut enarrata symptomata in formam casus medicinalis redigerem, quem Viro Summo, *Guernero Rolfincio* Professori & Practico *Jenensi* primario transmittere, ipsiusq; responsum præstolari velit. Petitioni amicæ toties repetitæ morem gessi, & indicata symptomata in subsequente casu delineavi.

### *Casus Medicinalis.*

**C**Larissimus Vir triginta septem annos natus, temperamento medio præditus, boni habitus, venis amplis & plenis, jam per multos annos de molesto renum ac lumborum dolore conqueritur, qui inclinato corpore per spinam ascendit. Exacerbatur iste dolor circa easdem partes; si motu vehementiore corpus exerceat, aut equo insideat. Dolor juxta regionem renum est divellens & corrodens, qui per tres vel quatuor aut plures horas durat, præsertim dum equo iter facit, quo etiam tempore urinam turbidam, rubram & arenosam excernit: si postea supinus jacet aut cibum assumit, dolor remittit: quando dein rursus equum ascendit, dolor recrudescit, similisque urina per octo dies continuos observatur. De tali dolore quotidianas movet querelas Æger, licet nulla antecedit corporis exercitatio, sed non tam fortis est, nec urina tam rubra & arenosa sed saltem turbida, arenulis tincta & ad instar cerevisiæ benè defeca-

tæ conspicitur, quæ sæpius sponte remittit, & tunc pellucida apparet. Quam statim prandium assumptis, dolor remittit, sed vesperi ad horam quintam vel sextam revenit, tamque diu durat, donec cœna finita sit. Perseverante dolore aliquando unus, aliquando testiculi ambo dimidia ex parte retrahuntur, sed magis dexter quàm sinister, ibique sine nausea & vomitu manet, donec dolor cessaverit, qui etiam instar colicæ spuriae ad umbilicum usque extenditur. Quando Æger poculum hilaritatis cum amicis assumit, dolor est acerbior, & ad inguina pedesque extenditur. Acerbissimus dolor urget, dum longius iter suscipit, hinc aliquando urinam cruentam reddit, sic ut lintheola intincta colorem sanguineum referant. Si propter graviores causas urinam spontè supprimat, sine mora dolorem in renibus sentit; quàm statim autem urinam reddit, ille etiam mox cessat. Arenulas absque dolore excernit. Tandem si Æger diutius insistat pedibus, dolor ad lumbos extenditur, Quod Ægroti reliquam corporis dispositionem spectat, ille benè appetit, cibos assumptos ventriculus retinet, nec vigilias nec sitim patitur, mane è lecto surgens, uri & sæpe vesperi, alvum reddit, sed excrementa fluida sunt. Propter hæc molestissima symptomata Ægrotus consilium medicum efflagitat, & cum magno desiderio expectat.

Viri





Viri Summi  
GVERNERI ROLFINCI  
Responsum.

**A**ffectus, ægrum qui affligit, est dolor nephriticus, fomitem habens calculum renum. Hunc adesse manifestum faciunt signa pathognomica, decenti serie in historia proposita. An unus adsit calculus an plures? dubitari potest. Verisimile est adesse calculos majusculos, qui ob molem in ureterem perrumpere non possunt, adesse etiam minores non silicæ duritie sed sabulosos, qui arenularum in morem secedunt.

Pars affecta an unus sit ren & quisnam, an dexter an sinister, an uterque? difficile fuit ab initio artificiosa conjectura consequi, inde molestus renum & lumborum dolor in genere tantum in historia appellatur; in progressu contextus tamen scribitur, post equitationem in utroque rene dolorem perferri: verisimile autem illum affici, in quo tristis sensio magis advertitur. Accusabimus unum solum renem. Verendum est, ne unus magnus vel plures calculi hæreant in parenchymate seu carne renum sub membrana. Talis occurrebat in apertis exuviis Illustris *Vippachii*, habens apicem acutum incurvum, pluribus minutis lapillis in pelvi & prope carunculas stipatum, qui modò integri modò resoluti in arenulas excernebantur. Tales parvuli sine dubio in pelvis aliquo angulo pro-

pe carunculas in nostro Ægro etiam delitescunt. Vesicæ calculum non admittimus, licet arenulæ per illam transeant.

Causæ coagmenti hujus lapidosi sunt collectiones mucilaginosæ & tartareæ, cum alimentario sanguine per emulgentes arterias ex arteria magna ad renes delatæ: eos pellunt partes robustiores & renes debiliores recipiunt: ad concretionem eas promovet lapidifica renum dispositio. Curiosis relinquimus sollicitas meditationes de acidis vel solis vel cum alcaliis renum succis permistis.

Symptomatum ratio digna est, quæ expendatur. Dolorifica tristis sensio oritur à violento continuum membranarum partium solvente objecto. Quod inclinato corpore dolor per spinam ascendat, adscribendum est consensui membranarum, quæ à lapillis tensæ offenduntur. Exacerbatio doloris à motu vehementiore & præcipue in equitatione, ita ut dolor videatur divellens & corrodens, debetur læsioni earundem membranarum & quidem in utroque rene. Propter singularem renum consensum [ heic videt *nonnemo*, Summum istum Virum meam de renum sympathia sive consensu singulari sententiam etiam approbare, de qua superius in *observatione secunda* disserui. ] spero unum renem solum per essentiam esse affectum, alterum compati. Cum sabulum transit ex substantia & carunculis in cavitatem & pelvim, vel ab hac ad ureteres se movet, & tensione continuum solvit, *istud* & motu hoc dolor fit acutus & lancinans. Urina turbida & arenosa comitatur hunc dolorem post equitationem interdum per octo dies

dies continuos, ob fabuli & limosarum crudita-  
tum permissionem. Quemadmodum dolor à mo-  
tu exacerbatur, ita quiete sopitur, si raro exemplo  
supinus decumbat vel cibum assumat Æger: nam  
alias sumpto cibo exacerbatur dolor à calculo, re-  
nes enim distento ventriculo & intestinis compri-  
muntur, sicque dolor augetur, evacuato autem  
cibo mitigatur. Heic contrarium accidit: forsan  
calore ciborum fomentatur dolor renum, eorumq;  
molestus sensus mitigatur: non uno semper Natu-  
ra incedit tramite. Dolor nunquam in totum re-  
mittit, sed de eo continuè conqueritur Æger, licet  
nulla vehemens corporis adsit exercitatio, quia  
calculus semper præsens est. Tam fortis tamen  
haud est, nec urina tam rubra & arenosa, est saltem  
turbida, arenulis tineta, & ad instar cerevisiæ benè  
defæcatæ apparet, quæ tamen sæpius sponte re-  
mittit & tunc pellucida videtur: remittentibus  
enim causis effectus mitior evadit. Cur quamprimum  
prandium assumpsit, dolor remittat? sed ve-  
speri ad horam quintam vel sextam redeat, tam-  
que diu duret? donec cœna finita sit, difficile est in-  
dagatu. Retractio testiculorum, modò unius, mo-  
dò amborum refertur ad distentionem membra-  
narum & musculorum cremasterum irritationem.  
Cur altius dexter quàm sinister retrahitur? Forte  
hic testis est propinquior reni, qui lapillis plenus  
est. Nausea & vomitus familiaria moto calculo  
symptomata cur absint, etiam præsentè retractione  
testiculorum, mirum: referri potest ad robur  
ventriculi quoad retentricem facultatem. Colicæ  
simile quid adest ad umbilicum extensum ob

D 5 membra-

membranarum consensum. Quando æger poculum hilaritatis assumit cum amicis, cur dolor est acerbior, & ad inguina pedesque excernitur? forte à potu ad vesicam inclinante dum vestigal in transitu renes avidius exigunt, hi distenti comprimunt lumbarem muscolum, qui appellatur *ψόας* & ob nervorum plurimorum præsentiam *υποπόντης*: inde calamitas nova. Urina cruenta sequitur longum iter, vasa enim renum atteruntur. Suppressionem urinæ voluntariam studio affectatam excipit dolor, impeditur enim successio exitus in renibus. Excretio arenularum indolens est, sunt enim exiles, neque ulla inde nec in renibus nec in ureterum in vesicam obliquo ingressu aut in urethram transitu remora. In erecto corporis statu diuturno quod dolor ad lumbos extendatur, rationem habet in muscutorum lumbarium tensione & inde orta nervorum compressione. Quod naturales & animales functiones bene habeant, argumentum est Divinæ bonitatis & naturæ benè moratæ.

De Eventu Æger absque dubio erit sollicitus, omnimoda affectus ablatio non promittitur, sed mitigatio incrementi & dulcedo vitæ calamitosa sequenti methodo pollicetur.

Curatio instituenda est methodica, nulla enim spes affulget beneficio solius naturæ restitutionem in integrum obtineri: est quidem hæc medicatrix morborum sed non omnium & omni tempore, consiliis opus erit & auxiliis, deferenda nunquam statio, etiamque incurabilibus manus admovenda est. Arenularum excretio adjuvanda, majores lapilli

pilli, qui integri per ordinarios meatus educi non possunt, lapidem frangentibus modeste sollicitandi, utque per ureteres, vesicam & urethram egrediantur, laxantibus via ipsis paranda; neque his solis insistendum, sed tota massa sanguinea à sæculentis & tartareis succis mundanda, intemperies & infirmitates viscerum tales generantium è medio tollendæ, justusque virium tonus conservandus est.

Materiæ ex Chirurgico fonte nullum heic videntur habere locum, nisi transpositionem lapillorum molientes de uno loco in alium, si forte impacti vel circa pelvim, vel in ureteribus tristem sensationem excitent. Consistit hæc in motu aliquo lumborum super osse sacro, flexione & extensione dorsi, vel cucurbitulæ ureterum regioni applicatione cum multa flamma.

Purgantibus heic non opus esse videtur, cum Æger alvum habeat satis lubricam & officio suo, mane cum è lecto surgit, uti & sæpe vesperi, fluidis excrementis respondentem: tentari tamen verno & autumnali tempore posset generosior aliqua evacuatio, secundam & tertiam regionem stimulans. Doloribus urgentibus non abhorreat Ægrotus à clysteribus laxantibus & dolores mitigantibus. Diuretica validiora non conveniunt, abstergunt enim mucum, qui lapillis adhærere & sensiles meatus adversus illorum asperitatem munire & defendere novit. Econtra commendantur, quæ vias urinarias laxandi & leniendi vi prædita sunt: tale est decoctum cicerum rubrorum, malvæ, althææ, in jure pingui cum multo butyro paratum, etiam

etiam oleum amygdalarum dulcium recenter expressum cum vino albo calefacto haustum prodest. Aqua è succo betulae destillata magni aestimatur. Remedia plurima lapidem frangentia vulgatae sunt notitiae. commendatur à me inprimis essentia lithontriptica transmissa, sumantur guttulæ sedecim in jure carnis cum radicibus vulgaris petroselini coctæ hora matutina nona: deinde commendatam habeat Ager transmissam misturam nephriticam, sumantur guttulæ viginti in haustulo vini tenuis albi hora pomeridiana quarta. Principio prandii in cochleari jusculi de missa tinctura guttulæ quatuor sumantur, nec non in alio cochleari jusculi per vices loco essentiae lithontripticae assumatur de sale nephritico transmissio, quantum cultelli cuspis capere potest. Externa ut infusus & inunctiones non negligenda sunt.

Diæta justis modis temperetur. Victus sit mediocris, consistens in cibis liquidioribus & solidioribus boni succi & facilis concoctionis, spirituosæ & carnosæ substantiæ effluvium reparantibus & facilitatem alvi conservantibus. Carnes bovinæ juniores vel gallinarum coquantur cum radicibus raphani, cujus esus semper magni aestimatus in *Apollinis Delphici* templo & aliis cibis prælatus, inde senserunt aliquot ægri utilitatem, proderit etiam nostro, sed observanda est cautela, ne nimia coctione salia pereant volatilia. Dictum sibi putet Ager: *non repleti alimentis, sed sobriè vivere*. Cibi aromaticum ubertate non luxurient. Pruna dulcia vulgaris & brigniola cocta, nec non turiones asparagi & lupuli primo vere profunt. Excludatur à mensa panis

panis confectus ex frumento vel tritico eorumque farina molarem expertus lapidem friabilem, hic enim à fermento ventriculi acido resolutus lapidosum seminarium in renes deponere potest. Aceti & imprimis rubi idæi baccis concinnati in edomando coagmento lapidoso vis magna apparet, uti enim in magno sic etiam in parvo mundo fabulum atterit. A vinis generosis sibi temperet Æger, quippe solent generosum & subtilem tartarum renibus communicare, econtra eligat vinum tenue parum aquæ ferens. E culina relegentur aquæ tophacæ & per plumbeos canales ductæ. Somni & vigiliarum iusta adsit vicissitudo, si noctu somnus desit, die illius defectus refarciatur. Motus corporis cum nocere observetur, caveatur nimius in rheda velequo, non tamen planè omittatur, moderatus enim prodest, nam arenulis, quæ ocio facile subsistunt, exturbandis conducit. Urinæ excretio non retardetur, violenta retentio à conversatione nonnunquam injuncta vel à pudore imperata caveatur. Solitam alvi pronitatem debitis mediis Æger conservet, & Venereis desideriiis dicam scribat.

## OBSERVATIO XXIII.

*Convulsio comitialis.*

**R**P. Ignatius Brummerus Asceta Lüccellensis, ex mandato Reverendissimi & Amplissimi Domini BERNHARDINI Abbatis Lüccellensis

*Lucellensis & Maulbrunnensis*, REGIS GALLIA-  
RVM Consilarii, Domini sui gratiosi, Fautoris  
quondam mei summi, superioribus annis ad me  
venit, & propter diversos comitialis morbi insul-  
tus operam meam sollicitavit. Fomitem harum  
convulsionum epilepticarum in ventriculo latere  
inde persuasus fui, quoniam æger per intervalla  
dolorem & arroSIONē in stomacho sensit, & de ap-  
petitu prostrato ac concoctione debilitata conque-  
stus fuit. Purgavi illum ter cum *extracti catholici*  
*scrupulo uno*: dein jussi, ut sequentes pilulas usurpa-  
ret. R̄. *extr. catholic.* ℞j. *cochiar.* ℞b. *aurear.* ℞j. *helleb.*  
*nigr.* ℞b. *ol. still. major.* gt. iij. *misc. dilig. form. pil. ex* ℞j.  
*num.* xvij. *de aur.* & *consperg. pulv. cinnamomi.* Sum-  
psit singulis mensibus octodecim mane cum regi-  
mine diætæ, unde æger convaluit, & per plures  
annos à convulsionibus epilepticis liber fuit. In  
hac cura *Galenum* sequutus sum, qui etiam per  
*aloetica* remedia motus convulsivos à ventriculo  
oriundos sustulit, quemadmodum elegantihisto-  
ria lib. V. de loc. affect. cap. V. confirmat, *ἐάντις τις*  
*ἡλίσκει τῇ τῆς ἐπιληψίας πάλι γραμματικῶς, ἥτοι μάλιστα*  
*σφοδρότερον. ἰδίδασκεν, ἢ ἐφρόνηται ἢ ἐπὶ πλείονος ἡσυχασεν, ἢ ἰσχυ-*  
*μέθη. τότε τὸ εἶσμα τῆς κοιλίας ὑπενόησα πάχειν. Διούδηθεν*  
*ὑπάρχον, ἐφ' ᾧ καὶ συμπάθειαν τὸν ἐγκέφαλον, ὅλον τὸ σῶμα*  
*καταδραμεῖν παρὰ τὸν ὄλον. ἐκίλδονα τοιγαρὺν ἐπιληψίας νόσος αὐ-*  
*τὸν ἀκρίβως πρὸς τοῦτο. τέτταρς δ' ὥρας ἢ τετάρτης ἄρτοι ἐπιμα-*  
*λῶς ἰσχυρὰσθῆναι παρὰ τὸν ὄλον, κόνον μὲν ἐν ἀδελφῶς ἐν, δι' ἧς δ'*  
*αἰδανόωμεν, ἐξ ἧς κεκαρμένον τῶν ἡρίων σφοδρότων καὶ λελκῶν,*  
*ἔτοι γὰρ καὶ τοῖσι τῶν γαστρίων καὶ τῶν κεφαλῶν ἐν πλείονος, ὥστε*  
*οἱ σφοδροὶ. ὡς δ' ἐπὶ αὐτῷ πρὸς τοῦτο συνίστανται μὴδὲν πάχειν.*  
*ἀκρίβως τε γινώσκον ἔχον ὅτι ἰσχυρὰσθῆναι ἔμπεδον. ἰδίδει τ' ἐπὶ*  
*τῇ αὐτῇ τῆς ἀλόνος πικρῇ φαρμακῶν ὅτι καὶ τῆς ἐκαστης, ἰπει-*  
*δὴ καθαίρει τὴν τῶν πρὸς τῆς κοιλίας τῶν γαστρίων καὶ ῥῶνισι παρὰ*  
*τὰς ἐκείας ὑπερβίας. ἔτερον ἔστιν ὅτι ἀνὴρ οἱς ἐπὶ τοῖς, πλείονος τῶν*



εἴκοσι, ὅγινον ἀμέτρητος διέτλειεν. Grammaticus quidam  
 Juvenis, quoties vel nimis vehementer doceret, aut cogitaret,  
 aut in ediam sustineret, morbo comitiali corripiebatur: per-  
 pendit equidem in hoc os ventriculi, utpote quod facile sentiret,  
 affectum esse, ac deinde per consensum & totum cerebrum &  
 corpus universum convulsione concuti, cui probam concoctio-  
 nem accurate procurare, ac tertia vel quarta hora panem  
 optime preparatum exhibere jussi, atq; hunc quidem solum,  
 si non fuisset, si vero siti cruciaretur, ex vino madidum & qui-  
 dem albo atq; modicè stringente, nam hujusmodi vinum, ut  
 ventriculum robustum efficit, ita haudquaquam tentat caput,  
 id quod facere solent ea, quæ vehementes vires obtinent. Itaq;  
 cum hac victus ratione utens non ut ante afficeretur, exactam  
 jam notitiam me habere arbitratus sum, eorum quæ prius sola  
 conjectura consequebar. Hinc quolibet anno bis aut etiam  
 ter medicamentum amarum ex aloe ei exhibui, totum enim  
 ventrem à recrementis purgat, & ad proprias actiones corro-  
 borat. Sic Vir ille viginti & amplius annis, quibus postea su-  
 perstes mansit, integra inculcataq; valetudine vitam exegit.  
 Quemadmodum in hoc Asceta Lucellensi & Juvene  
 Grammatico convulsiones epilepticæ ex ventriculo  
 originem duxerunt, ita apud alios è partibus aliis  
 ortum traxere. Thomas Bartholinus centur. III. histor. XX,  
 accusat hepar in Pastore Hafniensi, nam à dextro hy-  
 pochondrio, ut hepatis est sedes, invasit illum ca-  
 lor per musculos externos sensim adscendens cum  
 partium per quas transit stupore, ad musculos tho-  
 racis ejusdem lateris, ad brachium dextrum, ad  
 dextram faciei partem & collum, ubi pedem quasi  
 figebat stupor, faciei muscoli ad dextrum latus le-  
 viter convellebantur, eodemque modo paroxys-  
 mus iste sæpius recurrebat, ut gravioris convulsio-  
 nis

nis metus ingens ægro sit ortus. Sed sectâ venâ,  
injectis clysteribus, exhibitis pulveribus & aquis  
anti-epilepticis operâ D. Mothi Medici felicissimi  
intermiserunt paroxysmi,

*atq; metus omnes & inexorabile fatum*

*subjectum pedibus strepitusq; Acherontis avari.*

Sic fomitem mali caduci aliquando sub latere in  
liene advertit *Nicolaus Tulpius lib. I. observat. medic.  
cap. IX.* Lien à turgido atræ bilis fermento tumidus  
diffudit ilico ex se vapores cerebro tam inimicos,  
ut Juvenis Patritius quidam protinus concideret  
in vehementissimos morbi comitialis insultus, exci-  
tatos non tantum à causâ interna sed subinde  
quoque ab externa; nam pressa vel solo digito re-  
gione lienis contrahebantur ilico omnes nervi, &  
sequebatur confestim miserabilis universalis cor-  
poris distentio, lædens iteratis suis circuitibus us-  
que adeo mentem jam aliquoties labefactatam &  
imprimis vim ipsius imaginatricem, ut crederet se  
nescio quem regem, distribueretque non minus  
largiter qualiacunque munera, imò integras regio-  
nes, ac si revera rerum potitus esset: insidente ipsi  
hac conceptæ Majestatis opinione adeò profundè,  
ut summè excandesceret, corripereturque gravissi-  
ma epilepsia, si quis majestatis oblitus ipsum com-  
pellasset nomine usitato, ceu inferius dignitate sua  
ratus alio quàm regio insigniri titulo: impositis  
intetum familiæ suæ amplissimæ promiscuis quo-  
rumcumque animalium nominibus, quæ semel  
data tam firmiter memoriæ mandavit, ut nun-  
quam deinceps exciderint, licet quis peregrè ab-  
fuisset: quòd si vero quis loco ursi, felis, canis,  
draconis,

draconis, aut leopardi desideraret proprium sibi nomen restitui, eum reddebat ilico voti compotem, modò donaretur aliquo munere, qua facilitate ab amicis observata redemere plerique omnes ignominiosa illa nomina, eaque donis illorum imposita retinuit invicem tam stricte, ut etiam post plures menses recordaretur nominatim, quod quisq; munus vitandæ ignominiaë ergo obtulisset.



## OBSERVATIO XXIV.

*Puella octennis menstruata.*

**P**Ræclarissimi Mercatoris *Basileensis* Filia octennis, facie pallida & corpore macilentò, fluxum sanguinis inopinatè passa fuit. Parentes consternati me vocarunt, indicavi illis, fluxum hunc sanguinis menstruum esse, & serum acre vasa uterina aperuisse: duravit ista fluxio per tres dies & postea sponte cessavit. Parentes perterrefactos similibus aliorum Medicorum observationibus erexi. Sic *Fernelius* & *Gesnerus* puellam eodem anno octavo ætatis menstruatam observarunt, imò *Hercules Saxonia lib. IV. practic. medic. cap. XXIII.* refert, se novisse puellam, cui menstrua quinto ætatis anno apparuerunt, & ordinatim singulis mensibus modicè fluxerunt.



## OBSERVATIO XXV.

*Ramus venæ arteriosæ rejectus.*


**V**iri Amplissimi DN. JACOBI BRANDMYL-  
LERI in Academia nostra Jurium Ante-  
cessoris celeberrimi Mater, Matrona ho-  
nestissima, per multos annos phthisica, postquam  
consiliis nostrorum Medicorum diu usa fuisset, tan-  
dem etiam meum auxilium desideravit. Cum  
omnia signa phthisicos ab ulcere pulmonum ortæ  
animadvertissem, & illa multivariis remediorum  
formulis defatigata plurimorum medicamentor-  
um apparatus respuisset, ipsi sequens electua-  
rium exulceratis pulmonibus maximè proficuum  
præscripsi. *℞. rad. liquir. ras. ʒ℔. ireos florent. ʒij. juj-  
bar. recent. par. vij. herb. pulmonar. farfar. scabios. ā Mj.  
incisa coq. in aq. font. ad ℥℔j. decoctum coletur & clarifice-  
tur, addita q<sub>3</sub> sacchari libra una ponderq<sup>3</sup> commun. denuo coq.  
ad consistent. syrupi, cui admisce pulmon. vulp. præpar. pulv.  
ʒj. conf. rosar. rubr. betonic. ā ʒvj. spec. diatr. simpl. ʒij.  
diatrag. frig. ʒj. diarrhod. abbat. ʒ℔. ol. anisi. ʒj. F. electua-  
rium.* Ex diligente hujus electuarii usu non con-  
temnendum levamen Ægrotæ sensit, nam majori  
cum facilitate materiam pulmonibus impactam  
excreavit & liberius respiravit, sic ut nocte, quas  
plures propter continuam tussim insomnes tradu-  
xit, quatuor & quinque horarum spacio dormire  
potuerit. Annotatu dignum est, quod illa aliquot  
ante beatum obitum septimanis ramum venæ ar-  
teriosæ

teriosæ à pulmonum parenchymate liberum & nudum rejecerit, huic prope similem, qualem *Thomas Bartholinus* centur. III. *hystor. anatom.* XCIIX. delineare curavit. Ferè fidem superat apud antiquâ fide spectatum Consulem & Archiatrum *Nicolaum Tulpium* lib. II. *observat. med.* XIII. Navarchus *Ambstelredamensis*, qui diu in mari vivens ætate jam maturus ex perenni destillatione tussim magis terra quàm mari molestam contraxit, qua per biennium flaccidos pulmones exagitante, tandem viscus hoc plus nimio debilitatum defecit: hinc effudit inopinatò non tantum sanguinem, sed præterea duos insignes venarum ramos, adæquantes singulos *expansæ* manus magnitudinem, prodibant autem spontè ab omni parenchymate, ostendentes non minus distinctè extrema sua lineamenta, ac si otiosus Anatomicus circumpositi visceris impedimentum removisset, argumento certè evidenti, totum pulmonem fuisse vitiatum, ac proinde haud mirum, excretis hisce surculis ipsam cum sanguine vitam effudisse.

~~~~~

## OBSERVATIO XXVI.

*Odontalgia.*

 Odontalgiam tollendam multivaria medicamenta proponuntur, ut nemo sit, qui dolori dentium mitigando suam operam non conferat. Ego quamdiu praxi Medicæ incumbō, nullum præstantius remedium laudano meo

opiato comperi, soleo granum noctu concedere, unde placidus surrepit somnus & mane omnis dolor evanescit. Formula laudani mei opiati sequens est. *℞. extr. opii ʒij. croci. gr. v. succin. alb. præpar. corall. rubr. præpar. margarit. præpar. ā ʒ℥. lapid. bezoar. oriental. gr. iij. F. s. a. massa, dosis est granum unum.* In omnibus affectibus, ubi illius mentionem facio, tutò concedi potest.

Vir Summus *Thomas Bartholinus*, quum illi excavatus dens inferioris maxillæ postremus impensè doleret, varia pro sedando dolore obtundendoque sensu nervuli externis injuriis patentis applicavit, quæ vel ratio vel visitantium amicorum consilium suggessit, imò quæ aliis proficua expertus fuerat, illum sublevare non poterant, nempe oleum caryophyllorum, oleum vitrioli, spiritus vini, nicotiana, decoctum hyssopi & salviæ, lac, theriaca, semen staphisagriæ & sexcenta alia communi usu probata. Ex unico alumine solatium invenit, quod ignitâ scutellâ fustum in pulverem redegit, cumque nuce moschata & mellis sufficiente quantitate in mortario in linimenti formam permiscuit, quo per vices partem dolentem inunxit non vano successu, sopiti enim dolores & nox quieta fuit. Unde ansam mihi præbuit *Bartholinus*, quòd & ego hoc remedium in odontalgia aliis suavissem, qui in acerbissimo dentium dolore tollendo præclaram illius & laudani mei opiati efficaciam deprædicarunt.



## OBSERVATIO XXVII.

*Secundinarum retentio.*

**M**ulieri puerum feliciter enixæ in utero secundinæ morabantur, cum nulla alia remedia ad manus fuissent, illa pulveris mei sternutatorii modicum naribus attraxit, unde aliquoties sternutavit, & me adhuc præsentem secundinas excrevit. Formula pulveris mei sternutatorii sequens est. *℞. rad. pirethr. herb. tabac. indic. flor. lil. convall. rorismar. betonic. major. ʒj. F. pulvis subtilissimus.* In hoc casu sequutus sum dictamen Hippocratis *sect. V. aphor. XLIX.* *ἡ ὑστερίων ἐκπύσις πλασματικὴν περὶ τοὺς ἐκ τῆς μήτρας καὶ τὸ σῶμα. ut secunda excidant, sternutatorio indito nares & os apprehendito.* Quæ verba etiam *lib. II. popular. sect. V. §. XLIII.* reperiuntur. Eleganter rationem exponit Galenus in *commentar. sect. V. aphor. XXXV.* αἰκοὶ τῆς ὀφελείας, ὅτι τῷ σφοδροτέρῳ κίνησιν καὶ βρασμῷ τὸ τοῦ μὲν ἰσχυροῦς τῶν φύσιν, τὸ δὲ ἐκκεῖναι τὰ δυσ-εκλείτως ἐμπιπαραδῶν τοῖς μορίοις τὸ σῶμα. Causa ob quam sternutatio juvat, est, quia vehementiore concussu & agitatione partim quidem naturam excitat, partim verò excernit, quæ partibus corporis firmiter infixæ adharebant.

Si ope pulveris sternutatorii secundinæ non exeant, suadeo Junioribus Medicis, ut pulverem Clarissimi Heurnii concedant, quem in dicti *apborismi commentario* proponit, & cujus usu plurimas mulieres propter retentionem secundinarum periculose decumbentes Summi DEI beneficio

(Heurnii verba repeto) à morte liberavit. *R.* cinnam. elect. *℥iiss.* myrrh. opt. *℥ij.* succini alb. *prapar.* *℥iiss.* rad. rubia tinctor. castor. *ā* *℥j.* borac. *℥℔.* croci gr. v. *F. pulvis subtilissimus.* Dosis est drachma una cum vino, cui saccharum adjectum fuit. Vel præscribantur formulæ duorum remediorum à Magnifico Tulpio lib. IV. observat. medicar. XLII. propositæ. *R.* borac. Venet. succini alb. *ā* *℥j.* cassia lign. castor. *ā* *℥℔.* *F. pulvis.* *R.* rad. gramin. pæon. scorzoner. cichor. *ā* *℥℔.* herb. acetos. endiv. borrag. meliss. *ā* *℔℔.* artemis. carduibened. *ā* *Pj.* borac. Venet. *℥iiss.* coq. in aq. hord. ad *℔℔j.* colat. ad syr. artemis. citri *ā* *℥j.* *F. potio pro tribus dosibus.* Ex horum medicamentorum usu observavit Tulpius, puerperas plurima laceræ membranæ frustra, sanie ac sordibus undique infecta, excrevisse, iisque exoneratis amissam sanitatem sine minima virium aut valetudinis jacturâ recuperasse.



## OBSERVATIO XXIIIX.

*Ascites.*

**P**Ræcipuum Familiæ nostræ Ornamentum, DN. PETRUS SARASINUS, Mercator integerrimus, mense Januario Ann. *clōlōc* LXII. inopinatò tumorem abdominis accrescentem in semetipso animadvertit, quem difficillima respiratio, tussis molestissima, appetitus prostratus, palpitatio cordis ingens & pauca urinæ redditio comitabatur. Ex intimo amore erga Avunculum, Patris loco mihi honorandum, ductus, nolui propter.



pter periculosa symptomata solus curationem inchoare, hinc Vir Clarissimus DN. FELIX PLATERUS, meus in officio Archiatri Antecessor, etiam accersitus, simulque consilium à Viro Excellentissimo DN. MELCHIORE SEBIZIO, Medicinæ Doctore & Professore in Academia *Argentoratensi* celeberrimo, Sene gravissimo, expetitur fuit, quod lectu & prælo dignissimum huic observationi subnectam. Bono cum DEO initium curationis die XVIII. Januarii cum seq. elixire purgante fecimus. R̄. mag. rad. jalap. gr. X. elix. vita Matthiol. 3j. solvatur ad ignem & cum julepo rosato edulceretur: ex hujus usu duæ circiter mensuræ humorum serosorum ac biliosorumeductæ fuerunt. Die XIX. sequentem sacculum contra obstructions viscerum abdominis principaliorum præscripsimus. R̄. rad. enulæ 3iij. fœnic. cort. tamar. sambuci, ebuli, ā 3ij. herb. betonic. marrubii alb. scabios. ceterach. ā Mß. summ. centaur. min. absinth. ā Pj. rhabarb. elect. 3vj. cremor. tartari 3ß. sem. anisi 3ij. incisa dentur ad sacculum ex sindone albo, cui affundantur duæ Mensuræ vini albi mediocris: de hoc mane & vespere cyathum plenum Ager bibit. Die XXI. ob molestissimam respirationis difficultatem & suffocationis metum sequentes rotulæ præscriptæ fuerunt. R̄. confect. alkerm. 3j. spec. diatrios simpl. 3jß. diarrhod. abb. 3ß. ol. anisi gt. vj. sacch. opt. aq. scabios. solut. 3iij. F. s. a. rotulæ. Propter permanentem abdominis tumorem sequentes pilulas usurpavit. R̄. mag. gutt. gamandr. gr. viij. ol. caryophyll. gutt. ij. F. cum mucilagine gummi tragacanthi pilulæ vij. deaurentur & sumantur mane cum regimine dietæ: ex harum usu humores serosos abundantissimè per alvum deiecit, hinc meliusculè

se habuit Æger, majori cum facilitate respiravit, & tumor abdominis aliquantulum imminutus fuit, unde ad reliquias humorum serosorum tollendas, die XXVI. Januarii, prædictæ pilulæ repetitæ fuerunt, quarum ope rursus incredibili copia serum evacuatum fuit: cùm inde abdomen manifestè detumuerit, naturæ in assumendis medicamentis quietem meritò concessimus. Verùm die VI. Februarii rursus vocati observavimus prænominata symptomata novos insultus minari, hinc sacculum purgantem, humores peccantes aliquot vicibus educentem, præscripsimus. R̄. rad. squilla præparat. bryonia, cort. tamaric. cappar. ā ʒij. herb. hepatic. nobil. marrubii albi, farfar. beton. summit. centaur. min. absinth. ā Pj. rhabarb. opt. ʒiʒ. cremor. tartar. ʒj. mechoac. opt. ʒʒ. rasur. ebor. ʒij. sem. anisi ʒj. incisa dentur ad sacculum ex sindone albo, cui mensura vini albi affundatur, de quo singulis vel alternis diebus mane ʒvj. cum regimine diata bibantur. Ad viscerum & virium robur conservandum die X. Februarii sequentem trageam & electuarium consulimus. R̄. spec. diarrhod. abb. ʒj. diatrionfantal. aromat. rosat. ā ʒʒ. ol. cinnam. gut. iij. sacch. rosat. tabul. ʒiij. F. s. a. tragea. R̄. conserv. rosar. rubr. ʒj. borragin. betonic. ā ʒʒ. roob. ribium ʒvi. confect. alkerm. ʒj. spec. diarrh. abb. diatrionfant. diamargar. frig. ā ʒj. syr. farfar. q. s. F. electuarium, de quo pro lubitu quantitas nucis moschate sumatur. Cùm porrò Æger urinam parcè redderet, & omnimoda illius suppressio pertimescenda esset, ad urinam ciendam & humores serosos per vias urinarias educendos sequentia remedia à nobis præscripta fuerunt, quorum usum per aliquot septimanas continuavit. R̄. rad. bryon. ʒj. herbar. parietar. marrubii alb.

*lil. alb. agrimon. betonic. ā Mj. flor. sambuci Pij. sem. anisi*  
*3ij. coq. in aq. font. q. s. in colat. 3x. solv. mell. anthos. 3ij.*  
*elect. bened. laxativ. 3j. tercbinth. cum vitell. ovi solut. 3ij.*  
*F. clyster: qui aliquoties repetitus fuit. R. sal. ononid.*  
*fabar. ā 3j genista, absinth. ā 3ß. F. pulvis dividendus in no-*  
*vem doses æquales, quarum una mane & vespere in jusculo*  
*carneo sumatur. R. cinerum surcul. juniper. stipit. fabar.*  
*absinth. ā 3ß. aq. sambuc. ebul. vini alb. veter. ā 3iiij. bul-*  
*liant par. postea colent. aliquot. ad form. lixiv. in colat. sol-*  
*ve sacch. rosat. tabul. 3j. aq. cinnam. 3ß. F. potio pro tribus*  
*dosisibus matutinis. Ex horum remediorum usu majori*  
*cum levamine & quantitate urinam Æger reddi-*  
*dit, sed nihilominus tumor abdominis non decre-*  
*vit: hinc die XXI. Martii pilulas ex mag. gutt. gamandr.*  
*rursus usurpavit, simulque iterum humores sero-*  
*fos incredibili copia per guttur inferius dejecit;*  
*unde cum à solis istis pilulis manifestum levamen*  
*animadverteret æger, omnibus modis rogavit, ut*  
*illatum usum ipsi porro permetteremus, quapro-*  
*pter illas die XXVII. Martii & II. Aprilis repetivit. Ad*  
*vires roborandas die VII. April. sequentia remedia*  
*præscripta fuerunt. R. aq. cardiac. offic. in exercit. de*  
*apoplex. S. XI. proposit, betonic. scabios. ā 3ij. sacch. rosat.*  
*tab. 3ß. margarit. prepar. 3j. F. cardiacum. R. syr. jujub.*  
*farfar. alth. F. ā 3j. ambr. gris. gr. ij. moschi oriental. gr. j.*  
*aq. scabios. 3ß. Misce. Cùm die VIII. Aprilis urinæ sup-*  
*pressio metuebatur, sequens julepus & clyster præ-*  
*scriptus fuit. R. aq. fragar. ononid. malue, ā 3ij. syr.*  
*alth. Fern. citri. ā 3iß. F. julepus pro duabus dosisibus. R. rad.*  
*bryon. 3j. ononid. lil. alb. ā 3ß. herb. heder. terrest. betonic.*  
*agrimon. parietar. ā Mj. flor. sambuc. Pj. sem. lini 3ß. pe-*  
*trosel. 3ij. coq. in aq. font. q. s. in colat. 3viiij. solv. electuar.*  
E    ¶    benedict.

*benedict. laxat. ℥j. hier. picr. Log. ℥℔. mell. anthos. ℥j℔. tere-*  
*binth. cum vitel. ovi sol. ℥iij. F. clyster: ex cujus injectio-*  
*ne cum in reddenda urina & flatibus expellendis*  
*manifestum levamen sensisset Æger, sæpius ille re-*  
*petitus fuit. Die XV. Aprilis tumor abdominis iterum*  
*accrevit, hinc consultum fuit, humores serosos*  
*κατ' ἰσχυροσιν per pilulas sequentes evacuare. R. mag.*  
*rad. jalap. mag. scammon. ā Dj. extr. pilul. ammoniac.*  
*Querc. ℔. cathol. Dj. extr. esula mag. gutt. gamandr. ℔.*  
*ol. still. anisi gt. viij. misce dilig. formēt. pilula ex Dj. num.*  
*xviij. sumantur novem cum regimine diætæ, illorumq; usus*  
*trium aut quatuor dierum intervallo per aliquot septimanas*  
*continuetur. Cum nova urgeret urinæ suppressio,*  
*die IX. Maji seq. clyster injectus fuit. R. rad. alth. ℥j.*  
*petrosel. ononid. ā ℥℔. herb. malv. heder. terrestr. violar.*  
*ā Mj. flor. chamam. melil. ā Pj. semin. lini ℔. carui ℥ij.*  
*coq. in aq. font. q. s. in col. ℥viij. solv. elect. bened. laxat. mell.*  
*mercurial. ā ℥j. tereb. cum vitell. ovi sol. ℥iij. F. clyster,*  
*qui etiam die XI. & XIII. repetitus fuit. Die XV. seq.*  
*pilulas usurpavit. R. extr. catholic. Dj. gutt. gamandr.*  
*gr. iij. ol. anisi gt. iij. F. pil. XI. deaur. & sumantur mane.*  
*Cum de nimium dolorifica abdominis extensione*  
*Æger conquereretur, die XVIII. Maji sequens pulvis*  
*præscriptus fuit. R. rad. jalap. opt. ℔. cremor. tartar.*  
*℔. gutt. gamandr. gr. ij. F. pulvis, quem manè in vino*  
*albo cum regimine diætæ sumpsit, & magnam hu-*  
*morum serosorum ac biliosorum copiam per infe-*  
*riora dejecit: quum autem ex hujus pulveris usu*  
*non exiguum levamen adverteret Æger, illum die*  
*XXII. & XXVI. nec non ultimo Maji præmissio clystere*  
*prædicto repetiit. Ad tonum viscerum, præsertim*  
*abdominis, conservandum & roborandum juxta*  
*trageam*

trageam & electuarium supra indicatum sequentibus morsellis etiam usus fuit. R $\acute{e}$ . amygdalar. dulc. rec. ℥℔. conserv. rosar. rubr. borragin. ā ℥ij. cort. citri cond. ℥iij. nuc. Indic. cond. ℥ij. spec. diatrion. santal. rosat. novell. ā ℥℔. saccb. opt. aq. rosar. solut. ℥iiij. F. s. a. morselli. Principio Junij urina incepit omnimodè supprimi, nec ulla arte ad vias naturales reduci potuit, hinc supervenientibus tandem lipothymiis Vir iste insignis entheum suum spiritum, inter ardentia ad cœlestem Patriam suspiria, DEO Creatori & Redemptori suo reddidit. Interim in terris

*Permansura Orbi vera virtutis Imago  
Venturaq; decus Posteritatis erit.*

## CONSILIUM

*VIRI Amplissimi*

DN. MELCHIORIS SEBIZI

Comitis Palatini Cæsarei

Inclytæ Reipub. Argentoratensis

Archiatri gravissimi.

**E**X transmissis literis satis superque collegi, Virum Integerrimum & honestissimum ea laborare hydropis specie, quæ ab artis medicæ Proceribus ascites appellari solet. Quippe abdomen jam est haud leviter intumefactum: pedes œdematoso affecti sunt tumore: diaphragma liberæ respirationis organum à flatuum & serosi humoris copia comprimitur, ut Dn. Pateriens ægrè & difficulter admodum respiret, imò noctu cum primis

primis circa horam secundam, tertiam vel quartam  
 surgere & sese recolligere necesse habeat. Huc ac-  
 cedit, quod hepar illi semper fuerit debile, & cum  
 insuper palpitatione cordis divexetur, suspicio-  
 nem mihi movet, ut ferè credam, etiam lienem ef-  
 fe affectum; habet enim per arterias numerosas ef-  
 fatuque dignas magnum cum corde consensum:  
 hinc quando obstructus est & melancholico humo-  
 re refertus, fieri solet, ut terris ab eo elevatis vapo-  
 ribus & fumis cordique communicatis vis illius  
 expultrix insurgat, & quod molestum sibi esse sen-  
 tit, per immoderatam istam concussionem excer-  
 nat: hoc hoste expulso palpitation tamdiu cessat,  
 donec stimulus exsuscitatus sit novus & ad arcem  
 cordis transmissus. Interim non nego, symptoma  
 istud à copia feri ejusque halitibus proficisci posse;  
 constat enim palpitationem cordis & tunc oriri,  
 quando pericardium seroso humore est onustum.  
 Tussire hydropicos nihil novi; sed tussim istam  
*Hippocrates sect. VI. aphorism. XXXV.* judicat esse malam,  
 hinc diligenter notandus est *Galenii commentarius*,  
 ἐπιπνέουσι τοῖς πάθεσιν ἑτέροις πάθη τε καὶ συμπτώματα τοῖς πα-  
 λαῖοις ἰατροῖς ἐστὶν ἐνὶ λέγειν, ὅσα καὶ τῆς αὐτῆς πάθους λόγον αὐ-  
 ξανομένη συμβαίνειν ἴσμε. Τοῦτον γὰρ τι καὶ τὸ τῶν ἐπιπνέοντων  
 ἐστὶ Πνεύματι βίβλιον. ἔτι δὲ καὶ νῦν εἰρηλατῶν τῆς βηχός. ἢ γὰρ  
 ἰσχυρὰν δὲ ἀλλὰ τινὰ γένηται πνεύματι ὑδατικῶ βηχί, ἀλλήλων  
 ἐστὶ σημεῖον, ἀλλ' ὅταν αὐτῶ τῷ λόγῳ τῷ πνεύματι. πρὶν γὰρ αὐ-  
 τὸς τοσούτοις αὐξήσῃ πλῆθος ἐπὶ τῶν ὑδατικῶν παθῶν ἢ ὑδατώδους  
 ὀφθόνης, ὡς ἤδη καὶ τὰς πνεύματις ἀρτηρίας καταλαμβάνειν, εἴτα  
 βηχί ἐπιπνέουσι, τότε κίνδυνος ἐστὶν πνιγῆναι τὸν ἀνθρώπον  
 οὐκ ὡς μακρόν. *Supervenire passionibus alias passiones & ca-*  
*fus, prisci Medici dicere consueverunt, quacunque ipsius pas-*  
*sionis adaucta ratione contingere solent; talis enim est Pra-*  
*xagoræ liber de supervenientibus inscriptus. Sic &*  
nunc

nunc de tussi dictum est, neque enim cum ex alia sit occasione in homine aquam inter cutem patiente tussis signum est exitiale, sed quando ipsius morbi ratione, cum enim in hydropse aquosa humiditas tantum adaucta fuerit, ut jam asperas occupet arterias, si tussis superveniat, tunc periculum imminet, ne homo haud ita multo post stranguletur. Cæterum cum Dn. Patiens de appetitus ciborum prostratione etiam conqueratur, palàm fit, neque ventriculum benè constitutum esse; parit ergo cruditates, quæ postea & venas mesenterii & hepar obstruunt, crudasque & turbidas urinas generant.

Ex quibus apparet, Dn. Patientem non esse prorsus extra vitæ periculum: tum ratione affectus, qui sanè magnus est & curatu difficilis, insuper etiam contumax atque rebellis, quoniam nullis hætenus cessit remediis: tum ratione symptomatum adjunctorū & cumprimis illius dyspnœæ, quæ requiem illi nocturnam magna ex parte adimit: huc accedit, quòd Dn. Patiens jam in declinante ætate versetur, in qua hydrops periculosior curatuque difficilior esse consuevit.

Quid in curatione faciendum, experientissimi Medici probè intellexerunt, facileque cognoscitur, si ad indicantia curatoria, præservatoria & vitalia respiciatur. Indicantia curatoria sunt morbi ventriculi, mesenterii, hepatis & lienis. Præservatoria sunt noxii humores ac potissimum serosi, qui præ cæteris abundant. Vitalia sunt vires, quæ non parum ob parvitatem cibi, dyspnœam, palpitacionem cordis & interruptam quietem nocturnam sunt dejectæ. Requiritur ergo quadruplicis generis medicamenta, alterantia, vacuantia, aperi-

tia &

tia & roborantia, quæ à Clarissimis Medicis sollicitè usurpata fuisse perspexi, idèo si alia adderem, noctuas certè *Athenas* mittere viderer. Ne tamen nihil agam & ut petitioni Dn. Patientis satisficiam, paucula proponam, eaque Dominorum Medicorum Ordinariorum censuræ & iudicio subijciam: formulas remediorum præscribere supervacaneum est, eorum materiam indigitasse sufficit. In vacuantibus remediis præcipuè respiciendum est ad serosi humoris educationē, ut dolor ventriculi intensus mitigetur, dyspnœa fiat remissior, & caveatur, ne viscera, quæ sero in abdominis cavitate innatare videntur, magis corrumpantur; hinc vitanda sunt nimium fortia, ne viscera debilitata magis enerventur: fugienda etiam emetica sive vomitoria, quoniam vomitus dyspnœicis & ventri à sero ac flatibus distento laboriosus valdeq; noxius est. E vacuantibus placent dejectoria & diuretica: scio Practicos farraginem illorum remediorum describere, quæ aquas hydropicorum partim sensibiliter partim insensibiliter exhauriunt: sensibiliter per paracentesin, scarificationes, sudores, fonticulos, vesicatoria, alia: insensibiliter per ea, quæ serum absorbent, digerunt atque discutunt, nimirum per fomenta humida & sicca, cataplasmata, unguenta & emplastra. Verum cum hydropici, qui difficulter respirant, stuphas ferre nequeant, idèo silentio illas involvo. Scarificationes pedum non satis tutas esse novi: portâ namque sero copioso apertâ impetuosè id ad loca aperta effluit, calorem obruit & suffocat, ut tandem gangræna & post hanc sphacelus superveniat. Paracentesis unū est re-



est è remediis externis, quod ægri non facile admittunt. Topica exsiccantia & absorbentia, quæ ventri imponuntur, non saltem ægris molesta sunt, sed etiam parum efficiunt, ubi magna est aquarum collecta copia. Cum primis dejectoria & diuretica pharmaca alternis vicibus præscriberem. Pro dejectoriis pulverem, sacculum in vino infusum & pilulas eligerem. Inter pulveres ialapa primas tenet. Sacculus paratur ex radicibus cichor. ebul. sambuc. ononid. vincetox. herbis absinth. carduibened. agrimon. floribus centaur. minor. & persic. ex rhabarb. elect. fol. fenn. mund. sem. anisi & fœniculi. Pilulæ ex extract. panchymag. & esul. componuntur. Præstantiora diuretica æstimantur sal juniperi, ononidis & fabarum. Pro roborandis visceribus conficiantur morselli ex conserv. rosar. rubr. borragin. cort. citri & arantior. cond. nuc. Indic. cond. spec. diatrionsantal. diarrhod. rosat. novell. & saccharo in aq. rosar. ac cinnam. soluto: vel electuarium præscribatur ex conserv. rosar. rubr. betonic. cort. citr. confect. alkerm. & hyacinth. spec. diamargar. frig. cum syrupo cort. citri & julepo rosato. Si ad virium refectiorem morselli & electuarium istud minus placerent, parari posset aqua cordialis ex aq. rosar. violar. borrag. flor. acaciæ, cinnam. sacch. rosat. tabul. confect. alkerm. & margaritis. DEUS OPT. MAX. indigtatis remediis benedicat, & pro beneplacito suo Dominum Ægrotum pristinae sanitati restituat.



## OBSERVATIO XXIX.

*Alvus adstricta.*

**C**ontra alvi adstrictionem à quacunque causa ortam nullum præstantius remedium in praxi mea annotavi, quàm passulas purgantes, quas Angelus Sala Præclarus Chymia-ter & Archiater Megapolitanus sect. I. tartareolog. cap. VIII. sequentibus verbis proponit. ℞. Folior. sen. oriental. mundat. ℥j. aq. agrimon. ℥viij. F. infus. in vase vi- treo bene clauso s. a. colat. ad. passul. corinth. mundat. & lot. ℥ij. sacch. alb. ℥j. acid. tartar. ℥iij. passulæ in expresso succo ad turgescentiam lentè coquantur, exemptæ dein in patina terrea reponantur, restitans verò liquor cum saccharo ad sy- rupi consistentiam coquatur, superq; passulis fundatur, qua facta assusione acidum tartari subtilissimè instar farine tri- tum admisceatur, additis etiam XV. guttulis olei anisi stil- latitii in ollula summo studio asservetur. Passulæ hæc cor- pus ab omnibus noxiis crassisque humiditatibus in ventriculo circum jacentibusque partibus stabu- lantibus absque ulla molestia liberant, internas etiam hepatis, lienis aliarumque partium obstru- ctiones reserant, flatus discutiunt, ureteres purifi- cant, securissimus insuper propter effectus, quos in infantibus præstant, eorundem est usus. Inprimis excellens sunt medicina iis, quibus conclusa est al- vus, unde evaporationes calidæ, capitis dolores aliaque innumera sæpe sæpius exoriri solent sym- ptomata: maximè etiam conducibiles sunt pro solvenda

solvenda ac humectanda ægrotorum alvo in lue venerea sudoriferis eliminanda. Dosis harum pas-  
fularum est cochleare unum plus minus pro ratio-  
ne assumentis paulo ante prandium; hoc siquidem  
tempore felicius quàm alio operantur, ac plerum-  
que tam spumantes ventosas cruditates quàm  
alias tartareas materias expellunt, quibus expulsis  
ægroti, præsertim verò hypochondriaci, gravissi-  
ma ventosorum symptomatum sarcinâ se libera-  
tos sentiunt. Hactenus *Sala*.



## OBSERVATIO XXX.

*Convulsiones à lumbricis orta.*

**P**uer quatuor annorum ex inclyta familia  
natus sæpe convulsionibus correptus fuit:  
varia convenientia remedia à variis Medi-  
cis concessa fuere: vocatus pulverem nostrum offi-  
cinalem contra vermes præscripsi, cùm ante paro-  
xysmum de torminibus ventris æger conquerere-  
tur, hinc lumbrici rotundi confestim prodire, &  
puer ab omni convulsionum insultu liber evasit.  
Formula pulveris contra vermes officinalis se-  
quens est. *℞. semin. contra vermes ʒss. corallin. folior.*  
*semm. elect. ā ʒij. rhabarb. elect. C.C. philosoph. præpar. ā ʒj.*  
*diagrid. ʒss. F. s. a. pulvis, dosis est scrupulus unus*  
*usque ad drachmam.*



## OBSERVATIO XXXI.

*Dolor Hemorrhoidum.*

**M**ercator *Basileensis* quadraginta annorum  
acerbissimum hæmorrhoidum dolorem  
passus est: vocatus propter inflammatio-  
nis metum in brachio ex iussu meo venam aperuit,  
& nocte ad demulcendam humoris acrimoniam  
sequenti emulsione usus fuit. *R. amygd. dulc. rec. exc.*  
*℥℔. sem. cucum. melon. ā ℥ij. papav. alb. ℥j. aq. malve ℥iij.*  
*parietar. nymph. ā ℥℔. sacch. rosar. tab. ℥ij. F. emulsio pro*  
*duabus dosibus.* Ad dolorem leniendum & inflamma-  
tionem discutiendam sequens linimentum usur-  
pavit, *R. ol. nucleor. persic. papaver. rosar. & ovor. ā ℥ij.*  
*unguenti populeon. q. s. F. linimentum.* inde aliqualem  
doloris mitigationem percepit, sed ille post aliquot  
horas rediit, hinc famosum illud unguentum de  
linaria suasi, quod instar miraculi omnem dolo-  
rem sustulit. hoc *Johannes Hartmannus* celebris ille  
Chymicus in *praxi sua chymiatr. p. m. 203.* sequenti-  
bus verbis describit & commendat. *R. herb. linaria*  
*cum floribus Mj. contundantur & cum adipe poricina q. s.*  
*F. linimentum, cui expresso & parumper refrigerato vitel-*  
*lum ovi permisceatur, cumq; gossypio vel lana parti dolenti*  
*applicetur.* hoc remedium tanti fecit *D. Johannes Wolf-*  
*fius*, ut tanquam medicamentum singulare Illustris-  
simo suo Principi, *Ludovico Seniore, Hassia Landgravio*,  
toties rogatus revelare noluerit, priusquam ipsi an-  
nuatim bovem saginatum promitteret, quâ pro-  
missione

missione facta non tantum herbam linariam ipsi monstravit, sed etiam versiculum addendo differentiam ab esula patefecit.

*Esula lactescit, sine lacte linaria crescit.*

hoc postquam assidens Nobilissimus Vir Johannes Risodelius; Hereditarius ab Eschenbach, Mareſchallus Hassiacus percepisset, cum joco versiculum invertit.

*Esula nil vobis sed dat linaria taurum.*

Tandem in cura doloris hæmorrhoidum sedulo notandum: si tumor nullis remediis discuti possit, hæmorrhoidas hirudinibus aperire maxime conducit, prius tamen diligenter observata Magni Riolani sequente cautela. Si sanguinem crassum & melancholicum ab hæmorrhoidalibus venis educere velis, ut vena portæ exoneretur, versus coccygam & magis introrsum hirudines admove: sin autem venam cavam duntaxat deplere cogites, à lateribus podicis & versus perinæum ac superficie tenus sanguisugas affige.



## OBSERVATIO XXXII.

### *Menstrua suppressa.*

**R**eligiosa Virgo Franciscana annorum quadraginta ab octo mensibus suppressionem menstruorum passa erat: plurima ipsi ab aliis remedia præscripta & aliquoties vena malleoli aperta fuit, sed omnia incassum: hinc Basileam venit, & auxilium meum sollicitavit. Cum è præmisso examine magnam sanguinis copiam in

illa animadvertissem, iussi illam alternatim venam in utroque brachio aperire, unde menstrua fluere inceperunt, quæ usurpato sequenti sacculo & balneo postea fluxum naturalem observarunt. *R. rad. bryonia ℥℔. herb. artemis. marrubii alb. chamadr. summitat. centaur. minor. absinth. ʒ Pj. folior. fenn. elect. ℥ij. agarric. rec. trochisc. ℥℔. rad. helleb. nigr. prepar. ʒj. sem. anisi ʒ℔. cinnam. ʒj. incisa dentur ad sacculum ex sindone albo, cui mensura vini albi veteris affundatur, de cujus colatura mane alternis diebus ℥vj. bibantur. Post usum vini huius purgantis balneum tali modo paretur. *R. rad. lilior. albor. bryonia, alth. ʒ ℥ij. herb. malv. mercurial. pulg. matricar. artemis. ʒ Mij. sem. fœnigr. lini, ʒ ℥j. incisa dentur pro balneo per novem dies usurpando.**



## OBSERVATIO XXXIII.

## Colica.

**M**ercator triginta annorum multivariis actionum forensium controversiis intricatus, ad iram proclivis, acerbissimos dolores colicos passus fuit. Vocatus ad illum, cum de ardore circa umbilici regionem intolerabili, vomitibilis æruginosæ enormi, cruciatibus ad inguina testesque descendentibus, & contumaci astrictione alvina conquereretur, mox sequentem clysterem præscripsi. *R. rad. alth. ʒj. herbar. quatuor emollient. ʒ Mj. flor. chamem Pj. semin. lini ℥℔. coq. in aq. fontan. in colat. ʒx. solve elect. lenitiv. ʒj. mell. anthos. ℥ij. ol. chamem. ʒj. F. clyster. quamdiu hunc clysterem retinuit, dolor*

dolor aliquo modo sopitus fuit, cum autem expulso clystere reverteret, ad maiorem bilis ac pituitæ viscidæ & flatuum revulsionem & evacuationem vesperi fortior clyster injectus fuit. *℞. rad. bryon. ʒiſs. lil. albor. ʒß. herbar. meliss. menth. parietar. malv. ā Mj. flor. sambuc. Pj. sem. anisi ʒiij. coq. in aq. font. q. s. in colat. ʒx. solve elect. benedict. laxativ. ʒj. hier. picr. Logad. ʒß. mell. anthos. ʒij. ol. anethin. ʒj. F. clyster. ex cuius injectione magnum levamen sensit, nam magna peccantium humorum & flatuum abundantia expulsa fuit. Noctu granum laudani mei opiati sumpsit, & quietam noctem transegit. Secundo die eum mane invisens sequentem potiunculam purgantem præscripsi. *℞. electuar. de succo rosar. ʒß. aq. veronica, ʒiſs. cinnam. ʒij. F. potiuncula. unde rursus ingentem biliosorum humorum copiam deiecit, & dolores evanescere inceperunt. Tertio die iussi ad reliquias humorum peccantium tollendas posteriorem clysterem injicere. Quarto die potiunculam purgantem repetiit, unde rursus egregiè deiecit, & secundæ valetudini restitutus fuit,**

## OBSERVATIO XXXIV.

*Variola cum diarrhœa.*

**F**iliola septem annos nata variolis correpta fuit cum diarrhœa continua: quum die quarto, alvi fluxus, febris acuta & sitis intensæ maximè urgeret, ad illam vocatus fui, & sequentia remedia præscripsi. *℞. C.C. ras. ʒvj. rad. tor-*

*F 3 mentil.*

mentil. ℥℞. coq. in aq. font. ad mensur. duas, colatura detur pro potu ordinario. R̄. aq. plantagin. succisæ, ā ℥ij. syr. corallorum ℥j. rub. idai, ℥℞. F. julepus pro duabus dosibus. R̄. amygdal. dulc. rec. exc. ℥vj. sem. papav. alb. ℥j. aq. plantag. succis. ā ℥iij. F. emulsio ad. sacch. rosat. tabul. ℥ij. C. C. philosoph. præpar. ℔j. Misce pro tribus dosibus. Ex diligenti usu horum remediorum diarrhœa imminuta & variolæ intumefactæ fuerunt, unde filiola hæc extra vitæ periculum posita brevi convaluit.



## OBSERVATIO XXXV.

*Icterus flavus.*

**V**irgo religiosa Ordinis Cisterciensis, triginta annos nata, ictero flavo correpta fuit, sic ut universa cutis aureo colore suffusa conspiceretur. Præscripsi sequentem sacculum purgantem, quo unico remedio valetudinem secundam recuperavit. R̄. rad. rubiæ tinctor. ℥℞. herb. chelidon. major. agrimon. marrub. alb. summit. centaur. min. absinth. ā ℔j. folior. senn. elect. ℥ij. rhabarb. opt. ℥j. cremor. tartar. ℥℞. sem. anis. ℥ij. incisa dentur ad sacculum ex sindone albo, cui mensura vini albi affundatur, de quo mane ℥vj. cum regimine diata bibantur.

OBSER-





## OBSERVATIO XXXVI.

*Profluvium seminis ex impuro  
concubitu.*

**M**ilitiæ Præfectus apud Gallos & Martis & Veneris castra sequutus, in Germaniam redux, ab aliquot annis gonorrhœam antiquam passus fuit. Basileam transiens curæ meæ se submittit. Posteaquam mihi retulisset, se per aliquot septimanas Parisiis decocto sudorifero jam usum fuisse, saltem illi sequentes pilulas præscripsi. R. extr. catholic. ℥j. mercur. dulc. ℥℥. ol. salviae gt. ij. F. pilula XV. deaur. & sumantur mane cum regimine diætæ. ex usu harum pilularum aliquoties deiecit, & in seminis fluxu levamen sensit, unde tertio die repetitæ fuerunt. Quarto die sequens remedium consului. R. rad. dictamn. Cretic. ℥℥. herb. menth. Mij. sem. vitic. lactuc. ruta, ā ziiij. terebinth. Venet. ℥ij. vini alb. veter. ℥viij. aq. plantag. ℥iiij. destillentur in balneo Mariæ. de hac aqua destillata manè duabus horis ante prandium & vesperti ante cœnam cochleare plenum sumpsit, & brevi temporis intervallo à pertinaci ista gonorrhœa liberatus fuit.



## OBSERVATIO XXVII.

*Hæmoptysis.*

**C**larissimi Mercatoris Uxor honestissima post mediam noctem hæmoptysi correpta fuit, nam sputum sanguinis copiosum tussu eiecit. Summo mane ad illam vocatus sequentem julepum præscripsi. R̄. aq. plantagin. farfar. papav. rhead. ā ʒij. syr. corallorum ʒj. de rosīs sicc. ʒʒ. granator. ʒij. F. julepus pro duabus dosibus. dein post aliquot horas venæsectio in brachio instituta erat. Sub vesp̄a eundem julepum usurpavit. Secundo die humores serosi & biliosi, sanguinem fluidiorem efficiētes, sequente potiuncula educti fuerunt. R̄. rhabarb. elect. pulv. ʒʒ. rad. jalap. pulv. ʒj. syr. flor. persicorum ʒʒ. aq. plantagin. q. s. F. potiuncula cum regimine diata sumenda. Cūm tertio die sputum sanguinis remitteret, ad curam absolvendam & recidivam impediendam sequentia remedia consului. R̄. conf. rosar. rubr. ʒj. flor. betonic. rad. symphyt. cond. ā ʒʒ. spec. diatrag. frig. ʒj. boli armen. lap. hæmatit. præpar. ā ʒʒ. syr. papav. rhead. jujubin. ā q. s. F. electuarium, de quo pro lubitu magnitudo nucistæ sumatur. R̄. spec. diatragac. frig. ʒʒ. corall. rubr. præpar. ʒj. boli armen. præpar. ʒʒ. ol. anisi gt. iij. sacch. opt. aq. scabios. & rosar. solut. ʒij. F. s. a. rotula pro beneplacito usurpanda. R̄. syr. corallor. farfar. jujubin. ā ʒj. aq. plantag. ʒʒ. misce, de quo ad lubitum aliquot coeblearia plena assumantur. Ex sedulo horum medicamentorum usu sputum sanguinis omnimodè cessavit.

OBSER-



## OBSERVATIO XXXIIX.

*Fluxio hæmorrhoidum immodica.*

**R**esbyter Episcopatus Constantiensis, quadragenario major, sæpe fluxionem hæmorrhoidum immodicam passus fuit, à qua, licet plurima remedia usurpasset, liberari non potuit, hinc ob præsentem virium imbecillitatem, corporis cachexiam & metum hydropis consilium anxie sollicitavit. Animadverti è præmissis examine, humores biliosos & serosos sanguinis impetum excitare, hinc consului, ut terna vice sequentem potiunculam usurparet. *R. Tamarindor. ʒiij. rhabarb. elect. ʒij. aq. cichor. q. s. infund. per noct. mane bulliant par. in colat, ʒiij. solve syr. ros. sol. simplic. ʒß. pulv. radic. jalap. ʒß. F. potiuncula cum regimine diæta sumenda.* Post usurpatam ultima vice hancce potiunculam vena in brachio aperiatur, nec non sequens electu-  
*arium & tragea alternis vicibus usurpetur. R. conserv. rosar. rubr. ʒj. flor. betonic. radic. cichor. cond. symphyt. cond. ʒß. sal. martis, spec. diatrionsantal. ʒ ʒj. syr. granator. corallor. ʒ q. s. F. electuarius. R. ras. eboris, ocul. cancr. prepar. ʒ ʒij. corall. rubr. prepar. ʒj. spec. diatrionsantal. ʒiß. sacch. ros. tab. ʒiij. F. s. a. tragea.* Post aliquot menses Basileam venit, & pristinae sanitati restitutus debitas grates mihi persolvit. In cura fluxionis hæmorrhoidum immodicæ diligenter notandum, ne statim in principio fluxus sistatur, nam terreat juniores Medicos historia, quam *Reinerus So-*

*lenander sect. IV. consilior. medic. XX.* proprio suo exemplo refert. Memini, quod monendum mihi hic est, me ante annos decem *Annam è Ducibus Clivensium* proinatam, *Illustr. Comitum à Waldeck*, gravissimo hæmorrhoidum diuturnoque fluxu curantem magna diligentia summoque nisu, quum viderem, viribus labefactatis spiritibusque dissolutis summum discrimen imminere, profluvium obfirmasse, verum cum illa inde primo die recreata, sequentibus mirifice gravari & circa præcordia tumere atque inflari inciperet, vocatus sexto die, coactus venis reclusis profluvium rursus movi, neque potui tutò & securè stringere, priusquam corpori levibus vacuationibus, hepaticæ necessariò aliis alterantibus atque roborantibus prospexissem: itaque dextrè heic agendum, ne volentes, quod dicitur, vitare *Charybdin* in *Scyllam* incidamus, hoc est, prospicientes minori malo, aliud gravius conciliemus. Hactenus *Solenander*.

~~~~~

## OBSERVATIO XXXIX.

*Lochiorum suppressio.*

**P**uerpera quarto post partum die, cum imprudenter aëri frigido se exposuisset, in lochiorum suppressionem incidit, unde febris accensa fuit, ad illam vocatus sub vespera sequentem clysterem, julepum & sacculos præscripti. *℞. rad. lil. alb. ʒj. bryonia ʒss. herb. violar. malva, artemis.*

*artemis. puleg. ʒ Mj. flor. sambuc. Pj. sem. lini ʒʒ. coq. in aqua fontan. q. s. in colat. ʒx. solv. mell. anthos. ʒij. ol. cheirin. elect. diacatholic. ʒ ʒj. hier. picr. Gal. ʒʒ. F. clyster. Rj. aqua artemis. cichor. puleg. ʒ ʒij. syr. artemis. Fern. ʒiʒ citri ʒʒ. spir. sal. gt. vj. F. julepus pro duabus dosibus post clysterem redditum sumendus. Rj. rad. alth. lilior. albor. ʒ ʒiʒ. bryonia, angelic. ʒ ʒʒ. herb. violar. mercurial. artemis. puleg. ʒ Mij. sem. lini ʒiʒ. incisa dentur ad sacculos duos in lacte coquend. & alternatim hypogastrio tepidè admovendos. Cum noctu lochia fluere inceperant, jussi manè venam malleoli aperire, unde fluxus illorum omnimodè rediit.*



## OBSERVATIO XL.

*Cephalea.*

**C**Um in aula Eminentissimi Cardinalis *Hafsiaci* apud Equitem *Melitemsem*, ex febre tertiana decumbentem, *Heitershemii* commorarer, petiit à me auxilium Civis *Heitershemienfis*, qui per multos annos propter vehementissimam sanguinis effervescentiam tam atroci cephalæa laboravit, ut sæpe animum induxerit, sibi ipsi manus violentas inferre. Quum illi indicarem, præstantius arteriotomiâ remedium contra inveteratas istas cephalæas non dari, mox obsecundavit, unde præsens Chirurgus arteriam temporalem aperuit, sanguinis uncias sex circiter eduxit, & emplastrum ex thure, mastiche, bolo armenâ cum

cum albumine ovi subactis, ac fasciam couvenientem admovit. Ex unico & solo hoc remedio bonus iste Vir à contumaci cephalæa liber evasit. In hac cura sequutus eram observationem annotatu & lectu dignissimam, quam *Ambrosius Paræus lib. XVI. Chirurg. cap. IV.* sequentibus verbis proponit. Si cephalææ causa est à sanguine fervido, tenui & vaporoso, quæ nullis remediis vinci potuerit, ab arteriotomia in temporibus celebrata necessarium, utile & promptum habebis remedium, siue malum ab externis aut internis vasis oriatur: hoc expertus sum in permultis & præcipuè in *Principe à Rupe surionensi*, huic atroci hemicrania divexato Dominus *Cappellanus* Regis, & *Castellanus* Reginae primarius Medicus, atque *Ludovicus Duretus* medicinam faciebant, ne tamen phlebotomia, cucurbitulis, balneis, frictionibus, diæta, ullove remedii genere quidquam opis afferebant: vocatus ego dixi unicam salutis spem restare, si ipsi arteria in temporibus aperiretur, qua parte dolor sæviret, mihi enim verisimile fieri, doloris causam non venis sed arteriis concludi, quo in casu nullum arteriotomiâ præstantius esse remedium etiam Veteribus proditum fuit, cujus in me ipso etiam magno meo bono periculum fecissem: cum hoc consilium Medici approbassent, ad opus statim me accingo, arteriamque in tempore seligo, quæ & tumentior esset & vehementius cæteris pulsaret, hanc unica incisione aperio, sanguinisque magno cum impetu profluentis duo vascula elicio, unde dolor statim cessavit. Hæc *Paræus*. Mirum igitur non est, adhuc hodie *Parisiis* arterias frontis & temporum

porum in cephalæa, phrenitide, inflammatione oculorum magna, & doloribus aurium acerbissimis aperiri, uti celeberrimus *Riolanus lib. V. enchirid. anatomic. cap. VI.* refert. Quàm frustranea & supervacanea autem præter arteriotomiam in hemicraniis sint alia remedia, *Simon Jacozius* in observationibus *Clarissimo Riverio* communicatis, *observatione XII.* ostendit. Vir quidam quinquagenarius, gracilis & ad iram maximè proclivis, à duobus circiter annis, dolore capitis acutissimo laboravit, qui quoties à summo vertice partis dextræ recurrebat, ægrum lecto affixum adeo discruciauit, ut illum ferme ad desperationem duceret: dolor autem observabatur sine febre, sed cum pulsatione insigni arteriæ ejusdem temporis. Ad eum vocatus phlebotomiam imperavi, præmisso clystere ad eluendas impuritates alvinas; deinde medicamentum cholagogum exhibitum & iteratum est per aliquot dies, usurpatis interim julepis refrigerantibus & humorem biliosum præparantibus: postea admotæ sunt capiti repellenria & oxýrrhodina, ac revulsiones per cucurbitulas celebratæ, porro iterata est phlebotomia, inde tamen dolor non cessavit: qui cùm adventante vere reversus esset, præmisso clystere emolliente & medicamento bilem evacuante ad arteriæ temporis apertionem descendi, sanguis cum impetu prosiliens ad 3v. eductus fuit, & admoto vulneri splenio ex linteo duplicato, aquâ frigidâ madefacto, ac fascia super inducta, ut in vulgari phlebotomia fieri solet, dolor intra dimidiam horam sublatus, nec ab eo tempore reversus est. Ad majorem cautelam præ manibus erat emplastrum

*Galen*

*Galen*i ex thure, mastiche, bolo armena & pilis leporinis cum albumine ovi subactis, sed illo opus non fuit. Hæc *Jacozius*.



## OBSERVATIO XLI.

*Asthma.*

**A**dmodum Reverendus & Religiosus P. *Antonius* Capucinus, ex nobilissima & præcellentibus Dignitatibus hujus Ævi eminentiorum honoribus splendidissima *FAMILIA ROGGENBACHICA* oriundus, cum in Conventu Patrum Capucinorum *Rheinfelda* degeret, aliquoties mihi conquestus est, se per intervalla, sive per plateas obambulet, sive loca altiora ascendat, molestissimo asthmate corripitur. Cum magnam humorum imprimis biliosorum & serosorum copiam in illo animadvertissem, autor fui, ut singulis mensibus sequentes pilulas usurpet. *℞. extr. catholic. ʒj. aurear. cochiar. ʒ ss. magist. diagrid. ʒj. gutt. gamandr. ʒ ss. ol. anisi. gt. vj. misce diligenter pro massa, ex qua formentur pil. LX. deaur. add. pulv. cinnam.* Quum de pilulis istis quindecim mane cum regimine diætæ ad constitutum tempus sumpsisset, exoptatum levamen sensit, multoque liberior spiravit, unde sæpius harum pilularum virtutes mihi tergeminis laudibus extulit. Ad humores bronchia pulmonum obstruentes incidendos, & per sreatum ejiciendos, magno etiam cum fructu usurpavit oleum sacchari compositum, cujus formula sequens est. *℞. rad. ireos florent. enula pulv.*



ā ʒʒ. fruct. dactylor. passul. minor. purgat. ā ʒiij. cort.  
arantior. flor. benzoin. ā ʒij. croci oriental. ʒiʒ. infunde per  
biduum in spiritu vini rectific. mox separetur liquor per in-  
clinationem, deinde admisce liquori saccharum candum al-  
bissimum, quantum in eo dissolvi poterit, postea accende spiri-  
tum vini spatula agitando, donec in amulum olei liquorem  
flammâ extinctâ abierit, cui sub finem adde spiritum sul-  
phuris ad gratam aciditatem.



## OBSERVATIO XLII.

*Tortura oris.*

**V**ir quinquaginta annorum, catarrhis ma-  
ximè obnoxius, tortura oris sive spasmò  
cynico correptus fuit: vesperi illum invi-  
dens julepum ad præparandos humores pituitosos  
præscripsi. R. aq. betonic. fl. tilia ā ʒiʒ. syr. pæon. ʒj. spir.  
vitriol. gt. vj. F. julepus pro una dosi hora nona nocturna su-  
mendus. Secundo die mane pilulas purgantes usur-  
pavit. R. extr. catholic. cochiar. ā ʒʒ. ol. salv. gt. ij. F. pi-  
lula XV. Tertio die venam in brachio dextro ape-  
ruit. Quarto die mane cucurbitulæ cum scarifica-  
tione scapulis admotæ, & vesperi vesicatorium cer-  
vici appositum, nec non trochisci masticatorii præ-  
scripti fuere. R. rad. pyrethr. ʒj. mastich. elect. cubebæ.  
piper. long. ā ʒʒ. theriac. mithrid. ā ʒj. mucilag. gummi  
tragacanth. & sacchar. ā q. s. F. s. a. trochisci masticatorii  
pro lubitu usurpandi. Quinto die duos sacculos super  
regulam lapideam excalefactam vino albo irro-  
tam tepēfactos præscripsi, quorum alter occipiti  
alter

alter maxillæ imponatur. R. herb. betonic. saly. paralyf. ivæ arthritic. ā Mj. flor. primul. ver. sambuc. stæchad. rorismar. ā Pj. baccar. junip. laur. ā 3j. incisa dentur ad chartam pro duobus sacculis. Cū sexto die symptoma nondum remitteret, manē sequentes pilulas præscripsi. R. extr. pilul. aurear. ʒj. magist. radic. jalap. gr. v. ol. succin. gt. ij. F. pil. XI. deaur. & sumantur statim. Septimo cucurbitulæ repetitæ sunt, nec non ad humores pituitosos à cerebro & parte affecta revelendos gargarismus & pulvis sternutatorius præscriptus fuit. R. rad. pyrethr. 3j. herb. betonic. saly. majoran. rorismar. chamæpith. ā M℔. sem. sinapi ʒi℔. baccar. juniper. 3j. coq. in aq. fontan. q. s. in colat. ʒviij. solve oxym. scyllt. 3j. F. gargarismus tepidè usurpandus. R. flor. lil. convall. major. rorismar. betonic. ā ʒ℔. radic. pyrethr. gr. vj. moschi oriental. ambr. ā gr. j. F. pulvis sternutatorius. Octavo die ad robur cerebri sequens electuarium & trageam præscripsi. R. conf. fl. betonic. 3j. pæon. ʒ℔. majoran. 3j. cort. citri cond. ʒ℔. nuc. indic. cond. 3j. spec. diamb. ʒj. diamosch. ʒ℔. syr. pæon. q. s. F. electuarium, de quo ad lubitum magnitudo nucis moschatæ sumatur. R. spec. diamosch. 3j. marchion. ʒ℔. diamb. ʒj. ol. cinnam. mac. ā gt. ij. sacch. rosat. tabul. ʒiij. F. s. a. tragea more consueto sumenda. Cū nono die tortura oris aliquatenus remitteret, jussi maxillam affectam bis de die cum sequente aqua tepidè illinire. R. aq. vitæ cum castor. & mastich. ā ʒi℔. saly. 3j. ol. still. rorismar. ʒj. Misce. Formulæ prædictarum aquarum in exercit. nostr. de apoplex. §. XII. reperiuntur. Horum remediorum ope Ager secundam valetudinem impetravit, nullaque oris tortura amplius apparuit. Ad recidivam præveniendam jussi vere & autumnò sequen-

tem

tem facculum purgantem usurpare, & tempore vindemiali vinum medicamentosum ex musto recenti parare. R. rad. pæon. ℥ij. herb. betonic. major. carduibened. ā M℔. summit. centaur. min. fl. lil. convall. ā Pj. folior. senn elect. ℥ij. rhabarb. opt. ℥ij. sem. anisi ℥i℔. incisa dentur ad facculum ex sindone albo, cui mensura vini albi affundatur, de cujus colatura mane alternis diebus cum regimine diata ℥vj. sumantur. R. radic. enula ℥iiij. lign. guajac. ras. ℥iiij. sassafir. ℥ij. cort. arantior. ℥j. herb. betonic. salv. meliss. ā Miiij. agrimon. carduibened. summit. centaur. min. absinth. ā Mij. incisae affundantur XL. mensura musti recentis albi, quod si deserbuerit, de illo cyathum plenum & manè & apud prandium pro primo haustu evacuare conducit.



## OBSERVATIO XLIII.

*Convulsio Universalis.*

**M**Ir quinquaginta annorum, strenuus comibonum amator, ad vesperam bene potus domum rediit: post aliquot horas in somno vomitum enormem patitur, quem convulsio universalis totius corporis mox comitata fuit. R. aq. epileptic. in exercit. de apoplex. §. XI. descript. ℥ij. cardiac. offic. ibid. notata, aq. cerasor. nigr. ā ℥j. sacch. rosat. tab. ℥ij. ol. succini rectif. ℔℔. misce. sumpsit de hac aqua aliquot cochlearia plena, sed mox redeunte convulsione & vomitu illam rejecit cum horrendo ejulatu, sic ut etiam vicini è somno excitati fuerint: insuper cervix ac initium spinalis medullæ sequent

quenti aqua & linimento calidè illinita fuit. *R.* aq. vitæ cum castor. & mastich.  $\text{ā}$   $\text{℥ij}$ . spir. cerasor. nigr. lilior. convall.  $\text{ā}$   $\text{℥j}$ . ol. succin. rorismar.  $\text{ā}$   $\text{℥j}$ . Misce. *R.* unguent. martiat.  $\text{℥i℥}$ . ol. lumbricor. terrestr. q. s. ol. still. lavendul. salvia,  $\text{ā}$   $\text{℥j}$ . F. linimentum. Ad vomitum compescendum regio stomachi sequenti balsamo inuncta fuit. *R.* ol. nucistæ express.  $\text{℥ij}$ . bals. perruvian. liquid.  $\text{℥j}$ . F. balsamum. Ex usu horum remediorum Æger secundo die paulo melius se habuit, quia autem adhuc convulsio nunc pedem, nunc femora, nunc manus infestabat, mandavi illas partes prædictâ aquâ & linimento sæpius inungere. Tertio die convulsio & vomitus cessavit, quia autem de totius corporis lassitudine & madore conquerebatur, blandam potiunculam sudoriferam roborantem præscripsi. *R.* lapid. bezoar. oriental. C.C. philosoph. prepar.  $\text{ā}$   $\text{℥℥}$ . aq. pæonia  $\text{℥℥}$ . acetos.  $\text{℥ij}$ . Misce: hinc modicè sudavit & optimè se habuit. Cùm quarto die omnia symptomata remitterent, sequentes pilulas præscripsi, & Ægro valedixi. *R.* extr. catholic. aurear.  $\text{ā}$   $\text{℥℥}$ . mag. rad. jalap. gr.  $\text{ij}$ . ol. salviæ gt.  $\text{ij}$ . F. pil. xj. deaur. sumantur manè cum regimine diætæ.




## OBSERVATIO XLIV.

*Febris hectica in Puerulo.*


**P**uerulus trium annorum febre hecticâ laboravit, cui brachiis & pedibus atrophiam flaccescentibus abdomen maximè intumuit: hinc sequens decoctum loco potus ordinarii bibit. *R.* radic. gramin.  $\text{℥℥}$ . acetos. china recent.  $\text{ā}$   $\text{℥ij}$ . in-

*cisa coq. in aq. font. ad mensur. duas.* Balneum ex æqualibus partibus aquæ fontanæ & lactis vaccini paratur, in quo manè & vesperi per horulam vel amplius sedeat. Post egressum è balneo pectus & abdomen sequenti linimento inungatur. *R. gummi ammoniac. in aceto scyllitic. solut. ʒß. ol. cappar. amygdal. dulc. violar. ā ʒij. unguent. resumptiv. q.s. F. linimentum:* quod etiam extra usum balnei manè & vesperi usurpetur. Puliculæ parentur ex lacte caprino, hordeo, amygdalis &c. in quibus ut & aliis liquoribus convenientibus de sequente pulvere magnitudo nucis moschatæ concedatur. *R. Pulv. cachectic. D. Plateri ʒiß. ocul. cancr. prepar. rasur. eboris facul. radic. aronis ā ʒß. sacch. rosat. tab. ʒiij. F. pulvis.* Formula pulveris, quem Vir Clarissimus, Magni FELICIS ex Fratre Nepos, FELIX PLATERUS, contra cachexiam infantum à qualicunque causa ortam feliciter præscripsit, sequens est. *R. radic. & semin. pæon. extort. ā ʒj. flor. rosar. rubr. ʒß. nuc. moschat. parum tostæ ʒij. baccar. laur. parum tostas. ʒß. spice, schœnanth. croci oriental. ā ʒj. ventricul. & intestinor. gallinar. prepar. ʒj. croci martis aperitiv. ʒiß. cinnam. elect. ʒj. F. pulvis subtilissimus.*



## OBSERVATIO XLV.

*Febris continua putrida.*

 Dolefcens octodecim annorum luxuriosè vivens à quatuor diebus febre correptus fuit: urgebat æstus igneus, pulsus celer & inæqualis, dolor capitis, sitis & vigiliæ, unde fe-

brem continuam putridam esse judicavi. Vocatus statim in brachio dextro venam Chirurgo magis conspicuam aperire jubeo, & sequentem julepum pro duabus dosibus præscribo. *R. aq. cichor. acetos. ā ʒiij. syr. berber. papav. erratic. ā ʒj. spir. vitriol. gr. x. Misce.* Secundo die sequentem emulsionem duabus vicibus usurpavit. *R. amygdal. dulc. rec. ex-cort. ʒß. semin. cucum. melon. ā ʒj. aq. cichor. acetos. plantagin. ā ʒij. F. emulsio, cui adde sacch. rosar. tab. ʒij. Misce.* Die tertio, quia erat morbi septimus & criticus, cum corpus madidum observarem, blando diaphoretico sudorem promovi. *R. lapid. bezoar. oriental. ʒß. C. C. philosoph. præpar. gr. viij. F. pulvis:* unde blandè sudavit. Quarto die propter alvi constipationem clyster emolliens & refrigerans injectus fuit. *R. rad. acetos. ʒj. herb. malv. cichor. parietar. ā Mj. flor. violar. Pj. coq. in aq. font. q. s. in colat. ʒviij. solve elect. diacatholic. ʒj. mell. violar. ʒij. F. clyster:* inde aliquoties dejecit, simulque quatuor lumbricos vivos excrevit. Cum nullus dubitarem, quin pulvis præcedens bezoardicus contra lumbricos maximè proficius in horum expulsionem multum præstiterit, Ager illum quinto die iterum usurpavit, hinc rursus duo lumbrici expulsi fuere. Quum die sexto, qui erat morbi decimus, calorem mitigatum ac urinam cum laudabili sedimento observassem, manè potiunculam purgantem præscripsi. *R. elect. de succo rosar. ʒiij. aq. cichor. q. s. F. potiuncula:* unde octies cum levamento dejecit, & febris cum suis symptomatibus evanuit.

OBSER-



## OBSERVATIO XLVI.

*Tussis contumax cum orthopnœa.*

**M**ercator quadragenarius in frequentandis  
nundinis sedulus, tussi contumaci & ca-  
tarrho ferino ad pulmones delapso per ali-  
quot menses laboravit, cui noctu sæpiùs ortho-  
pnœa accessit, sic ut erectâ cervice cum suffocatio-  
nis metu respiraret. Primo die circa vesperam ac-  
cessit syrupum pro tussi & orthopnœa conve-  
nientem præscripsi. *R.* syr. alth. *F.* Ziß. jujub. farfar.  
ã 3vj. oxymel. scyllit. Ziß. effem croci ʒj. aq. cinnam. Ziß.  
misce: de quo aliquot cochlearia plena assumat: ad inter-  
cipiendas defluxiones noctu hæc pilulas deglu-  
tiat. *R.* mass. pilul. de cynogloss. gr. iij. laud. opiat. gr. j.  
*F.* pil. v. deaurentur. Secundo die pro potu ordinario  
sequens decoctum præscriptum & pedum bal-  
neum paratum fuit. *R.* rad. acetos. Ziß. liquir. ras. ʒij.  
herb. scabios. farfar. pulmonar. ã Mj. jujubar. recent. par.  
vj. filiquar. recent. Ziß. sem. anisi ʒij. incisa coq. in aq. fon-  
tan. q. s. ad mensuras duas. *R.* herb. betonic. salvia, puleg.  
origan. hyssop. ã Mij. flor. chamæm. lavendul. ã P. ij. baccar.  
laur. juniper. ã Ziß. salis ʒij. incisa dentur ad chartam pro  
pedum balneo. Tertio die elixir purgans usurpavit.  
*R.* elix. vita Matthiol. Ziß. magist. rad. jalap. gr. xij. sol-  
vatur ad ignem & detur ad usum: unde aliquoties de-  
jecit & tussis mitigata fuit. Vespero trochiscos  
præscripsi, quibus præsertim noctu utatur. *R.* succi  
liquirit. recent. ʒij. spec. diatrios simplic. ʒiiij. sem. papav.  
alb.

alb. *ſij. ſacul. rad. aronis. ʒj. mucilagin. gumm. tragacanth. & ſacch. opt. ʒ. q. ſ. ol. aniſi gt. vj. F. s. a. trochiſci ſublinguales.* Quarto die rotulas convenientes præſcripſi. *R̄. ſpec. diatrios ſimplic. ʒiſ. diatrag. frig. ʒb. ſacul. radic. aron. bryon. ʒ ʒij. lact. ſulphur. ʒj. confect. alkerm. ʒij. ol. aniſi gt. vj. ſacch. opt. aq. farſar. & cinnam. ſol. ʒiiij. F. s. a. rotula pro lubitu uſurpandæ.* Quinto die cum ob conſtitutionem aëris pluviolaſam & nimis frigidaſam novos catarrhi & hinc naſcentis orthopnœæ inſultus Æger metueret, hac aquâ obuiam itum fuit. *R̄. aq. antiaſthmatic. in parte poſter. exercitat. de apoplex. ʒ. ii. deſcript. ʒij. elix. vitæ Matthiol. ʒb. ceraſor. nigr. ʒj. julep. roſat. ʒiſ. Miſce, ſumat aliquoties cochlear plenum.* Sexto die ſequens electuarium præſcripſi. *R̄. elect. de pulmon. vulp. ſupra obſervat. XVI. deſcript. ʒij. conſerv. roſar. rubr. ʒj. lact. ſulphur. ʒb. ſacul. rad. bryon. aron. ʒ ʒj. ol. aniſi gt. vj. ſyr. alth. Fern. farſar. ʒ q. ſ. F. electuarium, de quo ad lubitum magnitudo nucifſtæ ſumatur: ex huius aquæ & electuarii uſu ſedulo Æger liberius exſpuit, & facilius reſpiravit.* Sub finem curæ cū formulam vini medicamentofî à me peteret, ſequentem præſcripſi. *R̄. rad. enula ʒiiij. ireos florent. ſarſeparill. ʒ ʒij. Lign. ſanct. raſ. ʒiiij. ſaſſafr. ʒiſ. cort. arantior. ʒj. herb. veronic. ſcabioſ. farſar. pulmonar. ʒ Miiij. carduibened. ſummit. centaur. min. abſinth. ʒ Mij. incifa & ſacculo incluſa indantur doliolo, cui affund. vini alb. veter. menſuræ XL. & per octiduum quieſcant. In prandio & cœna primum cyathum plenum evacua-re conducit.*



## OBSERVATIO XLVII.

*Tormina post partum.*

**P**uerpera Cognata mea puerulum feliciter  
 enixa acerbissimis post partum tormini-  
 bus correpta fuit, sicut etiam convulsionem  
 metuerentur. Vocatus manè iussi illam olei amygdal.  
 dulc. recent. uncias duas cum jusculo carneo assu-  
 mere & clysterem usurpare. *R.* rad. alth. ℥j. herb. 4.  
 emollient. melissa ʒ Mj. flor. sambuci Pj. sem. lini ℥B. anisi  
 ℥ij. coq. in aq. font. q. s. in colat. ℥x. solve mell. anthosat.  
 violar. ʒ ℥iB. ol. cheirin. ℥B. F. clyster. Dolores sub ve-  
 speram mitigati ab usu sequentis electuarii & sac-  
 culorum omnimodò cessarunt. *R.* conf. fl. betonic.  
 ℥iB. major. meliss. nuc. indic. cond. ʒ ℥ij. cort. citri cond. ℥B.  
 ol. anisi gt. iiij. syr. pæon. q. s. F. electuarium, de quo nuncistæ  
 magnitudo ad beneplacitum sumatur. *R.* rad. alth. ℥iB.  
 herb. malv. violar. meliss. artemis. ʒ Mij. flor. cheir. sambuc.  
 ʒ Pij. semin. lin. ℥B. carui ℥ij. baccar. junip. ℥ij. incisa den-  
 tur ad sacculos duos quadratos in lacte coquendos & hypo-  
 gastrio tepidè alternatim applicandos. Si molestissima  
 tormina à partu hisce remediis non cedant, suade-  
 rem oleum Riverianum, quod in officinis pharma-  
 ceuticis asservari potest. *R.* rad. aristoloch. rotund.  
 ireos florent. pæonia ʒ ℥B. cyper. ℥ij. herbar. siccar. artemis.  
 matricar. origan. calamenth. puleg. dictamn. cretic. absinth.  
 fabin. ruta, betonic. salu. ʒ MB. flor. anthos. stæchad. laven-  
 dul. chamem. aneth hyperic. sambuc. ʒ Pj. baccar. lauri, ju-  
 niper. ʒ ℥ij. sem. cumin. ruta, pæon. dauci, vitic. ʒ ℥iB. ca-  
 ryophyll.

ryophyll. nucist. cinnam. Zingiber. ā 3j. omnia contusa & incisa misceantur, ac in olei veter. ℥iij. macerentur, stent per septimanam in vase vitili clauso, dein supra cineres calidos spacio quatuor aut quinque horarum bulliant, postea oleum exprimatur & ad usum asservetur.



## OBSERVATIO XLIX.

*Cardialgia.*

**V**ir nobilitatis stemmate conspicuus in arce Zuingensi mihi retulit, se aliquoties intolerabilem ardorem ventriculi ad pectus imò fauces ipsas ascendentem pati, præsertim si nocte præcedente aliquantum floribus *Liberi Patriæ* conspersus fuerit. Cum pulverem meum contra cardialgiam ordinarium ad manus haberem, ipsius amicæ petitioni annuens de illo concessi: elapsis aliquot mensibus mihi indicavit, se ab usu hujus pulveris nullum ardorem ventriculi amplius sensisse. Formula pulveris mei contra cardialgiam ordinarii sequens est. *℞. ocul. cancr. creta, ā 3j. crysall. præpar. boli armen. corall. rubr. lapid. Judaic. præpar. ā 3j. margarit. præpar. ʒj. cinnam. elect. ʒ℥. lapid. carphon. ʒj. bezoar. oriental. macis, nucista, croci oriental. ā ʒ℥.*

*F. pulvis subtilissimus, dosis est circiter scrupulus.*

OBSER-



## OBSERVATIO XLIX.

*Ventriculi dolor cum tumore.*

**V**ir quinquaginta annorum de interno ventriculi dolore mihi conquestus est, tumor circa regionem stomachi extrinsecè apparuit & appetitus prostratus fuit. Primo die sequentem pulverem præscripsi. *R̄. tartar. vitriolat. ex sale tartar. crystall fact. ℥ij. sal. absinth. ℥j. F. pulvis subtilissimus, dividatur in tres partes aequales pro tribus dosibus matutinis: exacto triduo pilulas purgantes usurpavit. R̄. extr. pilul. cochiar. gr. xv. catholic. gr. v. mag. rad. jalap. gr. ij. ol. macis gr. ij. F. pilula XI. deaurentur & sumantur cum regimine diætæ. Inde & dolor & tumor ventriculi remisit, hinc ob appetitum prostratum, nimiam flatuum copiam, & manifestam cerebri humiditatem sequens tragea à me præscripta fuit. R̄. Tragea stomachica & cephalic. officinal. ā ℥j. spec. aromat. rosat. ℥ij. diarrhod. abbat. ℥j. ol. cinnam. macis. ā gr. ij. sacch. rosat. tabul. ℥iiij. F. s. a. tragea consueto more usurpanda. Formula trageæ stomachicæ & cephalicæ per plurimos annos in officinis Basileensibus pharmaceuticis consuetæ & maximè proficuae sequens est. R̄. Cinnam. elect. ℥vj. zinziber. ℥℔. galang. ℥℔. macis. ℥j. nuc. mosch. ℥℔. caryophyll. ℥j. sacch. opt. ℥xxij. F. s. a. tragea stomachica. R̄. cinnam. opt. ℥ij. semcoriand. prepar. ℥℔. santal. rubr. ℥j. zingiber. caryophyll. galang. zedoar. cardamom. granor. parad. nuc. mosch. spic. indic.*

*indic. majoran. saly. sem. eruca cubebar. ʒij. sacch. opt. ʒxvj. F.s.a. tragea cephalica.*



## OBSERVATIO L.

*Partus difficilis.*

**H**onestissima Matrona doloribus partus per-  
biduum frustra defatigata meam præsen-  
tiam efflagitavit. Cum alvus fuerit adstri-  
cta & facultas expultrix uteri languida, mox cly-  
sterem injicere jussi. *R. rad. alth. ʒj. herb. parietar. malv. meliss. artemis. ʒ Mj. flor. chamam. Pj. sem. lini ʒß. coq. in aq. font. q. s. in colat. ʒviij. solv. mell. anthos. ʒij. ol. cheirin. ʒß. F. clyster: unde aliquoties dejecit, & majus facultatis uteri expultricis robur sensit. Quapropter statim ad fœtus conservationem & partus accelerationem sequentia remedia præscripsi. R. aq. embryon. ʒj. artemis. ʒiiij. pulegii ʒiß. cinnam. ʒß. sacch. opt. ʒij. Misce, sumatur duabus vicibus. R. succini albi præpar. cinnam. croci opt. ʒß. F. pulvis subtilissimus pro una dosi in jusculeo carneo sumendus. R. ol. cheirin. ʒß. lil. albor. chamam. ʒ ʒij. unguent. resumptiv. q. s. F. linimentum, quo uteri regio calidè illinatur. Ex usu horum remediorum Matrona ista puerulum vivum & incolumem enixa fuit. Hasce formulas mihi communicavit D. MATTHIAS HARSCHERUS Basil. Archiater & Academiæ quondam Antecessor, quæ Agnatum meum propter feliciter exercitam tum in Patria, tum apud Exteros praxin medicam,*

*nec ventura silebunt*

*Lustra, nec ignota rapiet sub nube vetustas.*

## OBSERVATIO LI.

### *De usu cantharidum.*

**M**iles Rheinfeldensis sponsus, ad languidos Veneris stimulos suscitandos pulverem cantharidum spontè usurpavit, paulò post in urina reddenda tantum ardorem & dolorem cum sanguinis mictu passus erat, ut Basileam se conferre & auxilium meum implorare coactus fuerit. Præscripsi sequentia remedia, quæ juxta potum lactis vaccini ordinarium per aliquot dies usurpavit.

*Rj. amygd. dulc. rec. excort. ʒj. semin. cucum. melon. rec. excort. ā ʒß. papav. alb. ʒij. aq. malv. plantagin. ā ʒiij. violar. rosar. ā ʒj. F. emulsio, adde sacch. rosat. tab. ʒß. C. C. philosoph. præpar. ʒij. Misce pro aliquot dosibus. Rj. ol. violar. rosar. nymphae, ā ʒij. unguent. rosat. q. s. F. linimentum, quo vesica regio tepide illinatur.* Hinc omnis urinæ ardor & mictus sanguinis cessavit. Cantharides in milite isto tam dolorifica symptomata hanc ob causam excitarunt, quoniam illas in majore copia devoravit, nam bona fide attestari possum, me pulverem cantharidum in minore dosi cum ocul. cancr. rosar. ebor. & sal. ononid. ā ʒß. mixtum pro quatuor dosibus in hydropse ascite cum magno ægrotorum levamine præscripsisse. Alium tutissimum & lectu dignissimum modum, nempe per infusionem proponit

ponit *Thomas Bartholinus cent. V. histor. medic. rarior. LXXXII.* Scrupulus unus cantharidum in pulverem redactus infundatur uncis tribus vel quatuor vini Rhenani vel spiritus vini, stetque in infusione per aliquot dies, deinde per chartam bibulam filtretur, ut ex substantia cantharidum nihil admisceatur. Ex colato liquore cochlear unum septem aliis seu vini seu cerevisiæ admisceatur, & ex hoc mixto primo die unum, altero duo cochlearia & sic deinceps propinentur: in gonorrhœa virulenta, lotii suppressione & calculo felicem hujus præparatæ potionis eventum expertus est D. *Jac. Fr. Kotzbae*, Vir medicæ eruditione & experientia inclytus, cui meum hoc Lector debet.



## OBSERVATIO LII.

*De calculo vesicæ.**Viro Clarissimo & Eruditissimo*

DN. JOH. MELCHIORI WALTERO

Medicinæ Doctori &amp; Physico

*Tannensi meritissimo*

Amico meo colendo

BERNHARDUS VERZASCHÆ

S.P.D.

*Clarissime Domine Doctor*

Ex erudita epistola Tui amoris & favoris plena plenius & planius intellexi, Nobilissimum istum Dominum sententiam nostram, quod nempe in

pe in illius vesica calculus lateat, ex instinctu aliorum solam hanc ob causam non amplius approbare, quia Lithotomus ex immissione catheteris nullum in vesica calculum deprehendit. Rectè mones Vir Clarissime, summè necessarium esse, ut nostra sententia firmis rationibus suffulciatur & Nobilissimo isti Domino ad oculum demonstretur, explorationem catheteris indubitatum calculi absentis signum nequaquam exhibere, quod certè mihi facillimum erit; nam indicata per schedulam à nobilissimo Domino transmissam symptomata & signa satis superque declarant, calculum in vesica hædere. Experitur Nobilissimus Dominus in collo vesicæ manifestum dolorem, qui circa finem mictionis exasperatur, & ad glandis extremum porrigitur. Adest mingendi difficultas cum micturiendi conatu, urinæ stillicidio & ani tenesmo. Accedit inter mingendum suppressio urinæ, quæ in medio cursu intercipitur. Certè hæc omnia *ἰσχυροφαιρῶς* demonstrant, nobilissimi istius Domini vesicam calculo laborare. Hoc unicum superest, ut palmarium illud de catheteris exploratione argumentum, quod Nobilissimus Vir ex infusuratione aliorum tam fortiter urget, paulò latius examinem. Jam olim in *River. contract. lib. XIV. cap. II.* monui, quòd catheter immissus SÆPE calculum indicet, quamvis illud SEMPER præstare non possit, præsertim quando calculus à collo vesicæ distat, vel glutinosis humoribus involvitur, aut membranâ propriâ inclusus est: hinc in eodem capite illorum inscitiam aut si mavis invidiam improbavi, qui statim inflatis baccis proclamant, nul-  
lum

*tomia vesicæ cap. IIX.* attestatur, quod Anno M. DC. X. *Basileæ* una cum doctissimis & celeberrimis Medicis Dn. *Felice Platero* & Dn. *Cassaro Bauhino* ad primum Nobilem Alfatam vocatus fuerit, qui à multis annis calculo atrociter divexabatur, nullus tamen Lithotomus calculum cathetere deprehendit, quamvis simul experientissimos Medicos adhibuerit, imo ipsemet *Fabricius Hildanus* summâ licet adhibitâ diligentia nunquam efficere potuit, ut digito vel instrumento calculum in vesica offenderet: attamen post illius discessum Dn. D. *Bauhinus* ingentes aliquot calculos peculiari sacco vesicæ annato inclusos invenit. Insuper quàm lubrica immissi catheteris exploratio sit, exemplum funestū præbuit Vir Amplissimus & Prudentissimus, DN. JACOBUS HUMMELIUS, Tribunus Plebis spectatissimus, apud quem licet omnia calculi signa exactè observata fuerint, ille tamen per immissum catheterem explorari nequivit, unde etiam illius honoratissima Familia, Clarissimi *Felices Plateri*, meamq; de calculo vesicæ præsentis sententiam in dubium vocarunt: sed post beatum Tanti Viri obitum jussu Familiæ Dn. *Platerus* abdomen aperuit, & in vesica calculum nuci juglandi non absimilem humoribus puitosis & propria quasi vesiculâ obvallatum invenit. Plura alia exempla de fallace catheteris usu in explorandis vesicæ calculis suppeditat major Avunculus Tuus, Vir excellentissimus, *Johannes Schenckius lib. III. de calcul. vesicæ observat. III.* qui liber cum tibi sit ad manus, & ne epistolæ limites transcendere videar, illa heic recensere supervacaneum esse judico. Sufficiunt hæc  
ad



ad vindicandam nostram sententiam contra Lithotomi & aliorum Censorum judicia. Verum enimverò operæ pretium erit, epistolam hanc descriptam Nobilissimo isti Domino transmittere, ut solidis istis rationibus convictus videat, nostram sententiam firmo talo inniti, e contra Lithotomi Zoili & illius sociorum opinionem de exploratione catheteris esse


*Doctus incertam & tenui tibicine fultam.*

Vale Vir Clarissime feliciter, & me sedulum noministui cultorem & famæ Vindicam porro, ut facis, amare perge. *Basilea die V. April. Ann. c1o 1o c lxx.*



## OBSERVATIO LIII.

### *Pestis.*

Um anno c1o 1o c lxxvii. mense Augusto truculenta pestis apud nos grassari inciperet, Amplissimo & Gratosissimo Magistratui nostro in publico confessu sedulam operam pollicitus, dilectissimæ Patriæ afflictæ (quod *ἡ ἀσθένεια* refero) diesque noctesque, ut verum Christianum Medicum decet, suppetias attuli: methodum autem medendi, qualem in visitandis Ægris lue pestifera infectis usurpare consueveram, Proli Asclepiadeæ in sequentibus observationibus candidè revelabo.

Primo Octobris die, inclytus Patriæ Pater, Vir Amplissimus & Prudentissimus, DN. JOHANNES LUDOVICUS KRUGIUS, illustris  
REIP.

REIP. BASIL. Consul, Majorum & propriâ famâ spectatissimus, ad juvenem suum Famulum ex honesta familia *Ratisbonensi* oriundum, me vocare jussit. Cùm omnia febris pestilentis signa in illo observassem, mox duas potiunculas sudorificas præscripsi, quarum priorem horâ tertiâ pomeridianâ, posteriorem autem horâ decimâ nocturnâ assumpsit, & exinde bis blandè sudavit. *R. Pulv. pannonic. rubr. ℥j. lapid. bezoar. oriental. ℥ss. aq. acetos. ℥ss. syrup. citri ℥ss. misce. R. aq. theriac. nostr. ℥ss. succisa syr. citri ā ℥ss. misce.* [Formula aquæ theriacalis nostræ sequens est. *R. radic. tormentil. vincetoxic. petasitid. succis. angelic. valerian. aristoloch. ver. ā ℥ss. herb. dictamn. scabios. scord. rutæ, carduibened. ā Mj. flor. 4. cordial. ā Pj. pomor. citr. num. XII. theriac. opt. mithridat. opt. ā ℥ss. croci oriental. ℥ss. camphor. ℥ss. vini alb. tenuior. q. s. ut aliquot digitis superemineat, aceti rosat. ℥iiij. rutac. ℥ij. postea s. a. in B. M. destillentur: dosis est ab ℥j. usque ad ℥ij. vel per se vel cum aliis mixta.] Pro potu ordinario sequens decoctum bibit. *R. C. C. ras. ℥iiij. coq. in aq. font. q. s. in colatura mensura unius solve syr. berber. papav. rhead. de succo citr. ā ℥ij. spirit. sulphur. ℥ij. misce.* Secundo die bubo in inguine dextro se manifestavit, hinc mandavi Chirurgo, ut vesicatorium in parte tumoris inferiore applicaret, & cataplasma meum ordinarium buboni imponeret, simulque faucibus inflammatis consueto gargarismo succurreret: eodem die Æger prædictas potiunculas diaphoreticas repetiit, quarum priorem horâ septimâ matutinâ, posteriorem tertiâ pomeridianâ assumpsit, & rursus bis cum *℥ss. aq. acetos.* sudavit. Ad vesperam rediens, cùm Æger de siti & calore febrili intenso ac*

continuo vomendi conatu conqueretur, sequentiâ remedia præscripti. R̄. aq. acetos. succis. ā ʒiib. syr. corallor. ʒj. papav. rhead. ʒb. spir. sulphur. gt. vij. F. julepus pro duabus dosibus. R̄. roobribium ʒj. conf. acetos. citri ʒb. confect. alkerin. hyacinth. incompl. ā ʒj. C. C. philos. preparat. ʒj. spec. pannonic. rubr. liberant. ā ʒb. syr. corallor. q. s. F. electuarium, de quo ad libitum sumat. R̄. ol. nuc. mosch. express. ʒj. balsam. perruvian. liq. ʒb. ol. stillat. arantior. ʒb. angel. gt. v. F. balsamum, quo scrobiculus cordis dictus inungatur. Cùm tertio die summo mane ægrum viribus prostratum animadvertissem, conquesta mihi est mulier clinica, Chirurgum præcedenti die quidem vesicatorium & cataplasma admovisse, sed vesperi contra mandatum meum emanasse: quamprimum vocavi Chirurgum & supinam illius negligentiam nullis modis excusandam severè objurgavi, præsertim cùm remoto vesicatorio & cataplasmate amplius bubo non apparuerit: inde colligebam, functiones vitales à retrò meatu veneni pestilentialis oppressas esse, hinc omni studio contendebam, illud remediis sudoriferis roborantibus à corde ad corporis superficiem repellere, quapropter statim sequentes potiunculas diaphoreticas præscripti, quarum priorem eodem manè & posteriorem horâ tertiâ pomeridianâ usurpavit. R̄. aq. acetos. ʒij. syr. citri ʒiib. mihrid. opt. ʒj. spec. liberant. ʒj. misce. R̄. aq. acetos. ʒij. syr. citri ʒiib. theriac ver. ʒij. pulv. pannonic. rubr. ʒb. lapid. bezoar. oriental. gr. iiij. Misce. Ad virium robur conservandum sequens aqua cardiaca præscripta fuit: R̄. aq. cardiac. officin. acetos. nymphae ā ʒiib. syr. pæon. ʒj. citri ʒb. julep. rosar. ʒiij. confect. alkerin. incompl. ʒj. spec. libe-

rant.

rant. pulv. pannonic. rubr. C. C. philosoph. prepar. ā ʒβ. misce. Quarto die propter metum paraphrenitidis manē potiunculam bezoardicam & linimentum cephalicum præscripsi. R. lapid. bezoar. oriental. C. C. philos. prepar. ā ʒβ. aq. nymph. ʒj. syr. citri ʒβ. misce, sumatur statim. R. unguent. alabastr. ʒij. ol. still. citri ʒβ. F. linimentum ad formam balsami, quo tempora inungantur. Vesperti julepum præscripsi. R. aq. nymph. ʒiiij. rosar. ʒj. syr. papav. erratic. ʒiβ. citri β. spir. sulphur. gt. ʒviii. F. julepus pro duabus dosibus nocturnis. Quinto die ob delirium continuum & potiuncula bezoardica & julepus repetitus fuit. Sexto die propter urgentem paraphrenitidem sequenti potiunculâ usus fuit, cujus dimidiam partem manē, alteram vesperti assumpsit. R. aq. theriacal. nostr. scordii, nymphæ, ā ʒij. syr. de succo citr. ʒiβ. rub. idæi ʒj. confect. alkerm. incompl. ʒj. spec. liberant. pulv. pannonic. rubr. ā ʒβ. misce. Septimo die Ægrum periculosissima diarrhœa cum virium jactura & siti immensa comprehendit, hinc sequentem potum ordinarium & julepum præscripsi. R. C. C. ras. ʒβ. rad. tormentil. acetos. ā ʒij. coq. in aq. font. in colatur. mensuræ unius solve syr. corallorum ʒij. rubi idæi, granator. ribium ā ʒj. spir. sulphur. ʒj. misce pro potu ordinario. R. aq. acetos. ʒiiij. plantagin. syrup. corallor. rubi idæi, ā ʒj. F. julepus pro duabus dosibus. Die octavo fluxus alvi adhuc duravit, hinc jussi emulsionem amygdalinam cum decocto C. C. paratam etiam pro potu ordinario & præcedentem julepum rursus exhibere. Die nono ob durantem alvi fluxum sequens emulsio præscripta fuit. R. amygdal. dulc. recent. excortic. ʒβ. sem. cucum. melon. recent. excortic. ā ʒij. papav. alb. ʒj. aq. acetos. ʒiiij. plantag. ʒij. F. emulsio.

ad. sacch. rosat. tab. ʒij. C. C. philosoph. præpar. ʒj. misce pro duabus dosibus. Die decimo delirium & fluxus alvi cessavit, e contra tussis molestissima ægrum corripuit, contra quam sequentia remedia præscripsi. R̄. aq. scabios. acetos. farfar. ā ʒij. syr. violar. purpur. granator. ā ʒj. spir. sulphur. gt. vj. F. julepus pro duabus dosibus. R̄. syr. farfar. papav. rhead. berber. ā ʒj. aq. farfar. ʒß. misce, de quo sape cochlear. plenum assumat. Undecimo die, cū tussis nondum remitteret & ægrum maximè debilitaret, sequentes rotulas usurpavit. R̄. confect. alkerm. ʒj. spec. diatrios simpl. ʒiß. diatrag. frig. liberant. ā ʒj. sacch. opt. aq. farfar. solut. ʒiij. F. s. a. rotula. Duodecimo die contra molestissimam hanc tussim pro potu ordinario sequens decoctum & julepum præscripsi. R̄. radic. liquir. ras. ʒj. acetos. ʒij. jujubar. recent. num. iij. coq. in aq. fontan. q. s. in colatur. mensur. unius solve syr. violar. purpur. ʒiij. papav. erratic. granator. ā ʒij. spir. sulphur. ʒij. misce pro potu ordinario. R̄. aq. scabios. ʒiij. farfar. ʒij. syr. violar. purpur. ʒiß. papaver. erratic. ʒß. spir. sulphur. gt. vj. F. julepus pro duabus dosibus. Decimo tertio die Æger blandam potiunculam purgantem usurpavit. R̄. manna Calabrin. elect. ʒij. aq. farfar. q. s. F. potiuncula: unde aliquoties dejecit. Ex talium remediorum usu diligente tussis reliquaque pestis symptomata cessavere, nihilominus ad robur virium recuperandum sequentem trageam præscripsi. R̄. spec. de hyacinth. diatriosfantal. diamargar. frig. ā ʒj. ocul. cancr. præpar. ʒiß. sacch. rosat. tabul. ʒiij. F. s. a. tragea mane & vespere consueto modo usurpanda. Hinc Æger omnimodè convaluit. Cū de restituta Filii valetudine secunda exoptatum hoc nuncium Pater per literas rescivisset,

visset, ille prolixas gratias mihi referendo simul per manum candidam præfati amplissimi Domini Consulis honorario lauto me muneravit.

## OBSERVATIO LIV.

*Pestis.*

**E**Ivis honesti Uxor dilectissima ad diem quintum mensis *Septembris* peste correpta fuit. Vocatus statim sequentem potiunculam sudoriferam præscripsi. *R. aq. theriacal. nostr. ℥i℥. succisa syr. citri ʒj. misce:* hinc cum levamine sudavit. Bubonem in inguine dextro apparentem jussi Chirurgum meâ methodo ordinariâ tractare, quam inferiùs in singulari observatione proponam. Vesperi ad dolorem capitis & æstum febrilem mitigandum emulsio præscripta fuit. *R. amygd. dulc. recent. excortic. ℥iij. sem. cucum. melon. recent. excortic. ʒj. papav. albi ʒj. aq. acetos. succis. ʒiij. F. emulsio add. sacch. rosat. tabul. ℥℥. C. C. philosoph. præpar. ℥ij. misce pro duabus dosibus nocturnis.* Pro potu ordinario decoctum C. C. bibit, cujus cyatho pleno de sequentibus syrupis aliquot cochlearia admiscebantur. *R. syr. berber. citri ʒj. papav. rhead. ℥i℥. spir. sulphur. ℥ij. misce.* Secundo morbi die manè iterum potiunculam sudoriferam usurpavit. *R. pulv. pannonic. rub. ʒj. lapid. bezoar. oriental. ver. ʒ℥. aq. acetos. ʒvj. syr. citri ℥iij. misce:* unde rursus blandè sudavit. Cum vesperi redirem, & ægra de insigni dolore

H 3 capitis

capitis & æstu febrili ac triduanâ alvi constipatione conquereretur, sequentia remedia præscripsi. *Rx. unguent. alabastr. ʒij. ol. destillat. citri ʒj. F. linimentum frontale. Rx. roob ribium ʒiʒ. conserv. acetos. citri ʒʒ. C.C. philosophic. preparat. ʒj. spec. liberant. pannonic. rubr. ʒʒ. syr. berber. q.s. F. electuarium, de quo pro lubitu magnitudo avellanae sumatur. Rx. rad. scorzoner. alth. ʒʒj. herb. scord. betonic. malv. ʒ Mj. sem. anis. ʒij. coq. in aq. fontan. q.s. in colat. ʒx. solv. elect. diacathol. ʒj mell. violar. ʒiʒ. F. clyster. Tertio die natura ad sudorem sponte inclinavit, hinc ægra sequentem potiunculam diaphoreticam usurpavit. Rx. aq. theriacal. nostr. ʒiʒ. syr. citri ʒj. misce. exin blandè sudavit: vesperi præcedens emulsio reiterata, & ad virium robur conservandum aqua cardiaca præscripta fuit. Rx. aq. cardiac. offic. succis. pæonia, ʒʒj. syr. citri ʒʒ. confect. alterm. incompl. ʒj. misce. Quarto die præcedens electuarium repetitum & sequentes rotulae pro virium robore præscriptæ fuerunt. Rx. confect. alterm. incompl. ʒj. spec. liberant. pulver. pannonic. rubr. ʒʒij. sacch. opt. aq. borragin. solut. ʒij. F. s. a. rotulae pro beneplacito usurpanda. Quinto die usum prædictorum remedium continuavit. Sexto potiunculam sudoriferam cum levamine, & septimo die emulsionem prænominatam repetiit. Octavo die, cum omnia pestis symptomata ferè disparuissent, Ægræ valedixi.*

OBSER-

## OBSERVATIO LV.

*Pestis cum anthrace.*

**M**Ir quadraginta annorum peste correptus ad vesperam me vocavit: conquestus fuit de insigni præcordiorum angustia, calore febrili & dolore capitis; hinc sequentem potiunculam diaphoreticam præscripsi. *℞. theriac. Andromach. ʒj. elect. diascord. Fracastor. ʒʒ. pulv. pannon. rubr. ʒj. aq. acetos. ʒij. misce: sumpsit statim, & noctu blandè sudavit. Secundo die summo manè accedens observavi in brachio dextro anthracem, quem ordinariâ meâ medendi methodo (cujus in observatione propria inferiùs mentionem faciam) tractare Chirurgum jussi, simulq; sequens potiuncula sudorifera præscripta fuit. *℞. electuar. diascord. Fracastor. ʒj. mithrid. opt. ʒʒ. spec. liberant. ʒj. aq. succisa ʒij. misce: exin rursus cum levamine sudavit. Pro potu ordinario decoctum C. C. limati bibit. Tercio die ad majorem veneni pestilentis expulsionem sequens electuarium præscripsi. *℞. conf. rosar. rubr. ʒj. acetos. citri, radic. enula cond. roobribium a ʒʒ. elect. diascord. Fracastor. ʒij. pulver. pannonic. rubr. ʒj. liberantis ʒʒ. C. C. philosophic. præpar. ʒʒ. syr. berber. q. s. F. electuarium, de quo ad libitum magnitudo avellana sumatur. Unde ex usu horum remediorum convalescenti Ægroto valedixi.***





## OBSERVATIO LVI.

*Pestis cum bubone.*

**V**irum triginta annorum noctu pestis ag-  
gressa est: manè ad illum vocatus statim  
potiunculam diaphoreticam præscripsi.  
℞. elect. diascord. Fracastor. ʒj. theriac. Andromach. ʒʒ. sal.  
absinth. ℥ʒ. aq. carduibened. ʒij. misce, sumatur statim.  
hinc æger copiosè sudavit, & in inguine dextro ap-  
paruit magnus bubo, quem Chirurgus juxta meam  
medendi methodum tractavit. Pro potu ordina-  
rio sequens decoctum bibit. ℞. C. C. limat. ʒʒ. coq.  
in aq. fontan. q. s. in colat. ℥vj. solve sacch. rosat. tabul. ʒj.  
nitri præpar. ʒiij. sal. absinth. ʒj. additum fuit sal absin-  
thii ob continuum vomendi conatum, qui ægrum  
discruciabat. Secundo die prædictam potiuncu-  
lam diaphoreticam cum magno levamine rursum  
usurpavit. Tertio die ad propulsionem veneni se-  
quens electuarium præscripsi. ℞. conserv. rosar. rubr.  
roob ribium ā ʒj. elect. diascord. Fracastor. ʒij. mithridat.  
opt. theriac. Andromach. ā ʒʒ. confect. hyacinth. incompl.  
ʒij spec liberant. ʒj. syr. citri q. s. F. electuarium, de quo ad  
lubitum magnitudo nucista sumatur. Quarto die, cum  
de dolore capitis & siti vehemente conquereretur,  
julepum sumpsit. ℞. aq. nymphae acetos. ā ʒiij. syr. ber-  
ber. ʒij. papav. rhead. ʒj. spir. vitriol. gt. vj. F. julepus pro  
duabus dosibus. Quinto die manè bolum sudorife-  
rum usurpavit. ℞. mithrid. opt. ʒj. confect. hyacinth.  
incompl. ʒj. sacch. opt. q. s. F. bolus. Sexto die præno-  
mina-

minatum julepum repetiit. Cùm septimo die omnia symptomata mitiora apparuissent, jussi usum electuarii continuare, & sic Æger prosperæ sanitati restitutus fuit.



## OBSERVATIO LVII.

*Pestis sine febre.*

**F**Amulus ægrotorum peste infectorum im-  
perterritus me invisit, & anthracem in fe-  
more ostendit: quum in illo nullum febris  
signum animadvertissem, mandavi ipsi, ut manè  
sequentem pulverem diaphoreticū sumeret. *℞. bolis  
armen. ʒij. flor. sulphur. ʒss. camphor. gr. iij. F. pulvis:*  
exin copiosè sudavit, melius se habuit, & anthra-  
cem solo unguento basilico curavit. Quòd autem  
pestis sine febre aliquoties hominem invadat, &  
quantas contra hanc luem vires possideat bolus ar-  
mena, jam olim docuit Galenus lib. IX. de simplic. me-  
dicamentor. facultatib. cap. VI. ἐν τῷ μεγάλῳ τύτῳ λοιμῷ πα-  
ρεπλησίῳ τῷ ἰδίῳ ὄντι καὶ Θεοκλιδῶ γεννηθῆναι πάντες οἱ πρῶτοις  
τύτῳ φαρμάκῳ διὰ ταχίαν ἰσχυροποιήσαν· ὅσους δὲ ἐδὲν ὠνησέν  
ἀπώθαιον πάντες, ἐδ' ἔτι ἄλλα τινὸς ὠφελήθησαν, ὃ καὶ εἰς τοὺς ὀλί-  
μους τὸς ἀναισθητοὺς ἔχοντας σὺν ὠφελήσει. πίνεταί γε μὲν οἶνος λεπτῷ  
τῷ σύστασι, κακοκρῖν μάλιστα μὲν εἰ ἀπύρετον εἴη παύσασθαι  
ὁ ἀνθρώπος, ἢ βροχὴν πυρεταῖοι, πάντες δὲ ὑδαρῆς εἰ πυρεταῖοι μεί-  
ζοντες. in magna hac peste, cujus eadem facies fuit atque ejus,  
quæ Thucydidis memoria grassabatur, quotquot hoc me-  
dicamen nōmpe bolum armenam bibere, celeriter cu-  
rati sunt: at quibus non profuit, omnes interiере, scilicet  
cū nec alio quovis curarentur: unde colligitur, quòd iis dun-

*taxat non fuerit auxilio, qui planè erant incurabiles: bibitur autem ex vino albo, consistentiâ tenui, modicè diluto, si aut planè febris careat, aut leniter eâ teneatur, sin gravius febriat, admodum aqueo.*

Cùm in hoc textu expressis verbis *Galenus* asserat, peste infectum planè sine febre inveniri posse, miror nonnullos Viros Clarissimos, magnos aliàs *Galen*i admiratores propugnare,

Πύξιτε παλαμωσύνη τε καὶ ἄλμασιν ἢ διὰ πόδισσιν,

quodd pestis essentia in febre consistat, hinc inter illos à nonneminè definitur: *pestis est febris epidemia à contagione perniciofa orta.* Ad textum *Galenicum* respondet Vir Clarissimus: quodd *Galenus*, dum *Armeniam* terram propinare pestilentibus jubet, febris rationem habere vult, id potiùs in maximè vel minùs insignem calorem referendum videtur. Sed hæc interpretatio Viri Clarissimi definitionem non suffulcit: licet enim *Galenus* statuât, holum armenam ex vino albo modicè diluto peste infectis concedi, si leviter febricitent, & admodum aqueo, si gravius febriant; nihilominus manifestè etiam fatetur, quodd ἀνθρώπου πανόρωσιν ἀπύρετον peste infectus HOMO OMNINO SINE FEBRE decumbere possit: unde sole meridiano clarius elucescit, *Galenum* in tres classes peste infectos redigere, πανόρωσιν ἀπύρετους, βράχῃ πυρετῶνους καὶ μείζονας πυρετῶνους, quorum primi omninò febre carent, secundi leviter febricitant, tertii graviùs ex febre decumbunt. Aliorum argumenta examinare institutum meum non permittit, accuratè hoc præstitit Vir excellentissimus *Isbrandus de Diemerbroeck* in erudito suo opere de peste lib. I. cap. XII. annot. II. qui etiam in pestilentia

stilentia *Noviomagensi* bubones & anthraces non semel sine febre vidit, imò ipsemet magnum carbunculum pestilentem in manu sinistra habuit sine ulla febre & sanitatis dispendio. Sic *Johannes Morellus libr. de peste cap. IV.* attestatur, se in peste *Cabilonensi* sæpius observasse bubones & carbunculos, quos nulla febris comitata fuit.



## OBSERVATIO LIIIX.

*Pestis propter administratam venæsectionem funesta.*

**V**ir quinquaginta annorum, Vicinus meus, præludia pestis in semetipso advertens, Chirurgi ædes adivit, & sibi venam in brachio aperire jussit, vix domum reversus magnam virium imbecillitatem, vomitum enormem & inexplicabilem cordis angustiam passus est. Vocatus potiunculam diaphoreticam, quam ternâ vice sumpsit, sed statim rursus evomuit, & sequentem aquam cardiacam præscripsi. *℞. aq. acetos. ℥ij. mithrid. opt. theriac. Andromach. ā ʒss. pulver. pannonic rubr. ʒj. sal. absinth. ʒss. misce. ℞. aq. cardiac. officin. ℥ij. carduibened. meliss. ā ʒj. margarit. prepar. ʒj. sal. corall. ʒss. misce:* de qua cochlear plenum pro lubitu sumpsit: ad vesperam delirare incepit & circa mediam noctem huic mundo valedixit. Infortunato successu & lethali ut plurimum exitu venæsectiones grafsante hâc lue institutas fuisse, alii nostri Medici, qui

qui in visitandis ægris peste correptis Patriæ afflictæ indefessam operam attulerunt, indeque famam nominis immortalem reportarunt, sæpius etiam observaverunt: unde Chirurgis severè injunctum fuit, ne ulli hominum sive sano sive ægro, nisi prius Medici ordinarii consensus accedat, venam aperiant. Quòd autem extremo vitæ cum periculo venarum apertiones in peste instituantur, nactâ hâc occasione plenius comprobabo. Extra omnem dubitationis aleam positum est, sedulos Medicos in peste curanda omnem lapidem movere, quò vires à veneno pestilenti prostratæ restaurentur, spiritus dissipati refocillentur, functionesque vitales adhibitâ omni diligentia conserventur, ut natura truculento huic morbo fortiùs resistere, & venenum sive per sudores vel bubones aut anthraces expellere queat, an autem hoc per venarum apertionem & sanguinis educationem præstari possit, illud accuratioribus Medicis, ab omni præjudicio liberis, dijudicandum relinquo. Accedit summorum in arte nostra Virorum fida autoritas & experientia, quæ funesto cum exitu venas in peste apertas fuisse testimoniis omni exceptione majoribus comprobat. Omnium loco proferam testimonium annotatione dignum, quod *Fernelius lib. II. de abditis rerum causis cap. XII.* proponit, in peste Medici celeberrimi, qui longo artis usu doctrinæ studia compleverunt, prorsus abstinere à venæsectione, experti eos, quibus sanguis sive initio sive postea esset missus, aut paulò post obiisse, aut in deterius lapsos esse, non enim (ut quibusdam videri posset) evacuatio hanc perniciem summovet aut immi-

nuic

nuit aut cohibet, ut quæ non est in humoris vitio posita, neque laborantem ullâ ratione levat, sed contra gravius offendit: etenim extrinsecus nos circumfundens pernicies vacuato sanguine & spiritu, in pulmones, in cor & in venas facilius penetrat & ferocia majore invalescit. Sanguis enim phlebotomiâ concitatus promptius labem contrahit, quemadmodum aqua, cui fellis tantillum injeceris, si agitetur, ocyus, quàm si consistat, amarescit: quin etiam vires agitatione imminutæ insipienti pernicipi minùs obsistunt: hæ rationes experienciâ confirmatæ, ut à venæsectione, ita magis à valida purgatione docent abstinendum. Cùm huic testimonio *Fernelii*, ponderibus rationum gravi, adhuc majorem fidem concilient duæ historiæ lectu dignissimæ, quas *Isbrandus de Diemerbroeck lib. IV. de peste histor. XXIX. & LIII.* cum annotationibus recenset, illas summatim huic observationi annectere necessarium esse duxi. *Goswinus Dyckvoldt*, Vir fortis, de aggravante capitis dolore & cordis anxietate conquestus est, atque adedò somnolentus fuit, ut vix à somno abstinere potuisset, circa vesperam ad illum vocatus alexipharmacum præscripsi, & jussi, ut adstantes ipsum continuò alloquerentur, ac omnibus modis somnum impedirent, usque dum per quatuor vel quinque horas egregiè sudasset: post sudorem planè cessavit anxietas cum somnolentia, ita ut sequenti manè multò melius se haberet, licèt tunc etiam duo magni carbunculi alter in brachio, & alter in femore apparuerint. Cùm autem propter ægrorum multitudinem illo manè hunc ægrum non satis tempestivè inviserem, statim

statim nasutus quidam Chirurgus vocatus fuit, qui meum adventum non exspectans suo consilio venam brachii incidit, sanguinis circiter uncias decem extraxit, & mihi obviam factus tanquam re benè gestâ factum narravit. Post tres à phlebotomia horas ægrum simul invisimus, quem Chirurgus à sanguinis missione multum fore allevatum existimabat, sed conjectura illum fefellit, nam varia desperata signa in ægro animadvertimus, carbunculi non tumidi nec in circumferentia inflammati, sed exiles, depressi & aridi visi erant, febris vehementissima accesserat cum maxima anxietate, quam tanta comitabatur virium debilitas, ut intra paucas horas Æger vitam cum morte commutarit. *Theodorus Wesemer*, cum Aviam pestelaborantem invisisset, contagio infectus atque vertiginosum capitis dolorem passus fuit. Chirurgum vocavit, qui alexipharmacum ipsi statim exhibuit, à quo multum sudavit, & durus tumor dolorificus retrò aures apparuit. Tunc Chirurgus venæsectionem suavit, atque ex affecti lateris brachio uncias decem sanguinis extraxit. Æger inter Chirurgi manus syncope correptus lecto impositus est: paulò post ad se rediens de summa cordis debilitate & anxietate conquestus fuit, quam præcedente horrore & frigore vehemens febris subsequuta erat. Tunc meum consilium petatum fuit: inveni ægrum adedò debilem, ut vix loqui posset, tumor retro aures disparuerat, & pulsus creber, inæqualis & parvus erat: post paucas horas diuturniore deliquio accedente Æger diem suum obiit.



## OBSERVATIO LIX.

*Pestis cum pleuritide.*

**P**Rænominati Viri Uxorem, ex inopinato mariti obitu maximè consternatam, pestis cum febre acuta invasit: vocatus primo die potiunculam diaphoreticam blandam præscripsi. *Rx. aq. theriacal. nostr. acetos. ʒiβ. C.C. philosophic. præpar. ʒj. misce:* hinc blandè sudavit. Vespero propter intensum calorem julepo refrigerante usa fuit. *Rx. aq. nymphae, acetos. ʒiij. syr. berber. papav. rhead. ʒj. spir. vitriol. gt. viij. F. julepus pro duabus dosibus nocturnis.* Secundo die rursus sudavit, & prædictum julepum noctu usurpavit. Tertio die pleuritis acutissima ægrotam corripuit, quæ respirationem intercipiendo post aliquot horas illam e medio sustulit. Pleuritis pesti accedens semper lethalis est, quoniam illa non solum ab inflammatione pleuræ, sed etiam à pestilenti veneno isti membranæ infixæ originem trahit, unde post inflammationem simul pleuræ vicinarumque partium *vixæ mortificatio* inducitur, quæ nullis remediis sanari potest.

OBSER-



## OBSERVATIO LX.

*Pestis cum bubone.*

**V**irgo honesta & modesta, magnum Viduæ Matris delictum & solatium, noctu peste correpta fuit: manè vocatus de summa virium jactura, sitis vehementia, capitis dolore, pectoris angustia & appetitu prostrato conquerebatur, mox potiunculam diaphoreticam præscripsi. *R. aq. theriacal. nostr. succis. ã ʒiʒ. mithridat. opt. ʒʒ. pulver. pannonic. rubr. ʒj. misce: exin blandè sudavit.* Pro potu ordinario sequens decoctum bibit. *R. C. C. limati ʒʒ. coq. in aq. font. q. s. ad mensuram unam in colat. sol. sacch. rosat. tabul. ʒiʒ. nitr. prapar. ʒij. misce.* Vespere julepum contra prædicta symptomata proficuum usurpavit. *R. aq. borragin. nymphae, acetos. ã ʒij. syr. corallor. papaver. rhead. ã ʒj. spirit. sulphur. gt. viij. F. julepus pro duabus dosibus nocturnis.* Secundo die in inguine dextro apparuit bubo, quem Chirurgus consuetâ methodo tractavit, hinc ægra prædictam potiunculam diaphoreticam repetiit. Tertio die illam diarrhœa periculosa invaluit, unde electuarium sequens præscripsi. *R. conserv. rosar. rubr. ʒj. electuar. diascord. Fracastor. ʒj. theriac. Androm. mithrid. opt. ã ʒʒ. confect. hyacinth. incompl. ʒiʒ. pulv. pannonic. rubr. C. C. philosoph. prapar. spec. diatrionsantal. ã ʒj. syr. corallor. q. s. F. electuarium, de quo ad libitum magnitudo avellana sumatur: unde fluxus alvi imminutus fuit. Quarto die ob linguam & fauces inflammatas sequenti garga-*

gargarismo & syrupis usa fuit. *Rj. aq. plantagin. brunell. fl. ligustr. ā ʒij. acet. rosat. ʒij. mell. rosat. diamor. simplic. ā ʒß. nitri prepar. ʒj. F. gargarismus. Rj. syr. berber. granator. papav. rhead. ā ʒj. aq. plantagin. ʒß. misce, de quo ægra aliquoties cochlear plenum usurpet: hinc inflammatio faucium cessavit. Quinto die, cū in ægra magnam functionū vitaliū jacturam observassem, aqua cardiaca, cujus sæpe cochlear plenum sumat, præscripta fuit. Rj. aq. cardiac. offic. ʒij. acetos. borragin. ā ʒj. margarit. prepar. ʒj. C. C. philosophic. prepar. ʒß. misce. Sexto & septimo die usum electuarii & aquæ cardiacæ continuavit. Octavo die, cū in illa pulsum parvum & inæqualem animadvertissem, mulieri clinicæ mandavi, ut ægrotæ cochlear plenum de aqua cardiaca sæpius concedat: ad vesp̄eram pro virium robore julepum præscripsi. Rj. aq. borragin. violar. acetos. ā ʒj. syr. citri ʒiß. corallor. ʒj. F. julepus pro duabus dosibus nocturnis. Nono die potiunculam sudoriferam roborantem usurpavit. Rj. lapid. bezoar. oriental. CC. philosophic. prepar. ā ʒß. aq. acetos. ʒß. misce: exin blandè cū magno levamine sudavit. Ab hoc die dolor capitis & angustia præcordiorum imminuta fuit, fluxus alvi omnimodè cessavit, & appetitus naturalis rediit: hinc præscriptâ prius trageâ convenienti ægrotæ valedixi. Rj. ras. eboris ʒj. ocul. cancr. prepar. ʒiß. corall. rubr. preparat. ʒj. spec. diatrionsantal. ʒij. diarrhod. abbat. ʒß. rosat. novel. ʒj. sacch. rosat. tab. ʒiij. F. s. a. tragea more consueto usurpanda.*



## OBSERVATIO LXI.

*Pestis maculosa.*

**V**ir viginti aliquot annorum, Cognatus meus, qui grassantem hanc luem vehementer pertimescebat, peste correptus fuit. Summo manè vocatus illum totum consternatum deprehendi, hinc illi animum addidi, & potiunculam diaphoreticam cum aqua cardiaca præscripsi. ℞. elect. diascord. Fracastor. ʒiſs. confect. hyacinth. incompl. ʒſs. aq. acetos. ʒij. misce: sumat statim. ℞. aq. cardiac. officin. ʒij. borragin. ʒiſs. sacchar. rosat. tab. ʒj. margarit. præpar. ʒj. misce. Cùm vesperi de summa cordis anxietate & virium imbecillitate conquereretur, sequens electuarium roborans præscriptum fuit. ℞. conserv. rosar. rubr. borragin. ā ʒj. cort. citri cond. ʒſs. elect. diascord. Fracastor. ʒiſs. mithrid. opt. ʒj. confect. hyacinth. incompl. ʒiiij. pulver. pannonic. rubr. ʒj. syr. corallor. q. s. F. electuarium, de quo ad libitum magnitudo avellana sumatur. Secundo die potiunculam sudoriferam repetiit, & usum aquæ cardiacæ ac electuarii roborantis continuavit. Die tertio, quum in brachiis, manibus & pedibus maculas purpureas ac nigricantes observassem, mortem prædixi: prælagio respondit eventus, nam statim post meridiem æger vitam cum morte commutavit. Multi præclari Medici, teste magni nominis *Isbrando Diemerbroekio* hæc maculas quocunque tempore, sed præsertim decretorio apparentes die, salutíferas esse asse-

asserunt, inde forsan decepti, quodd earum originem non satis cognoverint, & ipsum pestilens venenum per hasce maculas expelli autumaverint: quantumvis enim eorum rationes evacuationem hancce criticam probare videantur, necesse tamen est, ut experientiæ contrarium docenti cedant, nam nihil interest, quàm acutè de hujus criseos bonitate disputetur, si subrepens mors pendentis litis decisionem faciat. Hinc observavit *Diemerbroekius*, horum exanthematum eruptionem semper spirituum vitalium internecionem, nunquam verò naturæ victoriam indicasse, quapropter simul ac in peste *Noviomagensi* exanthemata animadvertit, ægros in maximo vitæ periculo constitutos esse prædixit: quamvis enim per diem unum vel alterum (quod tamen rarum erat, nam plurimi post maculas eruptas horis aliquot elapsis moriebantur) sine gravibus symptomatibus ægri vitam protraherent, tandem nihilominus inopinanter rebus humanis exempti sunt, nam multos aded fortes vidit, qui loquentes & obambulantes ac nihil minùs quàm mortem exspectantes, præter aliorum opinionem morte extincti fuere: unde nec exanthematum multitudo (quam multi laudabilem judicant) nec illorum paucitas majorem vel minorem sanitatis spem promittebant, nam plures maculæ majorem quidem veneni copiam & violentiam majusque spirituum vitalium damnum indicabant, causam autem morbi nequaquam imminuebant, hinc æquè cum paucis & parvis quàm cum plurimis & majoribus Ægri moriebantur. Unde in truculentissima peste *Noviomagensi*, quæ




## OBSERVATIO LXI.

*Pestis maculosa.*

**V**Ir viginti aliquot annorum, Cognatus meus, qui grassantem hanc luem vehementer pertimescebat, peste correptus fuit. Summo manè vocatus illum totum consternatum deprehendi, hinc illi animum addidi, & potiunculam diaphoreticam cum aqua cardiaca præscripsi. *R̄. elect. diascord. Præcastor. ʒiʒ. confect. hyacinth. incompl. ʒʒ. aq. acetos. ʒij. misce: sumat statim. R̄. aq. cardiac. officin. ʒij. borragin. ʒiʒ. sacchar. rosat. tab. ʒj. margarit. præpar. ʒj. misce.* Cùm vesperi de summa cordis anxietate & virium imbecillitate conquereretur, sequens electuarium roborans præscriptum fuit. *R̄. conserv. rosar. rubr. borragin. ā ʒj. cort. citri cond. ʒʒ. elect. diascord. Præcastor. ʒiʒ. mithrid. opt. ʒj. confect. hyacinth. incompl. ʒiiij. pulver. pannonic. rubr. ʒj. syr. corallor. q. s. F. electuarium, de quo ad libitum magnitudo avellana sumatur.* Secundo die potiunculam sudoriferam repetiit, & usum aquæ cardiacæ ac electuarii roborantis continuavit. Die tertio, quum in brachiis, manibus & pedibus maculas purpureas ac nigricantes observassem, mortem prædixi: prælagio respondit eventus, nam statim post meridiem æger vitam cum morte commutavit. Multi præclari Medici, teste magni nominis *Isbrando Diemerbroeckio* hæc maculas quocunque tempore, sed præsertim decretorio apparentes die, salutiferas esse asse-

asserunt, inde forsan decepti, quodd earum originem non satis cognoverint, & ipsum pestilens venenum per hasce maculas expelli autumaverint: quantumvis enim eorum rationes evacuationem hancce criticam probare videantur, necesse tamen est, ut experientiæ contrarium docenti cedant, nam nihil interest, quàm acutè de hujus criseos bonitate disputetur, si subrepens mors pendentis litis decisionem faciat. Hinc observavit *Diemerbroekius*, horum exanthematum eruptionem semper spirituum vitalium internecionem, nunquam verò naturæ victoriam indicasse, quapropter simul ac in peste *Noviomagensi* exanthemata animadvertit, ægros in maximo vitæ periculo constitutos esse prædixit: quamvis enim per diem unum vel alterum (quod tamen rarum erat, nam plurimi post maculas eruptas horis aliquot elapsis moriebantur) sine gravibus symptomatibus ægri vitam protraherent, tandem nihilominus inopinanter rebus humanis exempti sunt, nam multos aded fortes vidit, qui loquentes & obambulantes ac nihil minùs quàm mortem expectantes, præter aliorum opinionem morte extincti fuere: unde nec exanthematum multitudo (quam multi laudabilem judicant) nec illorum paucitas majorem vel minorem sanitatis spem promittebant, nam plures maculæ majorem quidem veneni copiam & violentiam majusque spirituum vitalium damnum indicabant, causam autem morbi nequaquam imminuebant, hinc æquè cum paucis & parvis quàm cum plurimis & majoribus Ægri moriebantur. Unde in truculentissima peste *Noviomagensi*, quæ

decem hominum millia è medio fustulit, unicum puellum cum purpureis exanthematibus evasisse Diemerbrockius observavit, cujus historiam lib. IV. de peste histor. XLI. proponit.



## OBSERVATIO LXII.

*Pestis cum quatuor carbunculis.*

**P**ropter improvifum prænominati Cognati mei obitum ejus Uxor juvenis maximè perculfa, etiam peste correpta fuit. Vocatus illi potiunculam fudoriferam præfcripti. R̄. aq. theriacal. noſtr. ʒj. elect. diaſcord. Fracaſtor. ʒj. C. C. philoſoph. præpar. ʒj. miſce: exin blandè fudavit, unde duo carbunculi unus in brachio, alter in manu eruperunt, quos conſuetâ methodo meâ Chirurgus tractavit. Secundo die prædictam potionem ægra repetiit, hinc rurfus duo carbunculi unus in abdomine, alter in femore ſe manifeſtarunt. Tertio die ob vires debilitatas aqua cardiaca & electuarium roborans præſcriptum fuit. R̄. aq. cardiac. officin. ʒj. borragin. ʒij. ſacch. roſat. ʒj. margarit. præpar. ʒj. miſce: de quo ſapè cochlear plenum concedatur. R̄. conſ. roſar. rubr. ʒj. borragin. ʒß. bugloſſ. ʒij. conſect. hyacinth. incomp. ʒiſſ. C. C. philoſoph. præpar. ſpec. diamargar frig. ʒj. ſyr corallor. q. ſ. F. electuarium, de quo ſapè magnitudo avellane uſurpetur. Quarto die circa meridiem Ægra exſpiravit. Rectè monet Galenus comment. in lib. III. de morb. vulgarib. §. XII. carbunculum *ἑῖται τὰς ἀπὸ τοῦ*

διωῶδες ὡς αἱ ἰαὶ ἐκ τοῦ κατὰ φύσιν γινόμενου χυμῶν, esse affectum semper periculosum, utpote à vitiosis humoribus ortum. Unde elucescit, quantò major carbunculorum numerus appareat, eò gravius periculum ex fortiore intus latitante veneno imminere: quapropter iudice clarissimo *Diemerbroekio* lib. I. de peste cap. XV. §. XXXI. minimè audiendus est *Hieronymus Mercurialis*, qui in lib. de peste cap. XXIX. scribit, carbones quò plures sint & latiores, eò magis salutem promittere, cujus opinionem multi alii Medici forsan in peste majores Theoretici quàm Practici amplectuntur, propterea quòd solùm facultatis expultricis robur intueantur, sed de causæ summa magnitudine parum solliciti sint: plures autem carbunculos paucioribus esse periculosiores, etiam in peste *Noviomagensi* sæpiùs observavit *Diemerbroekius*, quod raro exemplo lib. IV. de peste histor. LXVI. comprobat. *Guilhelmo Beerns* peste cum febre & maximâ anxietate correpto post primum exhibitum alexipharmacum quatuor carbunculi, duo in femoribus, & duo in pectore eruperunt, ac sequenti nocte adhuc duo in abdomine prodierunt. Secundo die antidoto rursus exhibitò tres alii carbunculi circa scapulas visi sunt, atque subsequenti nocte adhuc duo, unus in latere dextro versùs lumbos, alter in brachio apparuerunt, ita ut ab undecim carbunculis corpus obsideretur. Febris aliaque prava symptomata magis magisque adaucta sunt. Omnia exhibita antidota non majus levamen induxerunt, quàm si saccharum candum exhibitum fuisset. Tertiâ die circa noctem vitam cum morte commutavit.





## OBSERVATIO LXIII.

*Pestis cum ingente carbunculo.*

**T**HEODORUS WOLLEBIUS, Ecclesiastes pietate, eruditione & eloquentiâ sacrâ insignis, dum in visitandis & consolandis ægrotis peste correptis munus suum strenuè perficeret, dirâ hâc lue etiam infectus fuit. Ut publico Ecclesiæ nostræ commodo & incremento iste verbi divini Præco facundissimus conservaretur, Medici duo ordinarii indefessam operam præstiterunt; mœstissima Uxor Maritum in extremo vitæ discrimine constitutum animadvertens præsentiam meam desideravit, ego lubens meritòque comparui: sed cum in maxilla dextra carbunculum latæ magnitudinis pulsumque intermittentem observavissem, extrema instare & malum cheu! immedicabile esse prædixi, etiamsi Chirurgus Thraconicus, *Christophorus Hinderegger*, qui insciis Medicis & Chirurgis ordinariis clandestinè se intrusit, nullum ex hoc carbunculo periculum subesse, per Superos & Acheronta juraverit: prædictionem meam confirmavit exitus, nam subsequenti die fidelis iste DEI Servus ærumnosam hanc vitam cum immortali cœlestis vitæ gloria commutavit. In hac peste *Basileensi* carbunculos latæ magnitudinis idèd semper funestos fuisse compertus sum, quia instar sphaceli partibus vicinis *vixque* mortificationem inducunt, ita ut etiam aliquan-

aliquando vasa majora aliasque partes profundiores aggrediantur.



## OBSERVATIO LXIV.

*Pestis cum hæmorrhagia narium  
lethalis.*

**M**Ir triginta circiter annorum, robustus & vegetus coriarius, peste correptus meam præsentiam anxie desideravit. Primo die sequentem potiunculam sudoriferam usurpavit. *R̄. mithrid. opt. ʒj. elect. diascord. Fracastor. ʒʒ. aq. acetos. ʒij. syr. citri ʒj. spec. liberant. ʒj. misce: exin blandè sudavit.* Vespero ob magnum febris incendium julepus præscriptus fuit. *R̄. aq. nymph. acetos. succis. ā ʒij. syr. citri ʒiʒ. berber. ʒj. spir. vitriol. gt. viij. F. julepus pro duabus dosibus nocturnis.* Secundo die in inguine dextro apparuit bubo, hinc prædictam potiunculam sudoriferam repetiit, & propter fauces inflammatas gargarismo & syrupis in *observat. LX.* annotatis usus fuit. Tercio die ob vires prostratas sequentem aquam cardiacam & electuarium roborans præscripsi. *R̄. aq. cardiac. officin. ʒij. bugloss. violar. ā ʒj. confect. alkerm. incomplet. ʒiʒ. misce, de quo sæpè cochlear plenum concedatur. R̄. conserv. rosar. rubr. borragin. ā ʒj. acetos. citri ʒiʒ. confect. hyacinth. incompl. ʒij. C.C. philosophic. prepar. ʒj. syr. corallor. q.s. F. electuarium, de quo ad lubitum magnitudo avellana sumatur.* Quarto die periculosa narium hæmorrhagia supervenit, in

qua spacio duorum dierum sanguis quidem paulatim sed in magna copia emanavit: ad hunc fluxum sanguinis sistendum sequentia remedia convenientissima præscripta fuerunt. *R. aq. plantagin. acetos. ʒiij. syr. corallor. ʒiij. granator. ʒij. lapid. hematit. præpar. ʒj. sanguin. dracon. ʒij. F. julepus pro duabus dosibus. R. conf. rosar. rubr. ʒij. rad. consolid. major. ʒj. lapid. hematit. præpar. trochisc. de carab. ʒj. ʒj. syr. corallor. q.s. F. electuarium, de quo sæpius magnitudo nucistæ sumatur. R. aq. cardiac. officin. ʒij. plantag. borrag. ʒij. sacch. rosat. tab. ʒij. corall. rubr. præpar. ʒj. margarit. præpar. C.C. philosoph. præpar. ʒij. ʒij. F. cardiacum, de quo sæpe cochlear plenum usurpetur. R. aq. plantag. nymph. pyrol. ʒiij. acet. rosat. ʒij. trochisc. de carabe ʒj. F. frontale cum duplicatis linteis, fronti & collo tepidè applicandum. oxycratum actu frigidum testiculis impositum fuit. Verùm omnia hæc remedia in cassum usurpavit Æger, utpote qui circa mediam noctem accedentibus leipothymiis vitam pariter cum sanguine effudit. Multi existimant, hæmorrhagias pesti supervenientes ægrotorum salutem indicare, ac proin non cohibendas, sed potius promovendas esse. Sed illos toto aberrare cœlo rectè judicat *Diemerbroeckius*, nam licet natura hoc modo se à gravante malignitate sublevare nitatur, frustra tamen per illam viam id facere allaborat, per quam venenum pestilens cordi impressum aut parum aut nihil imminuitur, imò verisimilius est, dissipatione multorum spirituum & copiosi sanguinis effluxu citius ægros viribus collapsis morituros, quàm malignitas per hæmorrhagiam excerni possit.*



## OBSERVATIO LXV.

*Pestis.*

**S**enator quinquagenario major præludia pestis in semetipso animadvertens me vocare jussit. Sub vesperam illum invisens, de vertiginoso capitis dolore, præcordiorum angustia & molesto vomitu conquestus fuit: mox sequentem potiunculam diaphoreticam usurpavit. *R̄. mithrid. opt. ʒj. elect. diascord. Fracastor. ʒß. sal. absinth. ʒß. aq. theriacal. nostr. ʒß. acetos. ʒj. syr. citri ʒß. misce:* unde ad sudorem proclivis totâ nocte cum levamine sudavit: manè sequens electuarium adversus indicata symptomata præscriptum fuit. *R̄. conserv. rosar. rubr. ʒiß. borragin. ʒß. elect. diascord. Fracastor. ʒij. mithrid. opt. ʒj. sal. absinth. ʒj. syr. papav. rhead. pœon. ʒq. s. F. electuarium, de quo ad libitum magnitudo avellane sumatur.* Tertio die melius habuit, posteaquam è fonticulo, quem in pede dextro fovit, humor nigricans magna in copia effluxisset. Fonticulos ad pestis præservationem maximè utiles esse, per quos vel spontaneo naturæ motu vel excitato convenientium remediorum stimulo venenum pestilens è corpore expellatur, Viri præclari aliquoties observarunt. Hinc *Fabricius Hildanus centur. IV. observat. chirurgic. XXIII. & LXXXVI.* fatetur, se in truculentissima peste *Lausanensi*, beneficio fonticulorum in brachio sinistro & poplite dextro, conservatum fuisse, imò neminem eorum, qui fonticulos in bra-

chiis aut cruribus habuerint, præter unum vel alterum summè cacoehymicum obiiſſe. Unde Vir excellentiſſimus *Antonius Deuſingius tractat. IV. de peſte cap. II.* etiam aſſerit, ad exſtirpandum peſtilentiæ fomitem fonticulos plurimùm conferre, per quos tanquam tubulos vitioſorum humorum colluvies ſenſim derivatur & expurgatur, ut illâ ſentinâ ſublatâ corpus peſtiferæ lui minùs obnoxium exiſtat, ac cum deſluentī virulentīæ fomite virus ipſum è corpore ſimul promanet. Idem *Julius Palmarius lib. I. de febre peſtilent. cap. XV.* *Hieronymus Mercurialis lib. de peſte cap. XXIII.* *Antonius Portus lib. II. cap. XXXVI.* *Georgius Guarnerus cap. IX.* & *Ambroſius Paræus lib. XXI. cap. XVII.* confirmant.



## OBSERVATIO LXVI.

*Amuletum peſtis periculoſum.*

**E**lebri cuidam Mercatori noſtro, Pharmacopola *Francofurtanus* in nundinis autumnalibus, amuletum famoſiſſimum contra peſtem tergeminis laudibus commendavit, quod ille *Baſileam* redux lue adhuc apud nos graſſante collo appendit, ut nudum pectus & cordis regionem attingeret. Poſt quatuor ab appenſo amuleto dies elapſos bonus iſte Vir tantam præcordiorum anguſtiam, ardorem & laſitudinem paſſus fuit, ut aliquoties in animi deliquium incideret, ſimulque acrem dolorem in loco amuleti percipere.

peret. Vocatus amuleti facculum aperui, & illud ex arsenico paratum fuisse observavi: cum autem hoc virulentum amuletum pustulas subnigras circa regionem cordis excitasset, illas oleo scorpionum *Matthioli* inungere jussi, & contra prædicta symptomata ab infausto amulero excitata potiunculam diaphoreticam & electuarium conveniens præscripsi. *℞. theriac. Andromach. ʒj. electuar. diascord. Fracastor. ʒß. aq. acetos. ʒij. misce: exin cum magno levamine sudavit. ℞. conserv. rosar. rubr. ʒj. acetos. citri, borragin. ā ʒß. theriac. Andromach. elect. diascord. Fracastor. ā ʒj. confect. hyacinth. incomplet. ʒiß. spec. liberant. ʒß. C. C. philosophic. prapar. ʒj. syr. de succo citri q. s. F. electuarium: de quo sæpius magnitudinem nucis moschatae Ager usurpavit, unde etiam pristinae sanitati restitutus fuit. Certè qui amuleta ex arsenico aliisque venenis composita ad virus pestilentiae evitandum in nudo corpore circumferunt, cives illos imitari videntur, qui ut hostem dirum ab urbe repellant, alterius non minùs sævi auxilium invocaverunt, cui dum mœniorum defensio commissa fuit, ille noctâ occasione urbis penetralia occupat, & miseros cives proprios extremæ calamitatis suæ autores trucidat, accuratum *Isbrandi Diemerbroeckij lib. IV. de peste histor. XCIX.* judicium est. Cæterùm de imaginaria ista facultate arsenici contra pestem prolixè & eruditè commentatus est Medicus seculi nostri celeberrimus, *Antonius Deusingius in tractat. de peste part. IV. sect. III. cap. III.* ubi varia incommoda & pericula ab arsenici amulero tempore pestis gestato oborta recenset, atque tandem ostendit, damnosam illam de arsenici amulero*

persua-

persuasionem ex Arabici idiomatis ignorantia originem traxisse, & inde in praxin medicā dimanasse: cum enim Medicus Arabs fortè commendavit facculum *darfeni* hoc est *cinamomi* (Arabibus enim *darfeni cinamomum* significat) vocabulo illo Arabico apud Medicos barbaros in Latina lingua servato, ut fieri passim solebat, imperitus linguæ postea pro *darfeni* substituit *de arsenico*, eundemque errorem porro aliis ineptâ commendatione instillavit: Ego amuletorum istorum periculoso loco, grassante hâc lue, trochiscos & electuarium prophylacticum consului, quibus plurimæ Familiæ cum eximio prosperæ valetudinis conservandæ emolumento usæ fuerunt. De electuario sumebat quilibet domesticus nucis moschatæ magnitudinem manè post somnum; trochisci autem ab exeuntibus in ore detinebantur & tardè deglutiebantur. Formula trochiscorum & electuarii prophylactici, quæ in majori copia in pharmacopoliis asservata fuere, sequens est. *R. spec. liberant. pulv. pannonic. rubr. ʒij. confect. alkerm. incompl. ʒß. sacrh. opt. ʒvj. mucilag. gumm. tragacanth. aq. succisæ extract. q. s. F. s. a. trochisci. R. rad. angelic. succis. tormentill. vincetox. ʒj. bol. armen. ver. ʒß. terra sigill. ʒij. pulver. pannonic. rubr. spec. liberant. ʒiiij. roob juniper. ʒiij. sambuc. theriac. Andromach. mithrid. opt. ʒij. sacchar. clarific. ʒxiiij. succi citri recent. ʒvj. F. s. a. electuarium: quod in olla conveniente asservetur.*

OBSER-



## OBSERVATIO LXVII.

*Curatio bubonum pestilentium  
Chirurgica.*

**M**ethodus medendi externa, qualem in bubonibus inguinum pestilentialibus ex jussu meo Chirurghi instituerunt, tali modo absoluta fuit. Ante omnia ad tumoris evocationem & veneni extractionem, commune vesicatorium ex drachma una & dimidia pulveris cantharidum cum fermento & aceto mixta, in parte bubonis inferiore applicare, atque post octo vel decem circiter horas excitatâ & ablatâ vesicâ, folium betæ aut brassicæ rubræ butyro aut raparum oleo inunctum imponere jussi, ut venenati humores melius effluere possint. Secundo die emolliens & suppuratorium cataplasma toti buboni à Chirurgo admotum fuit. *R. mic. pan. tritic. alb. ℥ij. farin. alth. lil. alb. ā ℥j. herb. malv. scabios. scord. ruta, flor. chamam. melilot. ā ℥j. farin. semin. lini ℥℔. fenigr. ℥ij. ficuum recent. num. vj. capar. num. iij. pulveris. & coq. in aq. font. ad formam pultis, sub finem add. ol. scorpion. unguent. resumptiv. ā ℥℔. theriac. Andromach. ℥ij. pulv. croci ℥℔. vitell. ovor. num. iij. F. s. a. cataplasma.* Quando autem bubones solo hoc cataplasmate ad completam suppurationem perducti propter cutis densitatem non rumpebantur, illos in parte decliviori Chirurgus scalpello, lansetâ dicto, aperuit, & pure emissio ad ulcus mundandum sequenti linimento usus fuit.

*R. un-*



*Rx. unguenti apostol. ʒiij. terebinth. venet. mell. rosati ā ʒij. theriac. Androm. ol. scorpion. ā ʒj. vitell. ovi num. j. F. linimentum. postea Chirurgus more consueto ulcus consolidavit. Monendum heic est, quod prædictum cataplasma in magna copia, cum facile corrumpatur, parari non debeat, unde si tam citò haberi non possit, illius loco sequens emplastrum substituat. Rx. empl. melilot. diachyl. cum gummis ā ʒj. ol. scorpion. q. s. misce. Pauperibus mandavi, cæpas magnas aliquantulum excavatas sub cineribus assare, dein axungiam suillam admiscendo illas contundere, & ad formam cataplasmatidis buboni imponere, quod remedium cum felici successu usurparunt. Si istis medicamentis bubones ad suppurationem deduci nequeant, Medicis futuris Loimiatricis aliam methodum perutilem commendo, quam Paulus Barbette, Practicus quondam Amsterodamensis experientissimus, in tractatu suo de peste sequentibus verbis proponit. Buboni statim vesicatorium applico, etiamsi tumor nondum sit magnitudinis insignis: cucurbitulas intermitto, quoniam illæ bonos æquè ac malos humores alliciunt, sanguinem alterant & dolorem ac febrem excitant: vesicæ post horas octo vel plures dissectæ emplastrum magneticum imponi jubeo, cujus sanè tanta virtus in peste existit, ut nullum nobilius mihi innotuerit: Formula talis est. Rx. antimon. crudi, sulphur. flav. arsenic. alb. ā ʒij. subtilissimè pulverisita sepeliantur in phiola in arena, subministretur ignis, donec colliquefiant, & colorem rubeum subrubrum induant: vase refrigerato exime materiam, quæ magnes arsenicalis vocatur, & venenata amplius non est, ut in canibus cuilibet experiri licet.*

*Postea*

Postea ℞. gum. serapin. ammoniac. galban. ā ʒ℔. ol. succin. ʒij. terra vitrioli dulcific. ʒj. gummata dissolvantur in aceto vini fortis, & per pannum linteum expressa bulliendū iterum inspissentur ad priorem consistentiam: deinde seorsim colliqua ceram & terebinthinam, & extra ignem agita, donec in spissitudinem redigantur: adde porro supra dicta gummata & magnetem arsenicalem cum terra vitrioli ac oleo succini, sic habebis emplastrum ad extrahenda omnis generis venena efficacissimum. Emplastrum istud hisce viribus præditum observavi: cuti impositum ne minimam quidem escharam producit, interim malignos humores tam egregiè extrahit, ut bubo juglandi similis intra quatuor aut sex dierum spatiū prorsus tollatur: verū hoc non semper tam citò succedit, & hæc causa est, quare necessitas ad humores subitò evacuandos sæpenumero vesicam prius excitari desideret, imò in corporibus robustioribus escharam non producit, nisi ope vesicatorii non solum cuticula, sed etiam cutis quædam portiuncula prius corrosa fuerit; in corporibus autem tenerioribus nullo vesicatorio præmisso escharam per se excitat. Crusta hæc veneni extracti vera sedes est, quare mediocriter crassa reperitur, cute superficialiter tantum corrosa, quod consideratione dignum est, nam inde colligitur, cur illa multò citiùs separetur quàm aliæ crustæ artificio excitatæ; horis enim viginti quatuor aut triginta sex effluxis, solius spatulæ auxilio, nullâ præcedente scarificatione, absque ullo aut saltem exiguo cum dolore auferri potest, si solum unguentum basilicum usurpetur: separationem escharæ sequens unguentum etiam egregiè promovet.

℞. mell.

℞. mell. virgin. axung. anat. ā ʒj. fuligin. camin. ʒvj. terebinth. ʒj. vitell. ovor. num. ij. theriac. ʒiij. ol. scorpion. q. s. F. unguentum. Quòd si tumor crustâ primâ ablâtâ non sufficienter sit imminutus, emplastro prædicto magnetico secundam vel tertiam excitabis. Tandem ulcus consolidandum emplastro de minio, vel albo cocto, aut diapompholygo: sed nimium ad consolidationem non festinandum, ne humor venenatus in corpore adhuc latitans novum morbum vel ipsam mortem inducat.

~~~~~

## OBSERVATIO LXIIX.

*Curatio anthracum pestilentium  
Chirurgica.*

**Q**Uamprimum anthrax in peste apparuit, jussi Chirurgum per medicamenta suppurativa dolores lenire, & tali modo carbunculum à carne vicina separare, unde statim sequens cataplasma ad formam pulticulæ Diemerbrokianæ præparatum anthraci impositum fuit. ℞. farin. rad. alth. ʒß. sem. lini, tritic. radic. symphyt. maj. ā ʒij. herb. scord. ʒj. F. pulv. coq. in aq. font. q. s. ad consistent. pult. cui adde mell. opt. terebinth. opt. unguent. apostol. ā ʒiij. basilic. major. ʒiß. theriac. Androm. ʒj. pulv. croci ʒß. vitel. ovinum. j. F. s. a. cataplasma. unico hoc remedio separationem carbunculorum factam fuisse aliquoties observavi, nam quò mitiora illis remedia adhibebantur, eò citior & melior curatio contingebat; anthrace

thrace separato ad mundandum ulcus linimentum, in præcedenti observatione notatum, Chirurgus usurpavit, & postea more consueto ulcus sanavit. Emplastra & alia topica aciora fortiter attrahentia in hac peste majus damnum quam commodum attulerunt, hinc in defectu hujus cataplasmatidis solum emplastrum basilicum majus vel oxycroceum commune pro pauperibus à me præscriptum fuit.

Plures de peste observationes adhuc in medium proferre possem, sed cum ferè eadem remediorum formulæ mihi repetendæ forent, illas in publicum proponere supervacaneum judico: notum est Græcorum proverbium:

*Ὀκισ κραμβὴν διὰ καιρῶν.*

*Occidit miseros crambe repetita magistros.*



## OBSERVATIO LXIX.

### *Melancholia hypochondriaca.*

**R**eligiosus quadragenario major, calido & sicco temperamento præditus, ab aliquo tempore melancholiam hypochondriacam passus fuit, quam apud Symmystas suos, quantum potuit, omni arte dissimulavit, sed magno cum suo damno & vitæ periculo: nam inopinatus melancholiæ hypochondriacæ paroxysmus, propter ingentem humorum ab atra bile infectorum copiam, tanto cum impetu illum tempore verno invasit, ut Symmystæ gravi terrore perculsi

K

meam

meam præsentiam anxie desiderarent. Sub vespere adveniens in miserrimo statu Ægrotum invenni: etenim horrendum in modum vociferatus est, instar desperabundi ejulavit, & se à Diabolo obsessum esse exclamavit, unde quoties flatus per gulam emitteret, ad Satanæ vocem sibilumque percipiendum adstantes convocavit. Ut humores tum intra tum extra vasa corrupti præpararentur, sequenti decocto, potus ordinarii loco, usus est: *R. cremor. tartar. ℥℔. coq. in aq. font. q. s. in colat. mensura unius solve sacchar. rosat. tabul. ℥j. spirit. nitri ℥ij. misce.* Ob transactas aliquot noctes insomnes noctu laudani mei grana duo usurpavit, & exin pertres circiter horas quievit. Mane vini emetici dosin exhibui, quæ sequens fuit. *R. croci metallor. gr. viij. vini albi veter. ℥j. bulliant parum & colentur.* Cum ex usu hujus vini *ἀνω τε καὶ κάτω* supra & infra incredibilem humorum illuviem Æger dejecisset, se debiliorem factum esse vesperi ipsemet agnovit, unde illi aliquot cochlearia aquæ cardiacæ plena concessi, refocillatumque erexi monens, talia vomitoria esse Medicorum exorcismos consuetos, quibus per guttur superius & inferius è corpore humano Diabolus expellatur, illorum etiam Hieronymum Mengum Franciscanum, in libello suo *flagellum Daemonum* dicto, mentionem facere, nisi me labilis memoria fallat: quum nomine hujus celebris exorcistæ audito, Symmystæ lecto adstantes, ora in risum solvissent, & illum subrisisse mecum animadverterunt: eâdem nocte rursus laudani opiat mei grana duo usurpavit, ac per aliquot horas dormivit. Tertio die vena in brachio sinistro aperta, & san-

& sanguis ad libram unam eductus fuit. Cùm ad vesperam symptomata mitiora animadverterem, Symmystis ægri valedixi, & domum rediens per famulum pilulas sequentes contra melancholiam hypochondriacam perutiles transmissi, quarum quindecim singulis tribus diebus cum regimine diætæ concedebantur. *R. extr. catholic. ℥j. mercur. dulc. ℥j. extr. helleb. nigr. ʒss. diagrid. ʒss. ol. major. macis ā gt. iij. misce dilig. & form. pilul. ex ℥j. num. xv. deaur. & consperg. pulv. cinam. ex diligenti harum pilularum usu error phantasie omninò evanuit, & Æger ad sanam mentem rediit. Ratione diætæ iussi cichoream copiosè jussulis carneis incoquere, nam Joannes Rhodius cent. I. observat. medic. XLIV. testatur, quòd Professor quidam Patavinus, diu plurimis medicamentis, quolibet anno sine efficacia, tantum non confectus, mutato deinceps consilio, jussulis cichoraceis in prima mensa haustis, melancholiam hypochondriacam profligaverit. Blando verborum alloquio sine severa objurgatione melancholici hujus ægri curationem institui, nam sæpius (uti rectè monet Cornelius Celsus lib. III. cap. XIIIX.) melancholicis assentiendum quàm repugnandum, paulatimque & non evidenter ab his, quæ stultè dicuntur, ad meliora mens illorum abducenda est, quod duobus raris & claris exemplis comprobatur Tulpius lib. I. observat. medic. XIIIX. & XIX. Insignis Pictor ab atra bile aliquandiu infestatus, sibi falsò imaginabatur, cuncta sui corporis ossa adeò mollia ac flexibilia esse, ut instar sequacis ceræ facillimè in se complicarentur, si vel minimùm in illis inniteretur: quâ opinione menti penitus im-*

pressâ continuuit se per integram hyemem in lecto,  
 veritus inde aliquid sinistri si surgeret, & certò cer-  
 tiùs eventuram, quam hætenus metuerat, defor-  
 mem ossium suorum, vel potiùs totius corporis,  
 conglobationem. Quo metu intellecto nolui ipsi  
 adversari, neque palàm credulam surreptum iri  
 quam conceperat imaginationem; asserens pro-  
 pterea mollitiem hanc non latere Medicos, quin  
 potius jam diu ab illis animadversam: imò sicuti  
 cera emollitur ac induratur, sic etiam plurimùm in  
 ossibus posse artem medicam, modò ægri morige-  
 ros se præbeant: ipsius ossibus intra triduum resti-  
 tutum iri pristinum stabilimentum, & ante diem  
 sextum potentiam quocunque ambulandi, dum-  
 modò dictis obediens fuerit. Quæ promissa, dici  
 vix potest, quantam excitaverint spem recuperan-  
 dæ sanitatis, & quàm morigerum reddiderint  
 ægrum in admittendis remediis atræ bili destina-  
 tis: quâ convenienter ex corpore depulsâ nos fa-  
 cilè fidem nostram exsolvimus, jubentes ipsum ex  
 cubili surgere, in quo integram hyemem decu-  
 buerat; ea cum lege ut duntaxat pedibus insisteret,  
 neque vel latum unguem procederet, secus si fa-  
 ceret, penes se culpam futuram; sexto autem die  
 me veniam ipsi daturum quocunque deambulan-  
 di, modò rite arti obtemperet. Quæ certè monita  
 eò fuere rigidiora, quò minùs expediit ipsi dolum  
 hunc resciscere, qui quò magis lateret, in medica-  
 mentis cataracticis rectè continuavimus: secundo  
 appropinquante triduo veritatem promissi coram  
 ostendimus, concessâ non tantùm veniâ per con-  
 clave ambulandi, sed etiam in publicum prodeun-  
 di, &

di, & qualiacunque sani hominis munia jugiter obeundi. Quâ libertate tantoperè gavisus fuit æger, ut ignoraverit, quibus encomiis extolleret sanitatis suæ Præsulem, admiratus hinc artis potentiam, illinc suam diffidentiam detestatus, quod tam diu fidem denegasset, à qua tam salutare consilium recepisset. Vidit hic æger robur ossibus suis restitutum, vidit rediviva crurum officia, vidit expeditum incessum, vidit alia: sed stultam hanc totius hiemis imaginationem clanculum sibi eripi nec vidit nec sensit, homo cæteroquin minimè stupidus, sed in arte sua abundè sagax & vix ulli secundus.

Quod ipsum inventum non minus feliciter cessit uxori *Salomonis Galeni*, quæ credebat in utero suo contineri molam vivam à Medico interimendam: quam operam siquidem illi denegasses, fatagens rationibus potius quàm sagaci aliquo stratagemate sententiam illam evellere, operam perdidisses, neque vel tantulum profuisses ægræ, quam præstitit clàm circumvenire, quàm palàm convincere. Itaque monita fuit, ut haberet exactam rationem excretorum, & si quæ atra conspiceret vel nigræ fuligini simillima, crederet firmiter jam tum expelli molam sibi molestissimam: quibus verbis fidem habens admisit haud gravatè modò veratrum nigrum modò confectiōē hamech & alia expellendæ hujusmodi insanix apta: quorum ope atrâ bile excretâ non dubitavit amplius de molæ suæ inter necione, certa, uti credebat, ex ejus occisæ colliquatione sequi nigram illam dejectionem, in quam




prædixeram dissolutum iri vivum illud monstrum, quod utero suo inclusum sibi imaginabatur.



## OBSERVATIO LXX.

*Melancholia hypochondriaca  
lethalis.*

 Lium Religiosum ejusdem Ordinis & Conventus paulò ante obitum cognovi, qui ante triginta quinque annos, ut à Symmystis ejus aliquoties mihi relatum est, in Patria urbe Helvetiorum celeberrima philosophiam magno cum applausu, & exsurgentem illo tempore doctrinam *Jansenicam* professus erat: hic propter continuos studiorum labores & frequentes vigiliis (quippe ad arcendum somnum remedia suis ignota clam usurpavit) in melancholiam hypochondriacam cum motibus convulsivis incidit. Pater in summa dignitate constitutus, Medicos experientissimos convocando, nullis sumptibus pepercit, ut Filium Familiæ decus & futurum Ordinis sui incrementum à funesto hoc malo liberaret. Sed omnia incassum; nam cunctis medicamentis frustra usurpatis desperata hæc melancholia cum ætate accrevit, hinc æger perpetuò sibi imaginatus est, se ad Episcopatum *Lausannensem* legitime vocatum esse, unde ingenti gaudio afficiebatur, quando Symmystæ illum tanquam Episcopum *Lausannensem* salutarent, agnoscerent & venerarentur, tandem

tandem imaginarius iste Episcopus per multos annos paralyti lateris dextri laborans, accedente apoplexiâ fortissimâ supremum vitæ diem obivit. Sic primarius *Ambsterodamsium* Poëta nates sibi vitreas esse credidit, quarum rupturam, si consideret, usque ad obitum metuisse, in propatulo est. Dubio procul etiam *Danius* ille, qui nasum sibi in eam magnitudinem excrevisse imaginabatur, ut publico abstineret, ne nasus à transeuntibus conculcetur, simile fatum expertus fuit. Adhuc alia melancholicorum exempla nota sunt, qui errores imaginatrici impressos obstinatè usq; ad ultimum vitæ halitum defenderunt.

## OBSERVATIO LXXI.

*Morbus virgineus.*

**N**obilissima Virgo annum ætatis decimum ingressa sensim macilenta & pallida evasit. Solliciti de sanitate Filiæ & febrem in illa metuentes hecticam Parentes me vocarunt. Habito exâmine conquesta fuit de appetitu ciborum imminuto, cordis palpitatione, difficili respiratione & spontaneâ totius corporis lassitudine: porrò retulit se cibo assumpto comprimenter stomachi dolorem sentire, & molestam abdominis inflationem observare. Ad humores circa regionem stomachi, pancreatis & mesenterii stagnantes, illarumque partium vasa obstruentes successivè digerendos sequens pulvis & pilulæ præscriptæ sunt.

℞. cremor. tartar. ʒß. tartar. vitriolat. ex sale tartar. cristallis. fact. ʒij. facul. bryon. ʒj. F. pulv. dividendus in octo partes æquales, quarum una in brodio manè sumatur. ℞. extr. pilul. marocostin. Minder. ʒij. ammoniac. Quercetan. ʒj. ol. macis gt. iij. misc. dilig. forment pil. ex ʒj. num. xvij. deaur. consperg. pulv. cinamomi: novem horâ ante cœnam usurpentur. Finito hujus pulveris & pilularum usu ad blandam humorum præparatorum evacuationem sequens sacculus purgans præscriptus fuit. ℞. rad. bryon. polypod. cort. tamaric. ā ʒiß. herb. betonic. marrub. alb. agrimon. ceterach. artemis. summit. centaur. min. absinth. ā Pj. folior. fenn. elect. ʒiß. agaric. rec. troch. ʒß. sem. anisi ʒiß. cinamom. ʒj. incisa dentur ad sacculum ex sindone albo, cui mensura vini albi veteris affundatur, de cujus colatura ʒvj. manè alternis diebus cum regimine diætæ sumantur. Hinc melius se habuit: unde ad viscera roboranda sequens tragea & rotulæ præscriptæ fuerunt. ℞. spec. aromat. caryophyll. ʒij. latific. Galeni ʒj. diamargar. calid. ʒß. ol. caryophyll. cinnam. ā gt. iij. sacch. opt. ʒvj. F. s. a. tragea manè & vespere more consueto usurpanda. ℞. spec. aromat. caryophyll. ʒiß. diagalang. ʒß. facul. bryon. ʒij. confect. alkerin. incompl. ʒij. ol. macis, cinnam. ā gt. iij. sacch. opt. aq. meliss. solut. ʒiiij. F. s. a. rotulæ pro beneplacito usurpandæ. Ex usu horum remedium omnia symptomata remisierunt, & nobilissima ista Virgo omnimodè convaluit.



## OBSERVATIO LXII.

*Dolor colicus pro nephritico  
habitus.*

**S**Enatoris Uxor noctu acutissimos abdominis dolores passa fuit. Maritus amicus meus singularis summo mane me accessit, & officiosè rogavit, ut uxorem è dolore nephritico periculosè decumbentem inviserem: comparui, mox conqueritur ægra de doloribus ventris infimi atrocissimis, quos vomitus biliosus ac pituitosus comitetur, se vereri, ne magnus sublateat calculus, qui exitum invenire non possit. Cùm autem ex ægroræ relatu intellexissem, dolorem fixum non esse, sed per totum abdomen vagari, indicavi me valdè dubitare, an renum calculus illam discruciet, commodius hosce dolores ad colicam quàm ad nephritidem referri: unde statim ægræ sequentem clysterem præscripsi. *Rj. rad. alth. ℥i℥. herb. veronic. betonic. meliss. matv. ā Mj. flor. sambuc. Pj. sem. lini ℥℥. anisi ℥ij. coq. in colat. ℥x. solv. mell. rorismar. ℥ij. elect. lenitiv. ℥i℥. ol. anethin. ℥j. F. clyster.* Ad flatum discutiendos abdomen sequenti linimento calidè inunctum fuit. *Rj. ol. menth. chamem. nardin. ā ℥ij. still. absinth. ℥j. unguent. resumptiv. q. s. F. linimentum.* Ante prandium redeunti retulit ægra, clysterem & flatum & humores biliosos cum aliquali pituita mixtos eduxisse, unde doloris mitigationem perciperet, quapropter autor fui, ut horâ tertiâ pomeri-

*R̃j. cremor. tartar. ʒß. tartar. vitriolat. ex sale tartar. cristallus. fact. ʒij. facul. bryon. ʒj. F. pulv. dividendus in octo partes aequales, quarum una in brodio manè sumatur. R̃j. extr. pilul. marocostin. Minder. ʒij. ammoniac. Quercetan. ʒj. ol. macis gt. iij. misc. dilig. forment pil. ex ʒj. num. xvij. deaur. consperg. pulv. cinamomi; novem horâ ante cœnam usurpentur. Finito hujus pulveris & pilularum usu ad blandam humorum præparatorum evacuationem sequens sacculus purgans præscriptus fuit. R̃j. rad. bryon. polypod. cort. tamaric. ā ʒiß. herb. betonic. marrub. alb. agrimon. ceterach. artemis. summit. centaur. min. absinth. ā Pj. folior. fenn. elect. ʒiß. agaric. rec. troch. ʒß. sem. anisi ʒiß. cinamom. ʒj. incisa dentur ad sacculum ex sindone albo, cui mensura vini albi veteris affundatur, de cujus colatura ʒvj. manè alternis diebus cum regimine dietæ sumantur. Hinc melius se habuit: unde ad viscera roboranda sequens tragea & rotulæ præscriptæ fuerunt. R̃j. spec. aromat. caryophyll. ʒij. latific. Galeni ʒj. diamargar. calid. ʒß. ol. caryophyll. cinnam. ā gt. iij. sacch. opt. ʒvj. F. s. a. tragea manè & vesperi more consueto usurpanda. R̃j. spec. aromat. caryophyll. ʒiß. diagalang. ʒß. facul. bryon. ʒij. confect. alkerm. incompl. ʒij. ol. macis, cinnam. ā gt. iij. sacch. opt. aq. meliss. solut. ʒiiij. F. s. a. rotulæ pro beneplacito usurpandæ. Ex usu horum remedium omnia symptomata remiserunt, & nobilissima ista Virgo omnimodè convaluit.*

OBSER-



OBSERVATIO LXXII.  
*Dolor colicus pro nephritico  
 habitus.*

**S**Enatoris Uxor noctu acutissimos abdomi-  
 nis dolores passa fuit, Maritus amicus meus  
 singularis summo manè me accessit, & of-  
 ficiosè rogavit, ut uxorem è dolore nephritico pe-  
 riculosè decumbentem inviserem: comparui, mox  
 conqueritur ægra de doloribus ventris infimi atro-  
 cissimis, quos vomitus biliosus ac pituitosus co-  
 mitetur, se vereri, ne magnus sublateat calculus,  
 qui exitum invenire non possit. Cùm autem ex  
 ægrotæ relatu intellexissem, dolorem fixum non  
 esse, sed per totum abdomen vagari, indicavi me  
 valdè dubitare, an renum calculus illam discru-  
 ciet, commodius hosce dolores ad colicam quàm  
 ad nephritidem referri: unde statim ægræ sequen-  
 tem clysterem præscripsi. *R. rad. alth. ℥i℥. herb. ve-*  
*ronic. betonic. meliss. malv. ā Mj. flor. sambuc. Pj. sem. lini*  
*℥℥. anisi ℥ij. coq. in colat. ℥x. solv. mell. rorismar. ℥ij. elect.*  
*lenitiv. ℥i℥. ol. anethin. ℥j. F. clyster.* Ad flatum discu-  
 tiendos abdomen sequenti linimento calidè inun-  
 ctum fuit. *R. ol. menth. chamem. nardin. ā ℥ij. still. ab-*  
*sinth. ℥j. unguent. resumptiv. q. s. F. linimentum.* Ante  
 prandium redeunti retulit ægra, clysterem & fla-  
 tus & humores biliosos cum aliquali pituita mix-  
 tos eduxisse, unde doloris mitigationem percipe-  
 ret, quapropter autor fui, ut horâ tertiâ pomeri-

dianâ alium clysterem usurpet, qui vitiosos istos humores majori virtute educet. *R.* rad. bryon.  $\mathfrak{z}$ j. acor.  $\mathfrak{z}$ ß. herb. meliss. menth. veronic.  $\tilde{a}$  Mj. flor. chamam. Pj. semin. carui,  $\mathfrak{z}$ ij. coq. in colat.  $\mathfrak{z}$ x. solve elect. diacathol.  $\mathfrak{z}$ j. hier. picr. Logad.  $\mathfrak{z}$ ß. ol. ruta  $\mathfrak{z}$ j. menth.  $\mathfrak{z}$ ß. F. clyster. cujus felicem operationem mihi ad vesperam satis deprædicare non potuit ægra, nam bilem & pituitam viscidam ac glutinosam incredibili copiâ eduxit; unde omnis dolor evanuit: ad reliquias humorum educendas jussi potiunculam purgantem die subsequenti usurpare. *R.* rhabarbar. opt.  $\mathfrak{z}$ ij. agaric. trochisc.  $\mathfrak{z}$ ß. cremor. tartar.  $\mathfrak{z}$ j. sem. anisi  $\mathfrak{z}$ ß. aq. meliss. veronic.  $\tilde{a}$  q. s. infund. per noct. manè bulliant parum in colat.  $\mathfrak{z}$ ij. solv. syr. flor. persicor.  $\mathfrak{z}$ j. aq. cinnam.  $\mathfrak{z}$ j. F. potiuncula manè cum regimine diætæ usurpanda.

Testatur experientia fida artis medicæ Magistra, quod propter signorum doloris colici & nephritici affinitatem non saltem plurimi ægri, sed etiam exercitati Medici aliquoties decipiantur; imò eundem errorem in semetipso commisit Medicorum Princeps Galenus, uti lib. II. de loc. affect. cap. V. liberè confitetur. *οἶδα ἐμαυτῷ συμβᾶσαι ὀδυῖν σφοδρότατον ὡς πρὸς πάντα δοκεῖν ἀγλῆτεράς καὶ τὸ βάθος τῆς κοιλίας ἐν ἐκείνῃ μάλιστα τῷ χορῷ, καθ' ὃ τὰς ἀπὸ τῶν νεφρῶν ἐπὶ τῷ κύστιν κρητῆρας ἐκίεσθαι ἴσμεν· αὐτ' ἐπιβήντι πηγαίᾳ ἑλαίᾳ μικρὸν ὑπερὸν ἀπικελίαν πεσθυσθεύσας αὐτὸ σπιεῖν· μετὰ σφοδρότατης ὀδύνης τὸν ὑαλῶδη πεσθαγορδύορρον ἐπὶ πρᾶξαγορῇ χυμὸν, ὃς ὑάλῳ κεχυρῶν πεσθίσκειν τῷ χορῷ καὶ τῷ συστάσιν· ἐπεκταῖν δὲ αὐτὸ ταῦτο καὶ ἄλλοις συμβᾶν.* Memini mihi ipsi accidisse dolorem vehementissimum, ut videre mihi viderer, in intimo ventre terebro perforari, in eo potissimum spacio, per quod à renibus ad vesicam ureteres

scimus

*scimus extendi: injecto deinde rutaceo oleo, cum id paulò pòst excernere tentarem, excrevi simul gravissimo cum dolore humorem vitreum à Praxagora appellatum, quippe vitro fuso tum colore tum substantiâ haud absimilis erat, atque id aliis quoque accidere conspexi.* P.P. ἰγὼ μὲν εἰς ὠήθην, λίθον ἐφηνύσθην καὶ τὸν ἐτερον τῶν ὕδατων· ἔτω μοι τὸ τῆς οἰκτρῆς αἰσθάνου τῷ τριτοῦ παρὰ πλῆσιν ἐφαίνετο. σπῆλον δὲ ἐν ὅλῳ μετὰ τῷ ἐκκρίσει τῷ χυμῷ παυσανδρῆς τῆς οἰκτρῆς, ὡς ἔτι λίθον ἢ αἰτίαν· εἴθ' ὁ πάγων τόπος ὕδατος ἢ νεφρὸς. ἀλλὰ τί τῶν ἐπὶ τῶν καὶ μάλλον ἴσως τῶν παχίων. *equidem putabam lapidem in altero uretere impactum, adeo erat, ut mihi videbatur, doloris ipsius species perforanti similis, atque vacuato humore doloreq, sedato manifestè constabat neque lapidem fuisse causam, neque in ureteribus aut renibus locum fuisse affectum, sed in intestinis potius, præcipuè verò crassioribus.*

Inde arduam & multis difficultatum scopulis obviam doloris colici à nephritico dolore distinctionem esse asserit *Guernerus Rolsincius lib. III. epitom. cap. XIII.* quam tamen sequentibus signis dolores istos luculenter distinguentibus absolvi, aliquoties in praxi mea medica observavi. Primum est: in nephritide dolor gravis circa lumborum regionem advertitur, si nempe calculus infixus est renibus, hi enim obtuso sensu donati gravantem dolorem percipiunt, quoties autem calculus in caput ureteris se insinuat, dolorem descendente acutum & pungentem quidem sed simul fixum excitat, qui tamdiu perseverat, quamdiu calculus ibi hæret. In colica dolor semper observatur vagabundus, qui propter varium intestini coli situm nunc ascendit nunc descendit, flatuum murmura per totum abdomen vagantur, & aliquando dextram, aliquando sinistram, abdominis regionem



occupant, quamvis ὅλη τοῦ θυλάκου concedam Viro cuidam clarissimo, quod in sinistro latere frequentius ob loci angustiam gravissimi dolores colici oriantur. Secundum est: in dolore nephritico urina ab initio clara & tenuis apparet, ac dein arenulæ vel lapilli excernuntur, καὶ μετὰ ταῦθ' ὕστερον ἐπισκεπτομένη σοι τὰ ὕδα ψαμμώδεις ὑποστάσεις ἀρεθίσουσαι, & postea urinas si inspexeris, sabulosa subsidere invenies, uti Galenus dicto loco rectè affirmat. Econtra in dolore colico urinæ rubræ, bile nimiâ tinctæ & crassæ apparent. Tertium est: in nephritico dolore vomitus cibum & potum assumptum mox comitatur, quæ renum cum ventriculo sympathia juxta *Riolanum* in animadv. ad *Laurent. anatom. p. m. 661.* dependet à plexu nervorum *Fallopiano* renibus interjecto, unde illis affectis propter viæ brevitatē plexus iste statim ventriculo suam affectionem communicat. In dolore colico cibus & potus assumptus non tam citò per vomitum rejiciuntur, sed sæpiùs per aliquot horas in corpore manent, quibus demùm reiectis aliqua portio bilis & pituitæ simul expellitur. Quartum est: in dolore nephritico ægri ab usu clysterum, licet aliquoties excrementa cum flatibus deponant, ferè nullum levamen sentiunt, donec lapillus in vesicæ cavitatem protrusus, & postea foras expulsus fuerit. Econtra in colico dolore ægri eximiè sublevantur, quando clysteres injecti excrementa adstrictioris ut plurimum alvi biliosa & glutinosa cum innumeris flatibus educunt. Quintum & ultimum est: in dolore nephritico oritur retractio testiculi καὶ ἔξω ἐ directo, quoniam ureteres inclusi duplicaturâ peritonæi me-

dico

dio cursu vasa spermatica contingunt, & quò propius ad vesicam accedunt, deferentia seminis vasa comitantur, unde scrotum dimidia ex parte laxum & vacuum apparet. In colico dolore nulla sit testiculi retractio, imò si dolor maximus urgebat, scrotum à copia flatuum deorsum propulsa adeò extensum observavi, ut ad rupturam imminentem avertendam omni studio mihi allaborandum fuerit.



## OBSERVATIO LXXIII.

*Hypercatharsis ex prapostero hellebori nigri usu.*

**P**armacopola quidam Viro triginta circiter annorum tempore vernali sacculum purgantem vino albo immergendum concessit, de quo cùm iste duas doses bibisset, subitanèam hypercatharsin & atrocissima intestinorum tormina cum dysenteriae & convulsionis metu passus fuit: ex quibus symptomatibus & titubanti Pharmacopolæ loquela ac frigida excusatione abundè collegi, in majore dosi helleborum nigrum sacculo admixtum fuisse: unde sequentia remedia præscripsi. *R. Lact. vaccini ℥viij. ol. nymph. ℥j. vitell. ovor. num. ij. F. clyster: ex quo cùm magnum levamen ratione torminum Ager perciperet, ille ter repetitus fuit. R. aq. epileptic. nostr. ℥ij. cardiac. officin. ℥j. cinnam. ℥ij. syr. pæon. ℥i℞. ju-*

*℞. julep. rosat. ℞. misce, de quo sapius cochlear plenum  
 usurpetur. ℞. conserv. rosar. rubr. ℞. cydonior. condit. ℞. j.  
 cortic. citri condit. ℞. theriac. Andromach. ℞. mithrid.  
 opt. ℞. syr. de rosis sicc. q. s. F. electuarium, de quo ad lubi-  
 tum magnitudo nucistæ sumatur. Pro potu ordinario  
 emulsionem amygdalinam bibit, & noctu gra-  
 num laudani opiat & extracti castorei in duas pi-  
 lulas redactum sumpsit. Sequenti die ægrum ma-  
 nè invisi, qui melius se habuit, nam prædicta sym-  
 ptomata ferè omnia cessarunt, hinc jussi, ut ad ro-  
 bur viscerum & præsertim intestinorum cum usu  
 electuarii pergeret, & ita Ægroto valedixi. Qua-  
 lem malorum lernam iste Pharmacopœus cum suo  
 sacculo helleborato, ita alii seplasiarii cum extracto  
 catholico, rotulis antimonialibus & electuario de  
 succo rosarum, in corporibus humanis iliadem ma-  
 lorum excitarunt: adeò istis unguentariis (verba  
 sunt *Thom. Barthol. centur. II. epist. medic. I.*) ubique gen-  
 tium prurit cutis, ut intra officiū se nequeant con-  
 tinere, plerumque enim vani ostentatores ad exer-  
 cendam medicinam furtim se ingerunt, quumque  
 apud ægros inferius tantum guttur eluere debe-  
 rent, superius inquinare audent, & relicto ministe-  
 rio servili, cui dicati sunt, Dominorum suorum seu  
 Medicorum famæ & fortunæ insidias struunt, uti  
 hoc idem *Bartholinus* in declaratione fraudum & er-  
 rorum à talibus Pharmacopœis commissorum,  
 olim Gallicè à *Liffeto Benancio* edita, & à se  
 Latinitate donatâ eleganter  
 demonstrat.*



## OBSERVATIO LXXIV.

*Angina.*

**M**ercator juvenis annorum circiter viginti quatuor inopinatum dolorem faucium & deglutiendi difficultatem passus est. Manè vocatus ad illum in partibus exterioribus nullum tumorem observavi, sed partes faucium internas inflammatas esse conspexi: alimenta esculenta nullo modo, potulenta autem vix ac ne vix deglutire potuit, calorque febrilis universum corpus & imprimis faciem occupavit. Ob alvum à duobus diebus adstrictam clyster conveniens injectus fuit. *Rx. rad. alth. ℥i℥. herb. 4. emollient. ā Mj. sem. anisi ℥ij. coq. in aq. font. q. s. in colat. ℥viij. solve elect. diacatholic. ℥i℥. mell. violar. ℥ij. F. clyster. post ejectum clysterem venæsectio in brachio dextro instituta, & ad affluxum humorum blandè avertendum gargarismo usus fuit. Rx. aq. plantagin. ℥iiij. brunell. ℥ij. syr. granator. papaver. rhead. ā ℥j. F. gargarismus tepidè usurpandus. Pro potu ordinario sequens decoctum præscripsi. Rx. rad. acetos. ℥ij. liquir. ras. ℥j. jujubar. recent. par. iiij. sem. anisi ℥j. coq. in aq. font. q. s. in colat. mensura unius solve syrup. violar. purpur. ℥iiij. papav. rhead. ℥ij. spir. sulphur. ℥ij. misce. Secundo die, cum inflammatio faucium nondum cessaret, jussi manè venas raninas sub lingua aperire, & vesperi cucurbitulas cum scarificatione scapulis admove. Tertio die, quum materiæ collectæ copia nullam resolutionem*

nem admitteret, ad remedia suppurativa descendi, & sequens emplastrum ac gargarismum præscripsi. *Rx. empl. diachyl. simplic. melilot. ʒ℥. ol. chamem. q. s. F. emplastrum. Rx. rad. liquir. ras. ʒiij. herb. malv. scabios. farfar. ʒ℥. M℞. jujubar. recent. par. vj. ficuum recent. num. iij. coq. in aq. font. q. s. in colat. ʒviiij. sol. mell. rosat. syr. jujubin. ʒ℥. F. gargarismus tepidè usurpandus.* Ex usu horum remediorum quinto die abscessus spontè ruptus fuit, pus copiosum effluxit, ulcusque sequenti gargarismo mundatum & consolidatum fuit. *Rx. aq. brunell. ʒiiij. plantagin. ʒij. mell. rosat. ʒ℥. syr. papav. rhead. ʒ℥. F. gargarismus tepidè usurpandus.* Hinc Æger omnimodè convaluit.

In desperata angina juniores Medicos securè ad venæ jugularis externæ apertionem descendere, in exercit. de apoplex. §. XI. ostendi, imò laryngotomiam tutò institui posse, *Riolanus lib. III. anthropogr. cap. XIV.* ante nonneminem sequentibus verbis declaravit. Canalis asperæ arteriæ ex annulis cartilagineis figurâ sigmoideis dimidiatum circulum referentibus exstructus est: sunt autem cartilaginee ab invicem distinctæ, sed interventu membranulæ inter se revinctæ, inde fit, ut in angina suffocante frustra tentatis & administratis omnibus remediis laryngotomia vel bronchotomia securè fieri possit infra laryngem: discissa cutè spatium membranosum duabus cartilaginibus interjectum aperiatur, & exiguâ fistulâ introductâ tamdiu relinquetur ad respirandum, donec tumore fauces constringente resoluta vel suppurato respirandi per os libertas restituatur.

## OBSERVATIO LXXV.

*Uvula relaxatio.*

**R**everendus & Eruditissimus Dn. Jo. Georg. Irmleus, quondam Canonicus & Parochus Rheinfeldenfis, singulari amicitiae nexu mihi conjunctus, sæpè relaxationi uvulæ sine ulla inflammatione obnoxius fuit, quam sequenti pulvere feliciter sustulit. *Rj. cort. granator. ʒj. radic. iros. florent. tormentill. bistort. flor. rosar. rubr. balaustior. alumin. usti. ʒʒ. F. pulvis subtilissimus.* Chirurgus linguam spatulâ oris sic dictâ comprimit, & portunculam hujus pulveris per calamus scriptorium insufflando uvulæ adspergit. Nonnulli pulverem piperis longi admovent, quod remedium periculo non vacat, siquidem metuendum est, ne humores affatim à cerebro ad partem affectam attracti grave aliquod damnum afferant.

## OBSERVATIO LXXVI.

*Uvula casus.*

**M**ercatoris famulus quindecim annorum, manè casum uvulæ cum sermonis interceptione passus fuit: vocatus ad illum animadverti, quòd vix vocem proferre, nec cibum vel potum deglutire possit: mox sequentem garga-

L rismum

risimum præscripti. R. rad. tormentill. bistort. ireos flo-  
rent. ā ʒij. cort. granator. ʒiʒ. herb. malv. arbor. brunell.  
ā Mʒ. flor. rosar. rubr. granator. ā Pj. sem. cydonior. ʒj. coq.  
in aq. font. q. s. in colat. ʒviij. solv. mell. rosat. ʒij. alumin.  
ustli ʒj. F. gargarismus tepidè usurpandus. unico hoc re-  
medio æger sanitati restitutus fuit.



## OBSERVATIO LXXVII.

*Raucedo diuturna.*

**M**ercator quadraginta annorum per aliquot  
annos molestâ raucedine laboravit: plu-  
rimorum Medicorum auxilio usus, tan-  
dem etiam meum consilium desideravit. Cùm  
à serosis falsisque humoribus ad fauces & pulmo-  
nem defluentibus contumax hæc raucedo origi-  
nem traxisset, illi elixir purgans hydragogum  
præscripti. R. magist. radic. jalap. ʒʒ. elix. vite Mat-  
thiol. ʒj. solvatur: unde aliquoties æger blandè pur-  
gatus fuit. Secundo die gargarismus convenien-  
tem usurpavit. R. radic. liquir. ras. ʒiij. alth. ʒij. herb.  
malv. scabios. farfar. ā Mʒ. flor. papav. rhead. Pj. sem. anisi  
ʒj. jubar. recent. par. v. coq. in aq. decoct. hordei q. s. in co-  
lat. ʒviij. solve syr. papav. rhead. mell. rosat. ā ʒj. F. garga-  
rismus tepidè usurpandus: unde faucium asperitas non  
parùm mutata fuit. Tertio die elixir purgans cum  
fructu repetiit. Quinto die sequentia remedia præ-  
scripti, quorum usum per integram septimanam  
continuavit. R. syr. papav. rhead. alth. Fern. jujubin.  
farfar.

*farfar. ʒj. aq. scabios. ʒss. misce, de quo ager sapius cochlear plenum sumat. R. succ. liquir. recent. ʒij. spec. diatrag. frigid. diatrios simplic. ʒij. gumm. arabic. el. faccul. rad. aronis ʒj. oliban. elect. lact. sulphur. ʒss. mucilag. gummi tragacanth. aq. rosar. extr. & sacch. opt. ʒq. s. F. s. a. trochisci sapius inprimis autem noctu usurpandi. R. conserv. rosar. rubr. ʒiʒ. violar. radic. enula cond. ʒss. spec. diatrios simplic. diatragacanth. frigid. ʒj. syr. farfar. jujub. ʒq. s. F. electuarium, de quo ad libitum magnitudo nucis moschata sumatur. Pro potu ordinario sequens decoctum bibit, quod per aliquot menses continuavit. R. radic. china recent. ʒss. sarsaparill. ʒiij. lign. sassafr. ʒij. incisa coq. in aq. font. q. s. ad mensuras duas. ex usu horum remediorum diligenti molestissima ista raucedo mitigata, & vox clarior reddita fuit. Antequam ipsi valedicerem, jussi ad humores serofos blandè educendos singulis mensibus pilulas convenientes usurpare. R. extr. pilul. aurear. ʒj. cochiar. ʒss. magist. rad. jalap. ʒj. diagrid. sive pulver. sirij ʒss. ol. anisi gt. iij. misce diligenter, forment. pilul. ex ʒj. num. xvij. deaur. ad. pulv. cinamomi: dosis sunt pilulæ novem singulis mensibus usurpandæ.*





## OBSERVATIO LXXIIX.

*Icterus flavus cum scirrho hepatis,  
asthmate & ascite tympanitico.*

**R**everendissima & Nobilissima Domina MARIA APOLLONIA DE OFFENBURG, Abbatissa Otmarshemienfis, quinquagenariâ major, diversorum affectuum insultibus conflictata, meam præsentiam desideravit, hinc die XVI. Octobris Anno CIO DC LXI. vocatus illam in visi. Ante omnia se oculis subjecit morbus regius, nam color flavus in universo corpore conspiciebatur, quem pruritus partium externarum, amaror linguæ, appetitus prostratus, urina crocea, febris lenta, alvus adstricta, ac interdum vomitus biliosus comitatus fuit. Hisce accessit durities sub hypochondrio dextro circa jecinoris regionem, unde scirrhum hepatis sub latere collegi. Porro aderat molestum asthma, quod mihi videbatur ortum traxisse tum à pituitosis humoribus bronchia pulmonum obstruentibus, tum à scirrho hepatis, qui naturalem diaphragmatis motum impedivit. Tandem abdomen à flatibus nimis serosisque humoribus extensum, cum insigni femorum & pedum tumore ascitem tympaniticum, ob oculos posuit. Præsentibus nobilissimis Sororibus indicavi, ægram Dominam Abbatissam in summo vitæ periculo

culo versari, cum non unus sed plures urgeant affectus, qui spem vetant inchoare longam. Responderunt illæ, valetudinem dilectissimæ sororis arti & diligentia meæ commendatam, & ancipitis morbi exitum Divinæ providentiæ commissum esse. Unde sequentia remedia præscripsi. R. rad. apii, rubia tinctor. enula, ā 3i℥. herb. chelidon. cichor. agrimon. marrubii alb. summit. centaur. minor. absinth. ā Pj. folior. fenn. elect. 3ij. rhabarb. opt. 3℥. radic. mechoac. opt. 3iiij. cremor. tartar. 3℥. sem. anisi 3ij. ras. eboris 3i℥. spec. diatrionfantal. 3℥. cinamom. 3j. incisa dentur ad sacculum ex sindone albo, cui vini alb. ℥iij. & aq. chelidon. ac fragar. ā 3viij. affundantur, de quibus manè alternis diebus 3vj. cum regimine diætæ usurpentur. Pro potu ordinario sequens decoctum bibit. R. rad. acetos. 3℥. fragar. 3ij. liquir. ras. 3j. jujubar. recent. par. iiij. C. C. usti 3℥. incisa coq. in aq. fontan. q. s. in colat. mensur. duarum solve sacch. rosat. tabul. 3℥. nitri præpar. 3ij. misce. R. spec. diatrios simplic. 3i℥. diarrhod. abbat. 3j. rasur. ebor. ocul. cancr. præpar. ā 3i℥. confect. alkerm. incompl. 3j. ol. anisi gt. vj. sacchar. opt. aq. scabios. meliss. & cinnam. sol. 3iiij. F. s. a. rotula pro beneplacito usurpanda. R. gummi ammoniac. in aceto scyllit. sol. unguenti resumptiv. ā 3℥. santal. rosat. ā 3ij. ol. cappar. q. s. F. linimentum, quo dextrum hypochondrium manè & vespere calidè inungatur. Cum ex horum remediorum usu levamen sensisset Ægra, die XXV. ejusdem mensis me rursus vocavit, hinc prædictorum symptomatum aliqualem mitigationem observans sequentia remedia consului. R. syr. rosati composui ex sena, rhabarbaro & agarico 3j. elect. de succo rosar. 3iiij. aq. chelidonia q. s. F. potiuncula manè cum regimine diætæ sumenda. [Formula hujus syrupi sequens

est. R̄. folior. fenn. elect. ʒvj. rhabarbar. opt. ʒij. agaric. recent. trochisc. ʒj. cinam. opt. ʒß. zingib. ʒij. infus. rosar. & sacchar. ā ʒxxxij. F. s. a. syrupus: qui longo usu in officinis Basileensibus pharmaceuticis approbatus, humores quoscunque noxios, sine ulla naturæ violentia educit: dosis summa sunt uncia tres.]

R̄. conserv. rosar. rubrar. flor. betonic. ā ʒj. cort. citri condit. ʒß. roob ribium ʒiij. croci ♂. aperitiv. ʒij. spec. diatrion-santal. ʒß. ol. anisi gt. iiij. macis, cinamom. ā gt. ij. syr. farfar. alth. Fernel. ā. q. f. F. electuarius, de quo ad lubitum magnitudo nucistæ sumatur. R̄. aq. chelidon. cichor. scabios. ā ʒiij. syr. berber. papav. rhead. granator. ā ʒj. spir. salis gt. x. F. julepus pro quatuor dosibus ad beneplacitum sumendis. Ultimo die Octobris per literas indicavit, quod majorem respirationis difficultatem & abdominis tensionem, cum aliquali suppressione urinæ & alvi perciperet, hinc sequentiâ remedia transmissi. R̄. amygdalar. dulc. recent. excortic. ʒß. sem. cucum. melon. recent. excortic. ā ʒij. aq. heder. terrestr. chelidon. fragar. ā ʒij. F. emulsio, ad. sacch. rosat. tabul. ʒß. ocul. cancri prepar. ʒj. misce, sumatur in duabus dosibus. R̄. gutt. gamandr. ʒß. ol. anisi gt. iij. F. pilule vij. deaur. usurpentur manè cum regimine diætæ. R̄. syr. alth. Fern. ʒij. jujub. farfar. ā ʒj. oxymel. scyllit. ʒß. aq. cardiac. offic. ʒß. misce, de quo cochlear plenum pro lubitu sumatur. R̄. folior. fenn. elect. ʒj. cremor. tartari ʒß. sem. anisi ʒij. aq. fragar. betonic. ā q. f. infund. per noct. manè bulliant par. cum colatura sufficiente coq. passular. minor. elect. ʒiijß. sub finem add. sacch. opt. ʒj. ol. anisi ʒj. misce ad ollam, sumatur cochlear plenum contra alvi adstrictionem, horâ ante cœnam. Die Novembris decimo per epistolam monuit, durante cum ictero abdomen quotidie magis in-

gis intumescere, & in hypochondrio dextro gravantem dolorem urgere, qui ex decubitu in latus sinistrum magis magisque exacerbetur, unde sequentia remedia præscripsi. *Rx. extr. pilul. de ammoniac. Quercet. ʒij. magist. radic. jalap. gutt. gamandr. ʒj. ol. anisi gt. vj. F. massa, ex cuius ʒj. formientur pilula xvij. deaur. & consperg. pulv. cinamomi: novem singulis mensibus ter manè cum regimine diata sumantur. Rx. rad. ononid. ʒj. enula, cort. sambuc. ʒ ʒss. ebuli ʒij. herb. chelidon. heder. terrest. chamadr. scabios. agrimon. summit. centaur. minor. absinth. ʒ Pj. cremor. tartar. ʒiss. baccar. juniper. ʒij. incisa & contusa dentur ad sacculum ex sindone albo, cui mensuræ tres vini albi affundantur, de quibus ʒiiij. duabus circiter horis ante prandium & cœnam sumantur. Rx. radic. alth. lil. albor. ʒ ʒj. bryon. ʒss. herb. 4. emollient. ʒ Mj. flor. chamem. melil. ʒ Pj. semin. lini ʒvj. fœnigr. ʒiiij. aneth. ʒij. incisa coq. in vini alb. & aq. font. ʒ q. s. ad remanent. ʒbiiij. immersis in colatura linteis duplicatis & rursus expressus hypochondrium dextrum manè & vesperti tepide foveatur. Die vigesimo hujus mensis omnia in pejus ruabant, nam inopinata accessit urinæ suppressio, unde totum abdomen, femora & pedes ita intumuerunt, ut ob metum suffocationis Ægra lectum relinquere, & in sella sedere coacta fuerit, iterum accersitus sequentia remedia diuretica consului. *Rx. ciner. fabar. juniper. absinthii ʒ ʒj. vini alb. aq. font. ʒ ʒbiiij. bulliant. par. postea colentur aliquoties ad formam lixivii, dein colat. add. sacch. opt. ʒiiij. aq. cinnam. ʒij. misce, de hoc potu manè ʒiiij. jejuno stomacho bibantur. Rx. aq. ononid. fragar. sambuci ebuli ʒ ʒvj. sacch. opt. ʒij. sal. ononid. juniper. fabar. absinth. ʒ ʒj. misce, de quo xiiij. vesperti duabus horis ante cœnam bibantur. Ex usu horum re-**

mediorum urina ordinariam viam suam acquisivit, sed quum singulis diebus orthopnoea augmentum sumeret, accedentibus ex suffocatione leipothymiis Nobilissima ista Abbatissa huic munde valedixit.



## OBSERVATIO LXXIX.

*Consimilis priori affectus*

cum epistolis

*VIRI Amplissimi & Excellentissimi*

DN. JOH. JACOBI WEPFERI

Diversorum S.R.I. Principum

Archiatři celeberrimi

*una cum responsis.*

**C**um Generosus Dominus OTTO HENRICUS DE SCHOENAV &c. similibus in præcedenti observatione descriptis symptomatibus ab aliquo tempore correptus fuisset, Reverendissimus & Nobilissimus Dominus FRANCISCUS RUDOLFUS DE SCHOENAV Ecclesiæ Cathedralis *Basileensis* Canonicus & Custos &c. Ægroti Frater, nec non tristissima, Mater præsentiam meam desideravit, ut propter periculosum hunc affectum cum V. C. Dn. *Johanne Jacobo Bentzio* Medico ordinario conferrem. Quum autem præsens ictus flavum contumacem,

cem, appetitum prostratum, in regione hepatis duritiem manifestam, asthma molestissimum, & abdomen à flatuum aquarumque copia expansum in illo, sicuti in prænominata Domina *Abbatissa*, ætonitus quasi observassem, prædictum Dominum Canonicum officiosè rogavi, ut Vir celeberrimus, *Dn. Johannes Jacobus Wepferus*, illustri Familiæ DOMINORUM DE SCHOENAV diu cognitus & acceptus, propter ancipitem morbi eventum simul ad consultationem vocaretur, qui ex ingenita sua humanitate & morum gravitate statim consensit, mihi que in mandatis dedit, ut de periculoso Ægroti statu præfatum Dn. D. *Wepferum* literis certiores redderem, ad quas Excellentissimus iste Medicus sequenti pereruditæ epistolâ prælo lectuque dignissima mihi respondit.

*Salve plurimum Cl. Domine.*

Generosi Domini DE SCHOENAV affectus nuper superficiali delineatus fuit, & ceu ex sola urina hæsiolendus propositus: advocabat quidem, verum necessariò ad Illustrissimos Dominos *Comites Furstenbergicos* abeundum fuit, & demum heri domum redii. Nunc aliâ facie idèrus à te V.E. spectandus exhibetur, quorsum quoque exc. D.D. *Benzii* literæ collimant. Quoniam excrementa subflava egeruntur beneficio decocti laxantis, nec illa cinericia apparent, ductum bilarium, ubi duodeno inseritur, non oppilatum opinor: nec collum vesiculæ biliaris obturatum existimo, quia

de cardialgia seu dolore tensivo, qui assè tegetetur, juxta cartilaginem ensiformem, altum est in ambabus literis silentium: potius crediderim, aliquot pori biliarii ramos per universum hepar dispersos obstructos esse, plurimi enim sunt, & tot quot portæ rami, ut Cl. D. *Glissonius* in libro de *anatomia epatis* primùm orbi indicavit & creberrimè vidit: aliquot ramis obstructis sanguis bile infici & nihilominus aliqua ejus portio ad intestina transferri potest, maximè si à medicamento irritentur: quia autem urina adeò ex atro flavescens est, & admodum sæculenta existit, faciesque intensè flava, ut adstantes icterum nigrum suspicati sint, vereor præter nudam obstructionem, deteriore labem, non solum in hepate, sed & in mesenterio latere, quam innuunt totius epigastrii & ventriculi inflatio, imò totius abdominis tensio, & amplius urinæ paucitas, fortè neutiquam potui quantitate respondens. Scirrhusi quidpiam extimesco; victus ratio prægressa id confirmare videtur: ut pridem audivi, generosus Dn. Æger potavit, nec vini sic, candi vim cibo pari proportionem respondente mitigavit, in primis postquam animus tantum non mœrore post obitum dilectissimæ Dominae Uxoris conficiebatur: quantopere enim talis vini abusus glandulas mesenterii & hepar (quod ipsum corpus est ex multis glandulis conglomeratum, ut nunc mecum *Malpighius* de *struct. visc.* contra *J. H. Pauli* fatetur) exsiccat & induret, frequentia hydropicorum funera his erroribus accersita testantur, prout non semel sectione comperii. Insuper mihi ardor tenuium intestinorum suspectus est; non puto il-

lum

lum à bile intestinorum cavum sublinente, sed foris incumbente, ac cum sanguine in vasis mesentericis stagnante, & vasa quasi varicosa reddente oriri, nam si intus bilis hæreret, diarrhœa non sine torminibus efficeret: non semel comperi in ictero diuturno & pertinaci, vasorum istorum oscula in cavum intestinorum hiasse, & post ingentem hæmorrhagiam ægros enecasse, cruore vel mero vel instar picis nigerrimæ copiosissimè profuso. Chylosin non ritè fieri inflationes ventriculi & intestinorum indigitant; his enim sedibus adhuc inclusos credam, necdum cava abdominis occupasse. Indicationes igitur erunt, obstructa in hepate & mesenterio referanda, æstuantia attemperanda, indurata & exsiccata emollienda, bilé ad legitimum excretionis locum blandè invitandam, & chylosin juvandam esse. An verò omnibus his indicationibus cum valetudinis emolumento satisfieri possit apud Generosum Dominum, non pauca sunt, quæ me dubium reddunt, cùm non pauca sint, quæ hydropem imminentem minitentur; ut alia taceam, dyspnœam scilicet illam mihi semper suspectam. Non tamen omnem spem abjiciendam arbitror, cùm Generosus Dominus nondum sit provectæ ætatis, præceptis medicis obtemperet, morbusque nondum inveteratus sit. Aliquo modo his indicationibus satisfacere annixus sum nuper transmissis. Potus ille laxativus similis ferè illi est, quem E. V. proponit in *River. contr. lib. XI. cap. IV.* nisi quòd temperatior sit, nam addidi radicem scorzonæræ, cichorii, herbam fragariæ, capillorum ♀, agrimonix, flores cordiales, insuper tamarindos,



rindos, passulas majores, sal fraxini & tamarisci. Pulvis similis ferè illi, quem tradit *cap. III.* est enim ex pulvere stomachico *Birckmanni*, cachectico *Quercetani*, speciebus diarrhodon abbatis & tartaro vitriolato compositus, addidi aliquid lumbricorum terrestrium peculiariter præparatorum, quos in glandularum obstructionibus peculiari virtute præditos comperio: si fortè nimium siccaret, id vitii emendaret jusculum petroselino alteratum, vel potius decoctum vestrum ex radice acetosæ, fragariæ, liquiritiæ rasæ, C. C. usto paratum, aut emulsio amygdalarum & seminum quatuor frigidorum majorum. Liquor transmissus est elixir vitriolatum *Mynsichti*, quod propter appetitum tantopere prostratum fuasi, nec E. V. improbabis admodum, cum vitriolata *l. c.* commendentur. Pilulæ confectæ sunt ex massa pilularum *Mylleri*, quæ marocostinis similes, sed longè temperatiores, addidi extractum rhabarbari cum aqua cichoreæ paratum ad methodum *Angeli Sala* pari quantitate: quia verò aliquid de intestinorum ardore jam intelligo, omnia aloetica proscriberem: tutiores sunt potus magistrales laxativi ex radice graminis, acetosæ, herba fragariæ, epaticæ nobilis, agrimonix, capillorum ♀, cuscutæ, endiviæ, floribus cordialibus, fenna, rhabarbaro, agarico, tamarindis, cremore tartari, addito sale genistæ & fraxini. Si Generosus Dominus obambulare valeret, chalybeata prudenter usurpata multum præstant, nec tibi *l. c.* displicere video. Ego tali vino utor *R. Limatura chalybis* ʒß. (hæc enim mihi præ croco ♂ placet, cum adustione spiritus penetrantissimus & acidularum

mater

mater ferè pereat) *radic. gramin. taraxac. cichor. ʒiij.*  
*herb. endiv. fragar. capillor. ♀ agrimon. fol. tamaric. flor.*  
*genist. bugloss. ʒj. sem. agn. cast. ʒʒ. anisi ʒj. spec. diatrion-*  
*santal. diarrhod. abbat. ʒiij. caryoph. ceu præcipuum*  
*♂. corrigens ʒiʒ. sal. genist. fraxin. absinth. ʒj. sacchar.*  
*ad frangendam ♂ asperitatem ʒij. vel ʒiij. indantur*  
*vasi admodum capaci, scilicet duarum vel trium*  
*mensurarum, aliàs à spiritu ♂. rumperetur: affun-*  
*de aqua cichor. endiv, ʒ ʒʒ. vin. alb. veter. ʒij. stent in*  
*digest. in loco tepido horis quadraginta, postea co-*  
*lentur, de colatura ʒij. vel ʒiij. sumantur manè, ob-*  
*ambulet æger per horas duas, postea trageam ex*  
*prædictis speciebus paratam usurpet, tertio quo-*  
*que die alvus subducatur decocto lenitivo: interea*  
*diætam accuratè observe. Et hæc sunt, quæ hâc*  
*vicem mihi succurrebant. Vale.*

*Scaphisii raptim die XII. Octobr.*

*An. ClO IO C LXIX.*

**Exc. nominis tui  
studiosissimus**

**JOHANNES JACOBUS WEPFERUS.**

Eximia hæc remedia à Viro excellentis-  
 simo ex instructis acerrimi ingenii cornu-  
 copiis deprompta Generosus Dominus  
 Æger exactè usurpavit, sed cùm diligens il-  
 lorum per septem septimanas usus in pro-  
 fligando affectu magnam virtutem non  
 exerce-

exfererēt, illustri familia DOMINORUM DE SCHOENAU præsentiam D. D. *Wepferi* rursus omnibus modis sollicitavit, qui die quarto Decembris *Sekingam* adveniens, sequentem perdoctam epistolam mihi transmisit.

*Salve plurimum Cl. Domine.*

PRæteritâ die Lunæ heic appuli, Generosum Dominum planè asciticum inveni, nec dum aperto & planè reſerato ductu cholidocho, nam iſterus cum urina impensè crocea perdurat, quamvis artus, imi ventris in primis, aquâ suffusi albescere incipiant: manè fæces aliquantulum flavedine tinguntur, post prandium & cœnam liquidas exonerat, videntur chylo dilui, nam albicantes potiùs quam cinereæ apparent, adeò ut tot malis nova calamitas scilicet fluxus cœliacus accedat. Venter supra modum prominet, lumbi, femora, crura tœdemate tument, & ad regionem diaphragmatis & renum usque vestigia digitorum impressorum servant. Totû corpus ponderosum & ad incessum admodum grave est. Respiratio anhelosa est, & sæpe admodum laboriosa maximè ab hora sexta vespertina ad duodecimam noctis: nisi decubitus interdium pumilior concederetur, aquam cavum pectoris etiam subiisse dicerem: appetit medicriter, non admodum sitit, & consuetæ copię haud ægrè multum detrahit: ac urinæ excretæ quanti-

tas vix tertiam assumptorum potulentorū æquat: post mediam noctem dormit, & quamvis dormituriat, respiratio tamen difficilior non indormiscere finit. Ex his E. V. facile intelliget, quo in statu valetudo nobilissimi Domini versetur. Aqua lixiviosa in cavo abdominis stagnans protinus evacuanda esset, ne viscera in illo contenta à muria ista elixentur quasi & misere depraventur. Paracelsus id promptè præstat, ut & scroti incisio aut crurum vel surarum scarificatio, quam quoque *Fr. Sylvius* & *Ficinus* maturandam suadent, cum ferè alia hydragoga & hydrotica frustranea sint: at quis illam in tali κακοσπλαγχνεία auderet? icterus enim pertinacissimus & diuturnus nullique medicamento cedens, hepatis inprimis pessimam dispositionem indigitat, & vita prægressa scilicet largiores computationes mesenterii glandulas haud obscurè induratas innuunt: ab apertione vel gangræna vel convulsiones extimescendæ, & cita propterea mors timenda foret, quam ut morbus afferat melius est, quàm ut generosum tale remedium profanetur, aut nos occisorum ignominiam subeamus. Cum *D. D. Bentzio* consultum putavi, hydragogis & hydroticis, quantum licet, aquam exturbandam esse, viresque strenuè refocillandas. Fortiora natura jam ferè succumbens non amplius perfert, mitiora elegimus, quæ partitis vicibus propinabuntur. Flatuum non magnam redundantiam animadverto, nam quotidie alvus aperta est ad minimum ter sua sponte, atque uno alterove flatu eliso moles ventris permanet; eadem gravior & onerosior est, quàm ut flatibus adscribenda sit; abdo-

abdominis enim tumor in tympaniticis, ut Autores monent, ipseque observavi, levior portatu est. Ob fluxum coeliacum & icterum quæ venas lacteas & ductum biliarium referant, non negligenda, ne vires collabantur, & partes nutrimento suo defraudentur, quod fieri pridem occæpit & humorum macies testatur. Speravi me E. V. heic offensurum, & ipsius præsentiam, cum ipsi per negotia adesse hæc vice non liceat, aliquandiu præstolatus essem, nisi aliorum jam advocatus fuisset. Si E. V. alia succurrant, quæ ad Generosi Domini Ægroti salutem spectent, rem præstantissimam nobilissimæ familiæ præstabit, si illa suppeditaverit. His E. V. optimè valeat faveatque.

*Sekinge die IIX. Decembr.*

A. CLO IDC LXIX.

E. V.

Cultori addictissimo

JOHANNI JACOBO WEPFERO.

R E S P O N S U M

ad hanc Epistolam.

*S. P. Excellentissime & Clarissime  
Domine.*

**M**agno sanè cordolio, simulq; justâ animi indignatione correptus fui, quòd nobilissimi Domini

mini Ægri inclyta familia Viri excellentissimi præsentiam mihi non indicaverit; Serenissimus MARCHIO BADENSIS & HOCHBERGENSIS &c. è variolis convalescens facile veniam mihi concessisset, ut ad Te, Vir excellentissime, singulari meo cum gaudio excurrere potuissem, de Generosi Domini Ægroti ancipite statu desideratam diu consultationem amice Tecum instituendi. Interim quod per dextræ conjunctionem non licuit, eleganti & pereruditâ epistolâ confecisti, ad quam propter varias occupationes incultis literis respondeo, quas ut in meliorem partem interpreteris, officiosè rogo: notum tibi est illud *πάλυθέρωτος*.

*Diversum sentire duos de rebus iisdem,*

*Incolumi licuit semper amicitia.*

Ante omnia non refragor Vir excellentissime, quod in principio epistolæ mones, ductum cholidochum necdum planè referatum esse, nam icterus cum urina impensè crocea perdurat. Adhibui cum Dn. D. Bentzio omnia remedia, quorum in priori epistola mentionem fecisti, & artis nostræ Proceres ad obstructos ductus cholidochos referandos felici cum successu etiam usurparunt: sed omnia incassum! urina nunquam immutata, ast semper impensè crocea apparuit. Sic Divinum Numen & Medicis & Ægris ostendit, perpetuæ veritatis esse illud. VETERUM. E COELO SALUS.

*Ni faveat Numen, viresq; infuderit arti,*

*Ægrum nec Medicus nec Medicina juvat.*

Novam calamitatem fluxum nempe cæliacum accedere, nullus dubito, pancreas enim venarum lactearum

M

& chyli

& chyli receptaculum obstructum esse, cum primò accederem, statim observavi, mirum igitur non est, chylum ad intestina relabi, & fæces eodem dilutas albicantes apparere. Ante quatuordecim dies hydropicum aperuit Cl. Dn. *Glaferus*, Professor Anatomicus noster, in quo pancreas semiputre observatum fuit. Interim ut simplicem veritatem profitear, verba sequentia epistolæ Tuæ non percipio: *Ventris moles gravior est & onerosior, quàm ut flatibus adscribenda sit, abdominis tumor in tympaniticis, ut Auctores monent, ipseq; observavi, levior portatu est.* nescio enim, quem hæc verba tangant. Certè à toto veritatis tramite aberravit delator, qui Viro excellentissimo persuadere voluit, me in generosi Domini *Ægri* affectibus *SIMPLICEM* vel *SOLUM TYMPANITEM* agnovisse, de hac opinione nec somnians cogitavi, scio tympanitem esse speciem hydropis, sed novi etiam in ægris *SOLUM & SIMPLICEM TYMPANITEM* *RARISSIME* observari. Constans mea sententia fuit, quam Dn. D. *Bentzio* Medico ordinario, si illius recordari vellet, in superiori ædium conclavi aliquoties candidè indicavi, cum iëtero conjunctum esse ascitem tympaniticum, hanc non muto, nisi à Te, Vir excellentissime, meliora edoctus sim: perplacet enim mihi illud *Solonis*:

ἡμεῖς κω αἰεὶ πολλὰ διδασκόμεθα.

*Semper addiscens senex fio.*

Porro unicum hoc admiror, quod præsens magnam flatuum abundantiam non animadverteris in ægro, cum tamen ille mihi, quoties accessi, de molesta flatuum copia

copia conquestus fuerit, hinc cū singularem clysterem flatus discutientem sæpius injiciendum præscripserim, die nono Octobris Dn. D. Bentzius per literas indicavit: *heri denuo clysterem ordinarium injici curavi, qui effectum suum blandè ac egregiè præstitit, excrementa copiosè educendo, FLATUSQUE INNUMEROS QUASI FORAS EVOCANDO.* Sed annectit, verū perseverat ventris inflatio, & Tu Vir Clarissime scribis, uno alterove flatu eliso moles *ve* permanet. His omnibus subscribo, nec in diversum abeo: sed nosti Vir excellentissime, quod sæpe flatus cum humore aquoso se cavitati abdominis aut tunicis peritonæi insinuent, qui nullis machinis educi possunt, & hæc forsan causa est, quod moles corporis semper æqualis in ægro appareat. Ante duos annos in Nosocomio nostro, defunctæ mulieris hydropicæ, cujus venter in vastam & onerosam molem semper sibi similem intumuerat, abdomen aperuit Dn. Samuel Braunius, Chirurgus nosodochii exercitatus ordinarius, admoto cultro mox se obtulerunt plurimi flatus cum impetu exitum quærentes, postea demum aquosus humor, sed non in tanta, qualem sibi adstantes imaginabantur, copia effluxit. Unde ex prædictis abundè elucescit, sententiam meam, quæ generosum Dominum ægrum pro ascitico tympanitico agnoscit, adhuc firmo talo inniti. Exempla rara non sunt, illa apud celeberrimos Scriptores Præcticos passim occurrunt. Paracentesin cum Dn. ægro propter *ανασπαστικήαν* minimè tentandā esse, iniquus essem, si contradicerem, etiam calculum meum addo, quod *ictericus pertinacissimus & diuturnus nulliqz medicamento cedens*



hepatis imprimis pessimam dispositionem indiget, & vita progressa scilicet large computationes mesenterii glandulas induratas haud obscure innuant. Quod hætenus paracentesi generosis remediis nondum annuverim, rationes urgent, quas Nicolaus Tulpus, amplissimus Consul & Medicus Ambsterodamensis, lib. II. observat. XXXIIX. & XXXIX. proponit. Hæc sunt Vir excellentissime, quæ ad epistolam Tuam percrevit ex animi candore respondere necessarium duxi, officiosè rogans Virum clarissimum, ut ea, quæ pollet animi & ingenii integritate ac dexteritate, omnia æqui bonique consulat, ego me inter illos lubens profiteor, qui

— — funguntur vice cotis acutum  
Reddere quæ ferrum solet, exors ipsa secandi.

Vale Vir magne ad Nestoreos annos feliciter & porro fave

Excellentiæ Tuæ

Cultori officiosissimo

BERNHARDO VERZASCHÆ.

Ad

Ad hæc literas rursus perdoctâ epistolâ respondit celeberrimus Vir, hanc cum responsione mea subjungo, nam utraque huic amicæ disquisitioni, (quam diffictor cum superficialia aperti corporis & partium affectarum descriptione suâ maximam partem excitavit) omni ambitionis turgidæ fastu remoto finem imposuit.

*Salve plurimum Cl. Domine.*

**P**ROcul dubio Exc. Vir à Cl. D. D. *Bentzio* tristem morbi Generosi Domini DE SCHOENA V eventum pridem intellexit: aperuerunt cadaver, ultra triginta libras aquæ in abdomine continebantur, flatuum nullam mentionem fecerunt, eparscirrosum, flavum, exsanguis, vesicula biliaria cum lapillo & bile crassâ ac viscidâ, impleta, qualem quoque celeberr. *Platerus* in ictero pertinaci observavit, pulmones quoque malè dispositi inventi sunt. Quæ cum ita fuerint, non mirum est, in tantopere depravata viscerum constitutione omnem laborem nostrum irritum fuisse, equidem illam ante abitum meum prævideram; cum enim post ultimas ad E. V. datas discessurus eram, orthopnoeâ gravissimâ Æger obruebatur cum tussi inani, manè syrupum expectorantem paravi, vix tantil-

lo ejus deglutito vomica pulmonum rupta fuit, pusque album benè coctum tussi rejecit, quod ad ultimum halitum continuavit. Nova hæc calamitas, quum mihi antehac vomica latens ne in mentem quidem venerit, tum me, tum adstantes admodum perterrituit: ob liberiores respirationem per viçes concessam generosus Dominus æger melius sperare cœpit. Ego verò animum penitus despondebam, cum quatuor morbos haud obscure in hoc subjeçto observarem, quorum quilibet ad mortem afferendam suffecisset: suspectæ quidem fuerant læsiones etiam à levissimis purgantibus, quæ latentibus abscessibus frequenter accidunt; at de vomica nunquam cogitabam, cum dyspnœa, tussis inanis febrisque lenta aliàs asciticis aut ascitico-tympaniticis salvis pulmonibus plerunque adsint: vomicam hanc folliculo obvallatam ex puris conditione diu intra pulmones latuisse conjeci, quod etiam *Fernelius lib. V. cap. X.* monet, qui latens & abditum vitium nuncupat, exiguum quidem vocat tuberculum; at ego ovi magnitudine & majus quoque ovo *Patavii* vidi. Ad dubia, quæ *E. V.* in ultimis movet, non necessum est, ut respondeam, cum illorum decissionem mors fecerit. De paracenthesi tamen non possum non *E. V.* ansam præbere, ulterius in praxi, quam felicissime & cum laude maxima exercere novi, in illam inquirendi. Vocavi illam remedium generosum, & quidem non immeritò, quæ citò & turò hydroperem ascitem & pectoris quoque maturè & legitime instituta tollit, non secus ac venæsectio in febribus

bribus acutis prudenter suscepta, ceu generosum remedium illas aufert; mature autem facienda est visceribus salvis, & legitime ad methodum *Sanctorii* & *Sylvii*, nimirum non lancettâ vulnus oblongum faciendo, sed acu argenteâ cavâ perforando in debito loco, nempe tribus vel quatuor digitis transversis sub umbilico & totidem digitis latus versus: *Sanctorius* quoque umbilicum perforat. Hydropis curatio, quæ hydragogis, hydroticis & diureticis fit, nisi protinus cedat, plerunque incurabilis est & ferè Medicorum opprobrium. Expendat Cl. Vir, quæ *Platerus* in curatione hydropis indigitat: agnoscit ille hydropem frequenter oriri à calida & sicca intemperie, nihilominus cùm ad evacuationem seri in cavum abdominis effusi pervenit, invitus medicamenta arripere cogitur, quæ intemperiem hanc augment, ac morbum primarium exasperant, quod ipse excellentissimus *D. Platerus* non diffitetur: hinc Cl. *D. Bruno* in commentariis super *Jesseniam* non sine plausibilibus argumentis purgantia in hydrope penitus propemodum rejicit: pluribus rem persequerer, nisi alias in literis exarandis occuparer, nam nuperrimè domum redii, unde tardius quoque respondeo. Aliquot cadavera hydropicorum secui, observavi multa hunc morbum illustratura, quæ Deo volente aliquando publici juris faciam, ac ea quæ de paracenthesi digna accuratius expendam: exempla novi felicitis & infastæ paracenthesis, quæ passim occurrunt; infastus exitus sæpè non immerito Medico imprudenti, non rarò Ægro vel tergiversanti

vel tardius Medicum vocanti imputatur. Plura non addo. E. V. tum hoc, tum plurimis subsequentibus annis feliciter valeat vivatque.

*Scaphusii, properante calamo,  
inter negotiorum turbas,  
die IV. Jan. A. clō Ioc LXX.*

E. V.

addictissimus

JOHANNES JACOBUS WEPFERUS.

R E S P O N S I O  
ad hanc Epistolam.

*Certis de causis paulò latiùs deducta.*

*S. P. Excellentissime & Clarissime  
Domine.*

Q UOD nobilissimus & generosus Dominus OTTO HENRICUS DE SCHÖENAV &c. Ægrotus quondam noster (cujus animæ æternum benè sit!) huic mundo valedixerit, triste hoc nuncium post finitas exequias demum ad aures meas pervenit. Si D. D. Bentzius, quod certò certius ab ipso sperabam, discessum & corporis apertionem statim, uti pollicitus erat, mihi signi-

significasset, remotis omnibus obstaculis memet-  
ipsum stitissem: nosti enim Vir excellentissime,  
quòd genuina causarum morbificarum & letha-  
lium per anatomiam investigatio laboriosam dili-  
gentiam requirat, quæ non tumultuario opere  
apertum corpus pervagetur. Ante omnia amice  
consentimus, ascitem mortis causam inter alias  
fuisse, hanc quoque Dissector innuit, nam ex rela-  
tione ipsius, ut scribis, aperto cadavere *ultra libras  
triginta aqua in abdomine continebantur*. Ego ut de fla-  
tuum sic & de magna feri abundantia nunquam  
dubitavi: verè enim Vir summus *Thomas Bartholinus*  
*centur. IV. epistol. medic. LXV.* ad excellentissimum *D.  
Theodorum Schenckium* Professore Medicum *Jenen-*  
*sem* scripsit, *FLATUS IN ASCITE RARO DE-*  
*SUNT*. Quapropter argumentorum pondera ex-  
spectabam, quibus sententiam meam examinare  
digneris, num ictero conjunctus fuerit ascites tym-  
paniticus? Unicum arietem admoves, scribis  
enim, non necessum esse, ut mihi respondeas, cum  
*nullam observatorum flatuum mentionem fecerit* Dis-  
sector. Credo facilè, quòd de flatibus inventis ni-  
hil ad Te scripserit Dissector, nam de apertione  
peritonæi & intestinorum nec verbum in Tuis  
addidit: *ιδὲ ῥῶδ' ἰδὲ πῆδ' ἡμῶν*. ibi, ibi flatus à Dissec-  
tore quærendi, & procul dubio inventi fuissent.  
Quippe peritonæum duplici membranâ prædi-  
tum esse summi Anatomici testantur, *Bartholinus* as-  
serit, illud ab umbilico ad pubem manifestè dividi  
in duas tunicas adeò distantes, ut in earum capaci-  
tate vesica contineatur: intra hanc perito-  
næi duplicem membranam plurimos flatus sæpi-

simè colligi, magno cum damno experiuntur illi, qui rupturis in inguine aut scroto obnoxii sunt: nam à solo flatuum imperu intestinum aut omentum vel utrumque herniosis aliquoties prolabitur. Quod intestinorum constitutionem in hydropicis attinet, illa vel ab humoribus serosis aut à flatibus constrictis intumescere, unanimis Medicorum consensus est. Interim non refragor Dissectori, *hepar scirrhosum, flavum, exsangue, & vesicam biliariam cum lapillo impletam bile crassâ ac viscidâ inventam fuisse*: Similia exempla Viri Præcellentissimi Rhodius, Veslingius, Schenckius, Hildanus, Forestus & alii in ictericis ac hydropicis observarunt. Porro etiam hoc miror in Dissettore, quod de reperta constitutione omenti, pancreatis & mesenterii, inprimis autem renum & lienis (utpote de quorum doloribus Dominum Ægrum aliquoties conquestum fuisse recordor) nullam mentionem fecerit, quisenim dubitat? ex tanta aquarum colluvie unam vel alteram harum partium labem non contraxisse, nam experientiâ cognitum est, quòd à continuo hujus feri affluxu facilè partes istæ inficiantur & corrumpantur. hinc Vir excellentissime in Tuis prioribus cautè & candidè monebas, *aquam lixiviosam in cavo abdominis stagnantem protinus evacuandam esse, ne viscera in illo contenta à MURIA ISTA ELIXENTUR ET MISERE DEPRAVENTUR*. Derestituendo Domino ægroto nunquam grandia pollicitus fui, quum primâ vice illum invisissem, Amicorum intimo, Dn. Marco Jacobo Beltzio, Oeconomo Seckingenensi meritissimo indicavi, Generosum Dominum Ægrum in summo vitæ periculo versari, & arte medicâ

medicâ ab hoc morbo vix evasurum esse, cujus præfagii veritatem Vir iste integerrimus mihi aliquoties in memoriam revocavit. De hydropicorum paracentesi mentem meam porro explicandi, occasionem alibi nanciscar. His vale feliciter, Vir excellentissime, ad introitum novi anni: Divinum Numen Tibi plures largiatut, ut Tu artis medicæ primarium decus cum magno languentium emolumento

*Iliacos aquare Senes aut vincere possis.*

Celeberrimi Nominis Tui

*Cultor officiosissimus*

BERNHARDUS VERZASCHA.



OBSERVATIO LXXX.

*Dysenteria.*



Incomparabilis Vir, DN. JOHANNES  
BUXTORFIUS, S. Theologiæ Do-  
ctor, Veteris Testamenti & linguæ He-  
braicæ.



braicæ Professor magnis in universam Ecclesiam Christianam meritis celeberrimus, propter affectionem hypochondriacam, quâ per multos annos discruciatuſ fuerat, ad acidulas *Sulzbacenses* mense Junio A. S. MDCLXI. se contulit: cùm autem illic loci dysenteria epidemica grassaretur, hæc decimo tertio potus acidularum die etiam illum invasit, quapropter mox omnia sua composuit, ut in rheda vectus domum rediret. Accersitus veram dysenteriam in Tanto Viro observavi; conquestus enim fuit de alvi dejectione frequenti, dolorifica, cruenta & purulenta; intestina crassa fuisse affecta inde collegi, nam excrementa, quibus sanguis & pus commixta non erant, statim post sensus dolorem cum tenesmo molestissimo dejecit: febris intensa, singultus & vomitus enormis non adfuere. Animum Eximii Fautoris mei aliàs ex perpeſſis mali hypochondriaci cruciatibus dejectum erexi, candidè monens, illum non in tanto vitæ periculo versari, quale sibi imaginetur, nullam febrem intensam, vel singultum periculosum, aut vomitum enormem urgere, intestina tenuia affecta non esse, crassaque exulcerata faciliorem curationem admittere, imò dysenteriam spleneticis salutarem censerì juxta effatum *Hippocratis sect. VI. aphorism. XXXXII. σπληνώδεσι δυσεντερίῃ ἐπιγενόμενῃ ἀγαθόν. Spleneticis dysenteria superveniens salutaris est.* quem aphorismum, cùm liber *Hippocratis* aphorismorum mihi ad manus esset, ipsemet legit, & subridenti ore respondit, Medicorum signa indubitatam demonstrationem non adducere, nec aphorismos *Hippocratis* oracula esse, eventum morbi  
fui

fui ancipitem ostensurum, an firmo veritatis tibi-  
cine aphorismus suffulciatur. Quapropter prius  
invocato per preces publicas Divini Numinis au-  
xilio, sequentem medendi methodū, in restituen-  
da Summi istius Viri prosperā valetudine obser-  
vavi. Primo die, qui erat tertius Augusti & mor-  
bi quartus, sequenti potiunculâ usus fuit. *R̄. rha-  
barb. elect. pulver. ʒj. syr. ros. sol. simplic. ʒ℥. alth. Fernel.  
ʒiiij. aq. plantagin. ʒij. misce, sumatur statim.* Pro potu  
ordinario decoctum cum syrupis convenientibus  
præscripsi, quod durante morbo libenter bibit.  
*R̄. radic. tormentill. ʒ℥. bistort. C. C. usti ā ʒij. cinamom.  
elect. ʒj. coq. in aq. fontan. q. s. ad mensuras duas & colen-  
tur. R̄. syr. cydonior. ʒiiij. granator. corallor. ʒj. misce,  
de quo aliquot cochlearia cum cyatho potius ordinarii pleno  
interdum usurpentur.* Cū vesperti excrementa ni-  
mium cruenta observassem, sequentia remedia  
præscripsi. *R̄. radic. bistort. tormentill. consolid. major.  
ā ʒ℥. herb. sanicul. pyrol. ophiogloss. solidag. Sarracen. ā Mj.  
flor. sambuci, balaustior. ā Pj. sem. sænic. ʒij. coq. in aq.  
chalybeata q. s. in colat. ʒx. solve ol. verbasc. hypericon.  
ā ʒ℥. philon. roman. ʒi℥. F. clyster. R̄. conserv. rosar. ru-  
brar. ʒj. radic. symphyt. major. cydonior. cond. ā ʒ℥. pulv.  
radic. tormentill. terr. sigill. ā ʒ℥. syr. cydonior. corallor.  
ā q. s. F. electuarius, de quo ad lubitum magnitudo nucis  
moschata sumatur. R̄. ol. cydonior. mastich. ā ʒiiij. mir-  
till. ʒi℥. ol. nucist. express. ʒj. unguent. comitiss. q. s. F. lini-  
mentum, quo inferior abdominis locus calidè inungatur.*  
Pro virium robore conservando sæpius cochlear.  
plenum aquæ nostræ cardiacæ in exercitat. de apo-  
plex. §. XI. descriptæ sumpsit, & granum laudani  
mei opiāti in River. contract. lib. X. cap. VI. propositi  
noctu

noctu ad dolorum mitigationem usurpavit: Quarto Augusti die ad solis ortum redeunti indicavit Æger, se ex usu laudani mei opiatu aliquot horas dormivisse, & aliqualem doloris mitigationem percepisse, cum autem excrementa plurimo adhuc sanguine tincta fuissent, sequentem pulverem præscripsi. *R̄. radic. tormentill. ʒj. C. C. philosophic. prepar. corall. rubr. prepar. terr. sigill. ā ʒß. cinamom. elect. ʒj. sacch. rosat. tabul. ʒj. F. pulvis, de quo tribus aut quatuor horis cochlear semi-plenum in decocto ordinario sumatur. vesperi julepus præscriptus fuit. R̄. aq. plantag. ʒiß. sanicula ʒj. syr. de ros. sicc. corallor. ā ʒß. F. julepus horā decimā sumendus.* Die quinto, cum de cruenta forti dejectione & molestissimo tenesmo quereretur, clyster injectus fuit. *R̄. rad. consolid. major. ʒß. tormentill. ʒij. herb. alchimill. pirol. sanic. veronic. ā Mj. flor. verbas. Pij. sem. hyperic. plantag. ā ʒij. coq. in aq. chalybeata q. s. in colat. ʒviii. solve ol. hypericon. verbas. ā ʒj. philon. roman. ʒij. F. clyster.* noctu granum laudani mei opiatu rursus sumpsit. Sexto die ex usu laudani tenesmus quidem mitigatus fuit, sed cruenta excreta perseverarunt, hinc julepum pro duabus dosibus præscripsi. *R̄. aq. plantag. ʒiiij. sanicula ʒiß. syr. cydonior. ʒj. corallorum ʒß. F. julepus, cujus dimidia portio manē, altera vesperi sumatur.* Die septimo conquestus fuit Æger, se totam noctem ex molestissimo tenesmo insomnem transegisse, inspexi excrementa, & cum maximam partem sanguinolenta apparuissent, pulsumque debilem observassem, clysterem, emulsionem & aquam cardiacam præscripsi. *R̄. radic. consolid. major. tormentill. bistort. ā ʒiiij. herb. sanicul. pyrol. consolid. sarrac. ā Mj. flor. verbas. Pij. sem. lini ʒß. plan-*

*℞. plantag. ʒij. hyosciam. ʒj. coq. in aq. chalybeata q. s. in colatur. ʒviiij. solv. ol. verbas. hypericon. ā ʒ℞. rosar. ʒij. lapid. hematit. præpar. ʒj. F. clyster. R̄. C. C. philosoph. præpar. ʒ℞. coq. in aq. font. ad mensuram dimidiam, cuni colat. sume amygdal. dulc. recent. excorticat. ʒiiij. F. emul-  
 sio, cui adde sacch. rosat. tabul. ʒij. misce, utatur pro bene-  
 placito. R̄. aq. cardiac. offic. ʒij. borrag. flor. tilia, ā ʒj. cinam. ʒij. sacch. ros. tab. ʒ℞. margarit. præpar. ʒj. F. car-  
 diacum, de quo cochlear plenum pro lubitu sumatur. noctu granum laudani mei opiatum rursus usurpavit. Die octavo meliusculè se habuit, & horâ decimâ nocturnâ sequentem syrupum sumpsit. R̄. syr. de ros. sic. corallor. papav. simplic. ā ʒiiij. aq. plantag. cinnam. ā ʒij. misce. Die nono ob metum tenesmi granum laudani mei opiatum noctu usurpavit. Die decimo cum excrementa adhuc sanguinolenta compa-  
 ruissent, sequentem syrupum noctu sumpsit. R̄. syr. papav. albi ʒ℞. cydonior. corallor. ā ʒij. plantag. ʒiiij. misce. Die undecimo ad tormina ventris mitiganda & somnum conciliandum rursus granum laudani mei opiatum noctu usurpavit. Die duodecimo tenesmus & copiam flatuum accusavit, hinc clysterem convenientem præscripsi. R̄. rad. alth. ʒ℞. herb. sanicul. betonic. veronic. plantag. ā Mj. flor. verbas. melilor. ā Pj. sem. lini ʒ℞. carui ʒij. coq. in aq. font. q. s. in colatur. ʒviiij. solve mell. anthos. ʒj. ol. verbas. hyperic. anethin. ā ʒ℞. F. clyster. Die decimo tertio benè se habuit. Die decimo quarto propter metum tenesmi & vigiliarum laudani mei opiatum granum noctu usurpavit. Die decimo quinto cuncta symptomata remiserunt, & decimo sexto dysenteria omnimodè cessavit. Sic DEUS OPT. MAX. ex paterna  
 & in-*

& infinita suæ clementia venerandum hoc cœli depositum universo orbi Christiano redonavit.



## OBSERVATIO LXXXI.

*Iliaca passio à ruptura.*

**V**Ir sexagenario major per multos annos rupturam in inguine dextro patiebatur, unde ad prolapsum intestinorum præcavendum convenienti subligaculo usus fuit, cum autem illud noctu exincuria relaxaretur, magna intestini portio in inguen & scrotum prolapsa erat. Manè vocatus in illo principaliora iliacæ passionis symptomata observavi, quæ Hippocrates lib. III. epidem. sect. II. agrot. IX. in muliere iliaca proponit. τὸ πόλον κατέχειν ἐκ ἡδυνάσας· ἐμεῖοι πολλοί· πόνοι πολλοὶ ἐν τοῖς ὡσὶν· καὶ ἐν τοῖσι κάτω καὶ κοιλίῳ πόνοι· σφόδρα ξυσχίσας· ὁσώδης, ἀγρυπνῶ· ἔσθω ὀλίγα λιπῖα· potum continere non poterat. vomitus multi. dolores circa præcordia. & in inferius partibus juxta ventrem dolores. tormina continua. anxia, insomnis. urinæ pauca, tenues. Hisce accedebat calamitas fundi: nam per tres dies nulla alvi excrementa reddidit, nec ullum flatum, cum tamen flatulentæ passioni hypochondriacæ obnoxius esset, per inferiora reddere potuit. Quapropter ad expultricem intestinorum irritandam mox acriori suppositoio usus fuit. R̄. spec. hier. picr. Galeni ℞j. trochisc. alhandal. ℞j. diagrid. ℞b. mell. q. s. F. suppositorium: quod sine fructu post horam secessit, unde statim sequens clyster injectus fuit. R̄. rad. lil. albor. ℞j. bryoniae ℞b. herb.

herb. betonic. veronic. parietar. malv. ā Mj. flor. chamam. Pj. sem. lini ℥℔. carui ℥ij. coq. in aq. font. q. s. in colatur. ℥x. solve mell. rorisinar. ℥iij. ol. aneth. ℥j. elect. hier. picr. Logad. ℥℔. F. clyster, qui excrementa pauca eduxit. Secundo die, cum flatus in prolapso intestino omnibus modis exitum quæterent, clysterem carminativum præscripsi. R̄. rad. calam. ℥j. alth. ℥℔. herb. menth. meliss. ā Mij. flor. chamam. Pij. sem. anisi, car. ā ℥ij. coq. in aq. font. q. s. in colat. ℥viiij. solv. mell. anthos. ℥iij. ol. aneth. chamam. ℥i℔. F. clyster. vesperi balneum humectans, emolliens, flatus & dolorem discutiens paratum fuit. R̄. rad. alth. lil. albor. ā ℥iij. herb. 4. emollient. ā Mij. betonic. meliss. menth. ā Mij. flor. chamam. melilot. sambuc. ā Mj. semin. lin. ℥iij. incisa dentur ad chartam pro balneo. Vomitus enormes balsamum stomachale compescuit. R̄. ol. nucisla express. ℥i℔. balsam. perruv. loq. ℥j. ol. still. arantior. ℥j. carui ℔℔. F. s. a. balsamum, quo scrobiculus cordis dictus inungatur. Viribus aquâ cardiacâ nostrâ prospectum fuit. Tertio die quum ex præcedenti clystere flatus exitum quæsi- vissent, ille manè & vesperi cum levamine repeti- tus, simulque sequens linimentum flatus discutiens præscriptum fuit. R̄. ol. chamam. aneth. violar. ā ℥ij. stillat. carui ℔j. absinth. ℔℔. unguent. resumpt. q. s. F. linimentum calidè usurpandum. Quarto die propter alvi adstrictionem sequens clyster injectus fuit. R̄. rad. bryon. ℥j. herb. malv. parietar. betonic. ā Mj. flor. sambuc. Pj. semin. lini ℥℔. coq. in aq. fontan. q. s. in colat. ℥viiij. solv. mell. anthos. ℥ij. elect. lenitivi ℥j. hier. picr. Log. ℥℔. F. clyster: qui rursus excrementa pauca expulit. Vesperi flatibus quâ datâ portâ exitum quærenti- bus sequentem clysterem injicere jussi. R̄. rad.

*alib. ℥j. herb. menth. meliss. carduibened. ā Mj. absinth. M℔.*  
*flor. chamam. Pj. sem. carui ℥ij. coq. in aq. font. q. s. in co-*  
*latur. ℥viij. solv. mell. rorismar. ℥ij. ol. chamam. ℥j. menth.*  
*℥℔. ruta ℥ij. F. clyster. Quinto die portio intestini*  
*prolapsi in inguine regressum quæsiuit, unde duo*  
*sacculi lacte incocti & expressi alternatim admoti*  
*fuerunt. R̄. rad. alib. ℥ij. herb. parietar. malv. beton.*  
*meliss. ā Mj. flor. chamam. melil. aneth. ā Pj. semin. lini*  
*℥j. carui ℥℔. baccar. junip. ℥ij. incisa dentur ad chartam pro*  
*duobus sacculis. Sexto die propter alvum suppressam*  
*& flatus constrictos clyster laxans & carminativus*  
*injectus nec non balneum repetitum fuit. R̄. rad.*  
*alib. ℥j. lil. albor. bryon. ā ℥℔. herb. malv. parietar. meliss.*  
*menth. ā Mj. flor. sambuc. Pj. sem. lini ℥℔. carui ℥ij. coq. in*  
*aq. font. q. s. in colat. ℥viij. solv. mell. rorismar. ℥ij. elect.*  
*diacatholic. ℥℔. ol. chamam. ℥j. terebinth. opt. cum vitel.*  
*ovi solut. ℥ij. F. clyster: qui fæces induratas & ma-*  
*gnam flatuum copiam eduxit: ad vesperam intesti-*  
*no retrogredienti sequens cataplasma admotum*  
*fuit. R̄. farin. rad. alib. ℥℔. semin. lini ℥℔. fœnigr. ℥ij.*  
*pulv. flor. chamam. ℥j. semin. fœnic. anisi ā ℥℔. coq. in lacte*  
*ad formam cataplasmatidis, sub finem adde olei chamam.*  
*aneth. ā ℥j stillat. carui ℥ij. F. cataplasma, quod calidè ali-*  
*quoties admoveatur. Septimo & octavo die clyster*  
*prædictus laxans & carminativus tanto cum leva-*  
*mine repetitus & injectus fuit, ut die nono ipsemet*  
*Æger sine ulla vi intestinum prolapsum reposue-*  
*rit, quod aliqui præstantes Chirurghi adhibitâ*  
*omni diligentia præstare non*  
*potuerunt.*



## OBSERVATIO LXXXII.

*Abortus.*

**N**obilissima Domina MARIA REGINA DE SCHOENAV, Generosissimi Domini JOHANNIS THEODORICI DE SCHOENAV, SACRÆ MAJESTATIS IMPERATORIÆ &c. &c. Consiliarj meritorum gloriâ splendidissimi Uxor, Generis & Sexus sui præclarum decus, acerbissimo illustris Familiæ cum luctu tres abortus passa fuit: ut dilectissimam Uxorem, animæ delictum suæ, à calamitoso hoc malo liberaret Dominus Maritus, Medicos clarissimos in consilium vocavit. Cùm fortè fortunâ apud diversos ægros *Rheinfelda* commorarer, nobilissima ista Domina venerandam Dominam Matrem, MARIAM EPHROSINAM DE SCHOENAV, Matronam omni virtutum splendore coruscantem, *ibidem* degentem invisit, datâ hâc occasione me accersivit, & unâ cum Matre quàm humaniter rogavit, ut de funesta hac calamitate illis mentem meam candidè explicarem. Posteaquam in examine habito illa mihi retulisset, tres istos abortus copiosam uteri hæmorrhagiam per quinque dies antecessisse, quam nullis remediis inhibendam sine virium jactura toleraverit, inde collegi, sanguinem nimiam copiâ turgidum in utero fœtus obruisse, illosque vasis umbilicalibus disruptis foras propulsi.



Cum igitur in præcellenti ista Domina, ab octo septimanis grvida, habitum corporis carnosum, colorem faciei floridum, functiones robustas, reliquaue insignioris plethoræ indicia observassem, intrepidè illam adhortatus sum, ut singulis mensibus venam in alterutro brachio, vel in manu salvatellam usque ad ultimum gestationis mensem aperiret, & quinque uncias sanguinis circiter educi permetteret, simulque ad foetum roborandum & hæmorrhagiam uteri inhibendam sequentes morsellos & trageam usurparet. *Rx. amygdalar. dulc. recent. excortic. ʒj. cort. citri cond. conserv. rosar. rubr. borragin. confect. alkerm. incompl. ā ʒij. nuc. indic. cond. ʒiij. corall. rubr. preparat. ʒj. spec. diatrionsant. ʒij. radic. tormentill. margarit. preparat. ā ʒss. sacch. opt. aq. borragin. solut. ʒvj. F. s. a. morselli. Rx. spec. diatrionsantal. ʒij. diamargar. frig. corall. rubr. prepar. ā ʒj. radic. tormentill. ʒss. oss. de cord. cervi ʒj. cinnam. elect. nuc. mosch. caryophyll. ā ʒss. sacch. opt. ʒvj. F. s. a. tragea.* A repetitis istis venæsectionibus & diligenti horum remediorum usu filium elegantem adhuc superstitem, nobilissima ista Domina inexplicabili cum Familiæ gaudio in lucem protulit. Simile exemplum *Lazarus Riverius lib. XV. medic. practic. cap. XVI. & centur. I. observation. medic. XLV. proponit.* Fœmina *Monspeliensis* vario gestationis tempore tres abortus passa est, dum quarto grvida foret, circa finem mensis secundi correpta fuit iisdem ventris & lumborum doloribus, qui aliorum abortuum prodromi esse consueverunt: ad eam vocatus & mulierem plethoricam advertens statim ad uncias quatuor sanguinem eduxi, tunc intra dimidiam horam dolo-

res omninò remiserunt, ista autem symptomata tempore menstruorum debito apparebant; tertio mense eadem symptomata redeunt, ægra rogat, ut rursus venæsectio instituatur, cùm ex illa præterito mense præsentaneum levamen percepisset, annui: hinc etiam quarto, quinto, sexto, septimo & octavo mense recurrentibus iisdem symptomatibus phlebotomia repetita, & circa finem noni mensis fœmina ista filium benè valentem enixa fuit: Nolo tamen ut hisce exemplis persuasus junior Medicus audacior fiat in sanguine gravidis mittendo, sed illum oportet, prius morborum decursus & mulierum habitus diligenter examinare, hinc ubi manifestas phlebotomiæ indicationes animadvertit, adstantes præmoneat, majus ex morbi sævitia quàm apertione venæ periculum imminere, & tunc sanguinem parcè educat: si plethora largam sanguinis detractionem postulet, illa distinctis vicibus instituenda erit. Palmarium argumentum, quod nonnulli contra venæsectiones gravidarum objiciunt, ex Hippocratis sect. V. aphor. XXXI. desumitur γυνὴ ἰν γαστρὶ ἔχουσα φλεβοτομηθεῖσα οὐκ ἀπεύσκει, καὶ μᾶλλον, εἰ μείζον ἐστὶ τὸ ἔμβρυον. *mulier uterum gerens sectâ venâ abortit, & magis si major fuerit fœtus.* Sed illis respondeo, aphorismum hunc esse explicandum de largissima Antiquorum sanguinis missione, quæ mulieribus gravidis non saltem abortum sed etiam mortem inducere posset, nam Veteres non unciarum pro more seculi nostri, sed librarum pondere sanguinem in phlebotomiis eduxerant: protuli suprâ observat. XII. exemplum Oeconomi, cui ipsemet Galenus horâ quintâ tres libras sanguinis, &

horâ nonâ rursus unam libram eduxit: quibusdam sex libras sanguinis unâ vice detractas fuisse testatur idem Galenus in libro de curandi ratione per sanguinis missionem. cap. XIII. mirum igitur non est, quod largas istas venæsectiones vel mors cita aut lenta aliquoties subsequuta fuerit, uti hoc lib. IX. method. medend.

cap. X. ore rotundo confitetur. Δύο ἀνθρώπους ἀπαυμένους εἶδον ἐν αὐταῖς τῶν ἰατρῶν ταῖς χερσὶ λειποθυμήσαντας μὲν ἀνακαμινδέντας ὃς ἔκεῖ· πολλοὶ δὲ εἰ καὶ μὴ παρορμήματα διεφύλαξαν ἀλλ' ἐξ ὑστερῶ γε ἀπὸ τοῦ τῆς θανάτου καμᾶν· ὅς εἰ τις ἐκείνους ἀνδρὶ τε καθύστερον τὴν θανάτου, σὺν αὐτῷ ἀπώλοντο· καὶ μὲν γὰρ εἰς τόσον ἴσθιοι μακροὶ ἐξέπεσον, ὥστε κενώσασιν ἀμέτερος ἐκλυθείσης τῆς θανάτου· ἄλλοι δὲ εἰς τὸν ἐφεξῆς βίον ἄπαντα, τὴν χρόνον ὅλῳ τῇ σώματι ἔχον ψυχρότερον, καὶ θνήσκοντες σὺν αὐτῷ ἀνακαμινδέντας τὴν ἐν τῇ ἀμέτερος κενώσεως βλάβῃ· ἐξ ἧς ψυχρότητι οἱ μὲν ἀρροιστικῇ καχεκίᾳ καὶ ῥαδίᾳ ὡς πᾶσι βλαπτομένοις διεκίχοντο· ἄλλοι δὲ ἐξ αὐτοῦ τέτυκταισιν ἐάλωσαν ἐλεθρίοις, ὑδρίοις καὶ ὀρθοπνοίαις καὶ ὑπᾶν ἀθῆναις καὶ γαστρί, ἀποπληξίαις τε καὶ παρὰ πλεξίαις. à copiosa sanguinis missione duos in ipsis Medicorum manibus perire vidi, qui postquam animo linquerentur, nunquam revixerunt: multi verò etsi non protinus at postea propter virtutis infirmitatem perierunt, quos si quis citra ejus resolutionem vacuasset, minimè periissent: quin etiam aliqui in morbos longos inciderunt; postquam immodicâ inanitione resoluta naturalis vis fuit: aliis cum immodica vacuationis noxam sarcire non potuissent, in omne reliquum vitæ tempus totius corporis temperamentum frigidius redditum est: ex qua refrigeratione facili ex quavis occasione laesi alii decolorati ac malo corporis habitu vixerunt, alii ex eo ipso in morbos deciderunt exitiales, aquam intercutem, orthopneam, hepatis ac ventriculi imbecillitatem, apoplexiam & paraplexiam. Certè nisi de largioribus istis Veterum plebotomiis interpretemur aphorismū Hippocratis, tenui tibicine fultus erit; etenim pleni sunt innumeris observationibus libri Recentiorum Medico-

dico-

dicorum, qui attestantur, quòd venæsectiones par-  
câ manu administratæ, gravidas mulieres in primis  
plethoricas, morbis acutis phrenitide, pleuritide,  
angina, febribusque continuis & malignis corre-  
ptas ab imminente mortis periculo liberarint.



## OBSERVATIO LXXXIII.

*Visus imbecillitas.*

**P**Ræfæcti Bernensis Uxor triginta annorum  
Basileam venit, & de visus imbecillitate  
mihi conquesta fuit, nam objecta sive pro-  
xima sive remota rectè cognoscere non potuit pro-  
pter nubeculam, quàm oculis obversari & visio-  
nem obtenebrare asseruit: cùm in pupilla nullus  
defectus appareret, eademque visus imbecillitas  
nunc incrementum, mox decrementum fumeret,  
ab humoribus serosis & vaporibus in cerebro natu-  
rà frigido circa regionem nervorum opticorum  
collectis malum hoc oriri, nullus dubitavi. Primâ  
die sequens infusio purgans præscripta fuit. *℞. so-  
lior. fenn. elect. ʒiij. sem. fœnic. ʒj. cremor. tartar. ʒij. sem.  
coriandr. prepar. ʒj. pœon. excort. ʒ℞. aq. betonic. euphras.  
āq. s. infund. per noct. mane bulliant par. in colat. ʒiij. solve  
elect. de succo rosar. ʒj. aq. cinnam. ʒij. F. potio purgans  
manè cum regimine diata sumenda. Tertio die ad hu-  
mores peccantes successivè educendos sequentem  
sacculum purgantem præscripsi. *℞. rad. fœnic. ʒiij.  
valerian. ʒij. cort. arantior. ʒj. herb. euphras. betonic. ā Mj.**

flor. rorismar. Pj. folior. fenn. elect. ℥ij. sem. fœnic. ℥ij. co-  
 riandr. præpar. ℥j. cinnam. macis, ā ℥℔. incisa & contusa.  
 dentur ad sacculum ex sindone albo, cui vini alb. veter. ℔iij.  
 & aq. euphras. ℔j. affundantur, de quo potu singulis vel al-  
 ternis diebus ℥vj. cum regimine diata bibantur. Die octavâ  
 ad revulsionem & derivationem humorum cervici  
 vesicatorium appositum fuit. R. pulv. cantharid.  
 ℥iij. sem. sinap. ℔℔. euphorb. gr. viij. ferment. & acet. q.s.  
 F. massa pro vesicatorio. Vesperī sequentem trageam  
 præscripsi. R. spec. de nuc. mosch. ℥℔. aromat. caryophyl.  
 dianthos, ā ℥℔. herb. euphras. cum florib. ℥j. ol. still. fœnic.  
 gt. vj. nuc. mosch. caryophyll. cinnam. ā gt. ij. sacchar. opt.  
 ℥vj. F. s. a. tragea consucto modo usurpanda. Die nono  
 sequentes pilulas consului. R. extr. luc. major. ℔j. au-  
 rear. ℔℔. sine quibus ℔j. arabic. ℔℔. ol. fœnic. gt. vj. misce  
 diligenter, formentur ex ℔j. pilul. XV. deaur. consperg. pulv.  
 cinamom. sumantur quindecim singulis septimanis manè.  
 Die decimo sequentes morsellos præscripsi. R. herb.  
 euphras. cum florib. ℥j. spec. aromat. caryoph. ℔℔. de nuc.  
 mosch. ℥i. conserv. rosar. rubr. ℔℔. fl. betonic. ℥ij. cort. citri  
 cond. ℥iij. ol. succat. fœnic. gt. vj. cinam. macis, caryophyll.  
 ā gt. ij. sacch. opt. aq. euphras. sol. ℥vj. F. s. a. morselli pro  
 lubitu usurpandi. Die undecimo electuarium ad ce-  
 rebri & visus robur usurpavit. R. conf. euphras. ℥j.  
 betonic. major. anth. rorismar. ā ℥℔. nuc. indic. condit. ℔℔.  
 folior. euphras. cum flor. ℔ij. spec. de nuc. mosch. ℔j. aromat.  
 caryophyll. dianthos, ā ℔℔. ol. fœnic. gt. vj. macis, gt. ij. syr.  
 betonic. q. s. F. s. a. electuarium, de quo ad beneplacitum ma-  
 gnitudo nucista sumatur. Die duodecimo sequentem  
 aquam ad visum roborandum præscripsi. R. aq.  
 ophthalmic. nostr. ℥iij. epileptic. nostr. ℥ij. sacch. opt. ℔℔.  
 misce, sumatur cochlear plenum pro lubitu. [Formula  
 aquæ

aquæ ophthalmicæ sequens est. ℞. spirit. euphras. ℥iij. radic. valerian. chelidon. major. fol. verben. rorismar. omnium recent. nuc. mosch. cinamom. opt. ā 3℔. fol. ruta recent. sem. anis. fœnic. ā 3ij. summitat. cum florib. euphras. select. recent. quant. infundi possant, infund. per noctem vase benè perlut. manè per B. M. leni igne destillentur, & aqua servetur ad usum. Formula aquæ anti-epilepticæ meæ talis est. ℞. radic. pæon. 3iij. visc. quern. 3j. flor. pæon. 3iij. lilior. convall. betonic. ā 3ij. tilia, 3℔. rorismar. ruta, ā 3j. semin. pæon. excort. 3℔. cinamom. opt. 3j. cubeb. caryophyll. ā 3℔. nucista, macis ā 3ij. incisa infund. in vin. alb. veter. ℥vj. aq. cerasor. nigr. meliss. lilior. convall. ā ℥vj. stent per aliquot dies, deinde in B. M. destillentur.] Ex usu horum remediorum diligenti visionem perfectam rursus sibi acquisivit, sic ut objecta remota & propinqua perfectè discernere potuerit, ad recidivam impediendam sequentia remedia præscripsi. ℞. rad. fœniculi 3ij. valerian. 3j. cort. arantior. citri, ā 3℔. herb. euphras. Miiij. verben. betonic. Mij. melissa, absinth. rorismar. ā Mj. incisis & contusis assund. decem mensur. vini albi veter. de quo cyathum plenum manè & apud prandium pro primo haustu evacuet. ℞. sem. coriandr. prepar. 3ij. fœnic. anisi, ā 3j. carui, filer. montan. ā 3℔. folior. euphras. cum florib. 3j. cinamom. 3℔. macis, 3℔. caryophyll. 3j. sachar. opt. 3viij. F. pulvis: de quo cochlear plenum cum vino albo noctu ante somnum sumatur.



## OBSERVATIO LXXXIV.

*Crurum imbecillitas, hepatis atonia, febris lenta, virium languor.*

**S**erenissimus & Celsissimus Princeps FRIDERICVS MARCHIO BADENSIS & HOCHBERGENSIS &c.&c. SACRÆ MAJESTATIS CESARÆ & ROMANI IMPERII STATVVM SVPREMVS CAMPI MARESCHALLVS Dominus meus clementissimus, mense præteriti anni Julio *Basileam* venit, ut se propter diversos morborum insultus, quos Celsitudo sua patiebatur, curæ meæ committeret. Absoluto examine in Serenissimo Principe, quinquaginta octo annos nato, observavi insignem crurum debilitatem, hepatis atoniam cum manifesta *animalis sanguificationis* læsione, obesi aliàs corporis consumptionem, faciem subflavam à pristino colore roseo quantum mutatam, fluxum alvi periculosum, febrem lentam, & universalem virium prostrationem. Ut unico remedio (nam multorum medicamentorum apparatus fastidivit Serenissimus Princeps) omnibus symptomatibus occurrerem, sequentem aquam destillatam præscripsi. *R. hepar & cor cum mensura sanguinis cervini, pomor. arantior. recent. IIX. pomor. citri recent. IV. herb. cichor. scabios. borragin. hepatic. nobil.*  
*omni*

omn. recent. ā Mj. major. recent. Mß. flor. rosar. rubr. Piiij. pæon. Pij. flor. arantior. recent. Mij. flor. citri recent. Mß. spec. aromat. rosat. diatrionsantal. diamb. diamosch. ā 3j. cinnam. elect. 3j. caryophyll. 3ij. macis 3j. incis. & contus. affund. vini albi veter. ℥iiij. aq. fl. tilia, betonit. scabios. cichor. ā ℥j. cerasor. nigr. ℥℥. stent in infus. per aliq. dies, postea s. a. destillentur, prius nodulo ex ambr. gris. 3℥. mosch. oriental. ʒj. rostro alembici immisso. Posteaquam Serenissimus Princeps manè & vesperi cochlearia quatuor plena hujus aquæ per duas septimanas usurpasset, præfata symptomata omnia imminuebantur: nam Celsitudo Sua novas in cruribus vires sentiebat, purpureus faciei color redibat, fluxus alvi cessabat, febris lenta decrefcebat, & majus in universo corpore robur assurgebat: unde hujus aquæ virtutem maximè commendavit, interque alia mihi retulit, se magno cum valetudinis suæ emolumento experiri, *nonneminem* solo invidiæ fastu hoc remedium exhibuisse. Respondi Serenissimo Principi: multorum annorum decursu quæsitam *Viri Clarissimi* in medicina dictaturam & fastos meis studiis contradicendi impetus diu *ἀπαυρόν* *πρόλεμον*, implacabilem pugnam, mihi indixisse; qui tamen ruinosis suis machinamentis nihil aliud haftenus præstiterit, nisi quodd ego animum induxerim, sincerè & constanter

*Durare & memet rebus servare secundis.*

Interim si propter impetratam dictaturam *Viro clarissimo* Panegyristæ desint,

*Intonet ipse sibi solus paena relictus,*

*Sic actor celebris plausorq; erit atq; theatrum.*

*Viri*



Viribus ita recuperatis Serenissimus Princeps aquâ Favarinam sive Piperinam (quæ in theca ampullarum fortiter obturatarum huc apportabatur) è consilio meo bibit, à cuius potu medico crura tantum robur acquisiverunt, ut post quatuordecim dies solus nulli scipioni innixus obambulare & ab Illustrissimo & Excellentissimo COMITE RAY. MVNDO DE MONTECVVLI &c. invitatus, sine molestia *Eslingam* in rheda proficisci potuerit. Cùm autem in itinere *Basileam* Serenissimus Princeps *Scaphusium* transiret, Dn. D. *Wepserum* vocavit, & ab illo petiit, ut de ancipiti valetudinis suæ statu mecum conferret; morem gessit excellentissimus Vir, & morbum Celsitudinis suæ implicatum eruditâ epistolâ, quam heic subjungo, luce præloque dignissimâ enodavit.

---

*Salve plurimum Cl. Domine.*

QUOD nuper ad Te V. E. non statim scripserim, in causa fuit repentinus meus & inexpectatus abitus ad Illustrissimum Dominum Comitem de *Fürstenberg*, apud quem diutiùs quoque detinebar, ut scribendi occasio erepta fuerit. Interea diligenter animo volvi Serenissimi Principis morbum, & quomodo ipsi occurrendum sit. Primarius affectus videtur crurum imbecillitas, ob quam nec firmo talo stare nec citra fulturam incedere valet, quin genua labant. Cæteri affectus, de quibus conqueritur, cùm vel ejus causa sint, vel à pari causa pen-

pendeant, in progressu literarum memorabuntur. Impotentia hæc, cum nullum in musculis, ossibus vel articulis vitium palpetur aut visu cognoscatur, pendebit à spirituum animalium defectu aliquo, ob quem non sufficienter muscoli vegetantur ad corporis molem seu sustinendam seu promovendam: deficient in musculis, vel quia illorum influxus per nervos præpeditur, aut quia à fonte per nervos rite apertos nec sufficientes nec satis vegeti ad musculos decenti vigore instaurandos transmittuntur. Obstaculum aliquod in nervis ab osse sacro ad crura descendentibus hæreere fortè inde concludi posset, quòd Serenissimus Princeps à lumbis ad extremos pedes frigus sentiat, verum hoc tanti non erit, vel certè illi soli hæc imbecillitas attribui non poterit, cum sedens aut decubans pro lubitu pedes moveat, insuper exquisito sensu in utroque pede præditus sit. Igitur spiritus animales à cerebro & cerebello non debitâ quantitate ad os sacrum mittentur, non cerebri aut cerebelli magnâ aliquâ culpâ, cum abundè adhuc ad partes supra cingulum ablegentur, & Serenissimus Princeps sensibus externis & internis, etiam memoriâ, adhuc valeat, nam totam morbi seriem exactè recensere atque enarrare valuit citra ullam hæsitacionem, quòd memoriâ gravius imminutâ vix licuisset: quamvis non prorsus negaverim, labem aliquam à febre continua ei aspersam fuisse, quod aliis quoque evenit, qui tanta ab illa passi non sunt. Verum defectus iste à tota massa sanguinea repetendus videtur: nimirum massa sanguinea multam & gravem spirituum jacturam passa est in  
pri-

primordio harum calamitatum, quo tempore enormiter vomuit, profusissimè venter fluxit, acutè febricitavit, nam deliravit & lingua aridissima fuit: quamvis Serenissimus Princeps febrim malignam fuisse non credat, ego tamen talem fuisse valdè suspicor, quia in castris, ubi vigit, illam contraxit, & licet ædes, ubi ex hac febre decubuerunt, non adierit, vix tamen, dum castra perambulavit, contagium evitare potuit, imò dum fortè illud cum aère hausit, gravius in corpus sæviit, quoniam die noctuque in tentorio commorans venenieventilationem suppressa insensili transpiratione inhibuit: nec postea spiritus instaurati fuerunt, nam vomitus, diarrhœa, in qua sæcibus pinguedo quædam non sine colliquationis indicio innatavit, inappetentia & vini fastidium continuarunt; non ad dierum nec septimanarum sed ad plurium mensium numerum, quæ certè sine magno spirituum dispendio fieri nequeunt: nec adhuc spiritus instauratos esse testantur habitus corporis plurimum imminutus, color faciei à pristino & olim vivace multum abscedens, subflavus scilicet & tenebricosus virium languor, qui nuper *Eslingæ* adedò invaluit, ut vix leipothymiam evitare potuerit. Imò tantum abest, ut spiritus isti vivifici instaurentur apud Serenissimum Principem, ut potius quotidie adhuc pessudentur, nam ex pulsu frequenti & celeri cognovi, illum lentè febricitare, ex recensione solutionis alvi frequentis fluxu cœliaco ægrotare, & ob fastidium vini Serenissimum Principem efficacissima spirituum refocillatione privari. Cùm itaque in sanguine imprimis

indiscretis desideretur, illi quoque præcipuè succurrendum erit, nisi enim huic ante omnia prospiciamus, non solum cætera frustranea, verum etiam diriora timenda erunt, eoque magis quia Serenissimus Princeps frequentius quàm unquam tussit, & magnam vim sputi viscidissimi, fortè etiam turbidi, ejicit. Laudabilem sanguinem Serenissimus Princeps consequetur, si chylosis exacta procuretur, ejus anadosis promoveatur, & viæ probè referentur, per quas massa sanguinea depuratur. Ad faciliorem chylosin plurimum faciet selectus ciborum boni succi & facilis digestionis eorumque quantitas ventriculo non onerosa: si nihilominus deprehendatur in fæcibus cibos quosdam coctione subterfugere, juvari poterit pulvere quodam peptico, ex quorû numero stomachicus *Birckmanni*, omisso acoro nostrate, non ineptus erit, horam ante pastum ad drachmam unam cum pane tosto & vino madido sumptus, aut si omninò adhuc à vino abhorreat, cum pauxillo jusculi gallinacei. Fluxus coeliacus, quia oboritur vel plurimis osculis vasorum lacteorum, ubi in intestina hiant, vel eorum ramo aliquo majore in mesenterio obstructis, compescendus erit neutiquam incrassantibus emplasticis aut adstringentibus, quibus mortem acceleratam novi, sed aperitivis & moderatè detergentibus, quorum beneficio unâ operâ in visceribus viæ referabuntur, per quas se massa sanguinea depurare solet, atque febris lenta mihi in primis suspecta simul debellabitur. Quale verò ad hoc opus perficiendum medicamentum seligendum sit, vel propterea hæsito, quoniam à Serenissimo Principe

audivi,

audiui, illum stomachum ad medicamenta adeo  
 nauseabundum habere, ut omnia respuat ac gratif-  
 sima quoque in parva dosi data rejiciat: laudatur  
 tinctura tartari & martis, verum vix has feret aut  
 febricula admittet: de syrupis magistralibus aut  
 decoctis longis nec verbum addo, quæ vel solo  
 nomine Principi terrifica sunt: ex innumeris nul-  
 lum præstantius & gratius nossem quam diapho-  
 reticum martiale, quod insipidum parvâ quantita-  
 te efficacissimum est, hoc egregiè heic paratur ab  
 Exc. D. D. *Sereta*, mihiq; in familiari usu est non  
 sine exoptato successu, quod eo lubentius suade-  
 rem, quia Serenissimo Principi acidulæ eadem vi  
 pollentes per paucos dies potæ profuerunt, ejus  
 dantur grana octo vel decem cum pauxillo syrupi  
 citri aut rubi idæi, vel cum conserva aliqua suavi  
 manè & vesperi horâ quintâ, post horam unam vel  
 duas elapas propinatur haustus jusculi gallinacei,  
 endivia, borragine aut acetosa alterati, non opus  
 est, ut ipsi jungantur purgantia aut alia cujusvis ge-  
 neris medicamenta, ejus usus ultra mentem con-  
 tinuandus erit: Si Serenissimus Princeps hoc reji-  
 ceret, dari possent acidulæ ad libram unam, cui sy-  
 rupi citri aut rubi idæi vel capillorum ꝑ uncia im-  
 misceatur, hâc ratione illustrissimum Dominum  
 Comitem, *Hermannum Egonem de Fürstenberg*, similibus  
 symptomatibus afflictum, *Monachii A.S. M DCLXVII.*  
 valetudini integræ restitui, ut brevi omnes artus  
 antiquum robur acquirerent. Thermarum Faba-  
 riensium insectum ob febriculam, fluxum coelia-  
 cum & colorem faciei cachecticum vix probare  
 possem, pluris facerem illarum potum. Reparata  
 sangui-

sanguinis pneumatosi, si labes superstes in nervoso genere agnosceretur, securius & cum majore fructu antiparalitica & impotentiam eundi profligantia suppeditabuntur. Et hæc sunt, quæ mihi hac vice succurrebant. Vale feliciter, & me Serenissimo Principi ac Domino humilimè commenda,

E. T.

*Cultor addictissimus*

JOHANNES JACOBUS WEPFERUS.



OBSERVATIO LXXXV.

*Dentitio funesta.*

**S**erenissimi & Celsissimi Principis FRIDERICI MAGNI, MARCHIONIS BADENSIS ET HOCHBERGENSIS &c. &c. Domini mei clementissimi Filiola, CHRISTINA SOPHIA, tredecim menses nata, aliquot dies & noctes inquietas transigere animadversa fuit. Vocatus Serenissimæ Matri prædixi naturam in lectissima Filiola acerbam dentitionem moliri, nam manifestè apparuerunt  
O inflam-

inflammatio & dolor gingivarum, tumor genarum, æstus & ariditas faucium, tussicula, pavores, vigiliæ & febricula, insuper ægra subinde digitos ori admovit, è quo saliva tenuis sæpè destillavit. Primâ die, cùm alvum per duos dies suppressam fuisse retulerit Ægræ Magistra, suppositorium præscripsi. *℞. spec. hier. picr. Gal. ʒss. mell. q. s. F. suppositorium:* quod per totum morbi decursum, si alvus singulis diebus non respondebat, ad convulsiones præcavendas repetitum fuit, unde semper materia biliosa copiosè excernebatur, rectè enim Hippocrates in libello de dentitione monuit. *ὁκόοισιν ἐν ὀδοντοφυίῃ ἢ κοιλίῃ κλείω ὑπὸ ἀγῆ, ἥσπον ἀγῆται, ἢ ὅσιν ὀλιγάκις:* quibus in dentitione alvus amplius subducit, minus convelluntur, quàm quibus parum. Sunt Viri præstantes, qui à conspectu excrementorum biliosorum primâ fronte dentitionem dubiosam reddere, & potius bilis ebullitionem sive, ut illi loquuntur, *turgescentiam* incusare solent, cùm autem illis solenne sit, clysterem ex lacte vaccino, cui vitellum ovi intermixtum est, infantibus ægris præscribere, color vitellinus excrementis alvinis faciliè inducitur, quæ dum adstantes horum ignari & præsertim mulieres credulæ aspiciunt, bilis vitellinæ copiam accusant, & propter morbum triumphatum *Io. pæan* acclamant,

— *Ἰαρσαλέ* ὁ ἀνὴρ ἐν πᾶσιν ἀμείνων  
ἐργοισιν τελευτᾷ.

*Omnibus in rebus præcellit magnanimus Vir.*  
Pro potu ordinario bibit decoctum cornu cervi, cui syrupus violarum purpurearum sæpè commixtus & gingivæ oleo amygdalarum dulcium recenti

centi illinitæ fuerunt: eâdem die duo grana lapidis bezoardici orientalis, & sex grana cornu cervi in alembico præparati cum aqua acetosa usurpavit. Secundâ die ad inflammationem gingivarum & æstum faucium mitigandum sequentibus syrupis usa fuit. *Rx. syr. farfar. violar. purpur. granator. ʒʒss. papav. rhead. pæon. julep. ros. ʒʒtj. aq. scabios. ʒiiij. misce:* ex horum syruporum usu magnum levamen ægræ sensit, hinc illos cum libenter usurpâset, aliquoties repetiti fuerunt. Tertiô die, cum tussis ægram molestaret, febricula urgeret, & ob membrorum jactationem convulsionem metuendæ essent, conveniens eclegma præscripsi. *Rx. mann. elect. aq. scabios. solut. & aliquot. dilig. colat. ʒij. syr. rosar. sol. simplic. ʒiiij. farfar. ʒss. spec. marchion. ʒj. cornu cervi in alembic. præpar. margarit. præpar. ʒʒss. sacchar. rosar. tabul. pulv. q. s.* F. eclegma molle, de quo pro lubitu cochlear infantile plenum concedatur. Recordor hâc ipsâ die inter fœmineos aulicis blandimentis assuetos sermones quæstionem motam fuisse, num ægræ Sororem in eadem hypocausto degentem ad aliud conclave transferre necessum sit? respondi, cum nulla morbillorum & variolarum vel febris malignæ symptomata appareant, ægræ translationem necessariam non esse, quicumque enim dentitionem morbis contagiosis annumerat, ille à nemine, nisi sit *παρρητικός* iners, sive *βελούδιος* fatuus, assensum impetrabit. Die quarto usum elegmatis & syruporum ægræ continuavit. Die quinto cum iisdem remediis petrexi & pulverem prædictum bezoardicum ægræ concessi. Die sexto ad cerebri & cordis robur, convulsionum præcautionem & virium conservationem sequens



aqua præscripta fuit. *Rx. aq. epileptic. nostr. 3ij. cardiac. offic. 3iij. pœn. scabios. ʒʒ. hirundinar. 3ij. sacch. rosat. tab. 3ib. spec. marchion. ʒj. misce.* Die septimo ob accensionem febris & prædicta symptomata sequentem julepum præscripsi. *Rx. aq. farfar. pœon. acetos. ʒ 3j. syrup. violar. purpur. 3vj. papav. rhead. 3ij. granator. 3ib. julep. rosat. 3ij. misce pro aliquot dosibus.* Die octavâ rursus pulverem bezoardicum concessi. Die nonâ, ob imminentem virium jacturam & jusculorum roborantium fastidium, emulsio præscripta fuit. *Rx. amygdal. dulc. recent. excort. 3iij. sem. melon. 3ij. aq. farfar. acetos. pœon. ʒ 3j. F. emuls. ad sacch. rosat. tab. pulv 3ij. margarit. præparat. cornu cervi in alembico præpar. ʒʒ. misce pro aliquot dosibus.* Die decimâ propter vires collapsuras aquam cardiacam præscripsi. *Rx. aq. cardiac. offic. scabios. fl. tilia acetos. ʒ 3ib. sacch. rosat. tab. 3ij. margarit. præpar. ʒj. cornu cervi philosoph. præpar. ʒib. misce.* Die undecimâ ultimus instabat agon, hinc sub noctem elegantissima ista Filiola mortem vincendo ad æthereas translata sedes cœlesti beatarum animarum choro inserta fuit. Ut causa mortis ad oculum pateret, præsentibus nobilissimis Fœminis & Virginibus, adstantibusque Dominis *Michaele Rispachio & Joachimo Geringesio*, Chirurgis exercitatis, os apertum fuit, mox se obtulerunt quatuor dentes, qui durante morbo eruperunt, nec non reliquæ gingivæ solidiores & duriores observatæ sunt. Plura per sectionem inquirere Serenissima Princeps permittere noluit.

Primarius istius formosæ Filiolæ obitus an sam mihi præbuit, sedulò inquirendi, quibus remediis dentitionem infantum difficilem & periculosam præca-

præcavere possimus: plurima apud excellentissimos Scriptores Practicos observatu digna occurrerunt, principaliora in gratiam illorum, quibus isti Autores non sunt ad manus, annotare necessarium duxi. Celeberrimus *Franciscus de le Boe Sylvius* in opere erudito *lib. IV. prax. med. tract. I. cap. VII.* commendat butyrum insulsum solum, vel cum melle junctum, si sæpiùs illo gingivæ illinantur, insuper laudat cremorem lactis & manantem ex incisa galli crista sanguinem gingivis affricatum; porro ut faciliùs gingivas densas & crassas penetrent dentes, ex ebore, crystallo, argento jubet parare instrumentum inter gingivas collocandum, quod dum infantes mordent, illæ citiùs perforantur. Nobilissimus Vir *Baldassar Timæus von Guldentsee* Serenissimi Electoris Brandenburgici Archiater, *lib. V. casuum medicinal. X.* ad facilitandam dentitionem periculosam & mitiganda symptomata præscripsit linimentum gingivis per intervalla affricandum: *R. mell. virgin. butyr. insuls. ā ʒß. pulv. liquirit. rasur. dent. apr. & lupi ā ʒj. F. linimentum.* ad dolorem leniendum & inflammationem inhibendam peculiariter commendavit succum sempervivi & plantaginis, utque densitas & crassities gingivarum magis laxaretur & emolliretur, mucilaginem seminis malvæ & althææ cum vitello ovi subactam gingivis repetitum illinendam consuluit: extra maxillas cataplasma ex floribus chamæmeli, summitatibus anethi, malva & farina hordei applicuit, factâ priùs inunctione ex oleo liliorum alborum & amygdalarum dulcium, cumque non parum blandimenti adferat gingivarum frictio, jussit dentem lupinum

fæpiùs morderet puer, verùm cum nec sic quidem dentes prodirent, guttam unam atque alteram sanguinis ex incisione cristæ galli adhuc calentis per vices affricuit, quo factum est, ut tandem erumperent incisorii, quos postmodum ex aliquo temporis intervallo & canini tandemque molares sequuti sunt. Clarissimus Vir Hieronymus Mercurialis lib. II. de morb. pueror. cap. XVI. extollit cerebrum leporinum elixum, si illo gingivæ illinantur: consentiunt Viri experientissimi, Franciscus Ioel lib. IX. prax. Med. sect. III. §. XIII. Daniel Sennertus lib. II. medic. practic. part. I. cap. XI. Wolfgangus Höferus lib. VII. Hercul. Medic. cap. VI. Franciscus Ronssseus in libello de humana vitæ primord. cap. XLVII. omnes sequuti Galenum, qui de cerebro leporino lib. XI. de simplic. medicament. facultatib. cap. VI. ita disserit. ἐγκέφαλον λαγῶν παρρηι-  
 βόμῳν τε καὶ ἰοδιώμῳ ἐπὶ τῶν ὀδοντῶν πάλιν ἐμάθωμ' ὠφελι-  
 μόν ὑπάρχειν, ἡ ψευδὴς ἀληθείᾳ τῆς κεφαλῆς ὅλης ὥσπερ εἶθε, καὶ μὴ ἐξαιρέτως γὰρ ἡ σὺναμὶς αὐτῇ ἀλλὰ παρὰ πλεονάζει καὶ βε-  
 τύρεται καὶ τοῖς ἄλλοις ὅσα πρὸς ὀδόντας ψευδῶν πάλιν αἰετοῦται.  
 cerebrum leporis attritum & esum utile esse didicimus pueris  
 dentientibus capite videlicet & toto elixo, ut ego facere soleo  
 non tamen eximia vis ejus est, sed similis mellis & butyro &  
 aliis, quæ ad dentientes pueros conveniunt. qualem dentes  
 equini in promovendis infantum dentibus utilita-  
 tem afferant, Serenus Samonicus sequentibus versibus  
 proponit,

*Nudum hominem primum mater natura  
 profudit,*

*Insuper excruciat, niveis quum dentibus  
 armat,*

*Colla igitur molli dentes neſcentur equini,*

*Qui*

*Qui primi fuerint pullo crescente caduci.*

Ad promorionem dentium *Johannes Stephanus Strobelbergerus*, in manuductione sua ad curandos pueriles affectus *cap. IX.* lenientia & emollientia commendat, hinc jubet nutricem oleo amygdalarum dulcium, butyro recenti & melle invicem mixto, infantum gingivas illinire, inprimis autem ipsi placet baculus glyzyrrhizæ rasæ & contusæ syrupo convenienti illitus, crebro affrictu gingivis admotus. Si propter gingivarum duritiem dentes erumpere nequeant, suadet expertissimus *Ambrosius Pareus lib. XXIII. chirurg. cap. LXVII.* scalpello gingivas aperire, antequam lethalia signa superveniant, quod remedium exoptato cum successu aliquot suis liberis, præsentē *Feureo, Altino, Curtino, Medicis Regiis & Guillemo Chirurgo* applicavit; hinc cū Duci Nivernensi octimestris puer ex dentitione mortuus esset, causam obitus cum Medicis ordinariis anxie inquisivit *Pareus*, nec aliam quàm gingivarum duritiem invenire potuit, nam apertis scalpello gingivis dentes omnes velut in procinctu ad egressum apparuerunt.

Cæterum prænominatus *Strobelbergerus* dentitionem aliquam notham proponit, quam mulieres vulgato sermone die Weuß quasi Weußzahn appellant: sunt autem tumores quidam in gingivarum posteriori parte in acumen protuberantes, unde infantes in lactis tractu aliququaliter impediti suctum (quem Germani schmaßen vocant) sonorum ac sibilantem reddunt: hujus spurizæ dentitionis certior erit Medicus, si infantem ad posticam aurium partem digito compresserit, statim enim ille ob do-

loris magnitudinem ejulabit: hoc malum periculo sæpè non caret, cui profligando in primis conducit externam aurium regionem præsertim posticam a xungiâ leporis frequenter inungere, & gingivas oleo amygdalarum dulcium sæpius demulcere.

Tandem in ægrotantum infantum cura hoc attendendum, ut juniores Medici symptomata periculosa dentitionis propter illius incertum tempus sibi diligenter ob oculos ponant, nec naturæ vim, dum soli bilis orgasmo aut torminibus intestinorum aliisque symptomatibus occurrunt, in dentitione ancipiti molienda floccipendant, quoniam ex illius neglectu funestæ convulsiones facile subsequuntur. Sed objicitur: Medicum apud ægrotos infantes, qui septimum ætatis mensem nondum egressi sunt, de periculosa dentitione securum esse posse; cum Hippocrates divinus ille Senex, fallere & falli nescius, in libello de *partu septimestri* scripserit, τοῖσι παιδίοισιν ἐπὶ ἑπτὰ μῆνας ἔντοί τε καὶ ἄλλα ἀλγεῖται γίνονται τοῖς σώμασι, καὶ οἱ ὀδόντες φαίνονται κερκίσαι ἐν ταῖς τῷ χρόνῳ. *pueris, ubi septem menses à nativitate impleverunt, tum alia utilia in corporibus fiunt, tum dentes in eò tempore apparere incipiunt.* Respondeo an Hippocrates divinus sit ille Senex fallere & falli nescius? judicent illi, qui rationem ab omni præjudicio liberam cum multivaria experientia conjunctam possident, institutum meum non permittit, plurimos locos indicare, in quibus humani aliquid passus est eximius artis medicæ Coryphæus. Cum veritate congruit, sæpius post septimum ætatis mensem dentes infantibus erumpere, interim etiam

etiam citiùs & maturiùs mense videlicet ætatis tertio, quarto, quinto & sexto dentes è gingivis prodire, *Johannes Riolanus Filius, Professor Regius Parisiensis, Anatomicorum Princeps, in commentar. de ossibus cap. XI. Gothofredus Mæbius, Antecessor Jenensis & Medicus Electoralis Brandeburgicus in fundament. medicin. physilog. cap. X Gerardus Blasius Medicus & Professor Ambsterodamensis in commentar. ad syntagma anatomicum Joannis Veslingii cap. XIII. Franciscus de le Boe Sylvius Antecessor Medicus Lugduno-Batavus Primarius lib. IV. Prax. med. tract. I. cap. VII. Fabricius Hildanus centur. epistol. LXIIX. Testes omni exceptione majores & Viri antiquâ fide excellentissimi comprobarunt.*



## OBSERVATIO LXXXVI.

*Ambustio periculosa & subsequuta dentitio lethalis.*

**E**jusdem Serenissimi Principis Filiola CLAUDIA MAGDALENA ELISABETHA, decem septimanas nata, quum Præfecta lectulum vasculo æneo circa pedum decubitus calefaceret, ambustionem in genu dextro die vigesima quarta Januarii passa fuit: eâdem diræ hujus calamitatis horâ aulam frequentanti occurrit Præfecta lamentis gemituq, & sæmineo ejulatu me obsecrans, ut in hoc deplorando & sibi funestissimo casu omni malorum lerna suppetias

ferrem. Statim convocavi prænominatos Chirur-  
gos, qui communi consilio linimentum ex oleo  
rosarum cum aliquot vitellis & albuminibus ovo-  
rum ad formam linimenti agitato paratum, cui lin-  
teola immergebantur, parti ambustæ applica-  
runt. Unico hoc remedio omnis dolor & inflam-  
matio sublata fuit. Porro ad convulsiones ex subi-  
taneo terrore infantibus familiares præcavendas  
sequens remedium præscripsi. *R. aq. fl. til. pœon.*  
*scabios. acetos. ʒij. sacch. rosat. tab. ʒij. spec. marchion. ʒß.*  
*margarit. præpar. ʒß. misce. de quo sæpè cochlear in-*  
*fantile plenum, nec non in pultrcula species mar-*  
*chionis correctæ concessæ fuerunt. [Formula spe-*  
*cierum marchionis correctarum sequens est. R. ra-*  
*dic. pœon. maris decrescente ʒ effossi ʒß. visci quern. rasur.*  
*eboris, ungu. alcis, cinnabar. nativ. ver. cornu cervi in alemb-*  
*bico præpar. secul. pœon. semin. pœon. corallor. rubr. præ-*  
*par. ʒ ʒij. hyacinth. præpar. margarit. præpar. ʒ ʒij. lapid.*  
*bezoar. oriental. ver. ʒß. folior. aur. num. XX. F. pulvis, do-*  
*sis est scrupulus dimidius ad scrupulos duos.] remotâ omni*  
*inflammatione emplastrum de spermate ranarum*  
*admotum, & cicatrix paulatim inducta fuit. Nu-*  
*trix consternata aliquoties sequentem julepum*  
*usurpavit. R. aq. scabios. flor. til. borragin. ʒ ʒij. syrup.*  
*granator. berber. ʒ ʒij. spir. sulphur. gt. vj. F. julepus pro dua-*  
*bus dosibus. Cæterum contra quascunque combu-*  
*stiones unguentum Fabricii Hildani magno cum fru-*  
*ctu usurpare soleo, quod in libello de combustionibus*  
*cap. VII. proponit. R. Butyr. recent. in aq. rosar. lot.*  
*ʒiß. ol. violar. vitell. ovor. amygdal. dulc. ʒ ʒij. fatin. hord.*  
*ʒvj. croci ʒj. mucilag. sem. cydonior, ʒß. cera q. s. F. un-*  
*guentum;*

guentum: hoc emollit, dolorem lenit & paulatim cicatricem inducit.

Absolutâ feliciter hâc curâ Præfectam monui, ut ad periculofam & moleſtam dentitionem præcavendam oleo amygdalarum dulcium recenti gingivæ demulcerentur, nec non ad cerebrum & nervofum genus roborandum ſpecies marchionis correctæ uſurparentur, quæ ſimul reſpirationem faciliſent, concoctionem promoveant, ſtatus diſcutiant & bilis ebullitionem impédiant. Cùm ſecundo die Martii moleſta tuſſicula illam affligeret, ſequentia remedia præſcripſi, de quibus alternatim cochlear plenum infantile conceſſum fuit. *R. Syr. farfar. pæon. ʒ℥. jujubin. ʒiij. granator. ʒij. ambr. gris. gr. j. aq. ſcabioſ. ʒij. miſce. R. aq. ſcabioſ. pæon. fl. til. ʒ℥. j. cichor. ʒ℥. ſacch. roſar. tab. ʒij. miſce. R. mann. Calabr. elect. aq. ſcabioſ. ſolut. & dilig. colat. ʒij. ſyr. farfar. pæon. ʒ℥. j. ſpecier. marchion. ʒj. diatr. ſimplic. ʒ℥. ſacch. roſat. tab. q. ſ. F. elegma molle.* Inſuper Sereniſſimam Matrem candide monui, me omnibus modis vereri, ne tuſſicula iſta periculofæ dentitionis prodromus ſit, quæ prædictio vana non fuit, nam vigefimo quinto & ſubſequentibus diebus ejuſdem menſis in illa, pavores, ejulatus, tumorem gingivarum & genarum inflammationem aliquoties animadverti, unde etiam eadem remedia conſului, quorum in præcedenti obſervatione mentionem feci. Decimo tertio morbi die, qui erat Aprilis ſeptimus, ægram convuſſiones invaſerunt, mox Sereniſſima Mater exhibuit pulverem ſplendidiſſimæ familiæ *Holfaticæ* gentilitium, cujus eximiâ virtute non ſaltem ſtupendæ convuſſiones, ſed & ipſa horrenda epile-



epilepsia in plurimis ad miraculum sublata fuit: sed eheu omnia incassum! nam subsequenti die propter convulsiones diutius durantes & nullis remediis cedentes elegans ista Filiola supremum vitæ diem obivit. Cum inter alia Serenissimæ Principes lectulo moribundæ assidentes, & ultimum nunc inter cœlites triumphantis agonem cum lacrymarum torrente adspectantes, quæstionem movissent, quomodo tam atroces & diuturnas convulsiones excitare possit dentitio? Illis respondi, *Thomam Willisium*, acerrimi iudicii Anatomicum & Medicum, in *specim. patholog. cerebri cap. IV.* hujus quæstionis enodationem nervosè & eleganter proposuisse. In nobis ipsis experimur, quantus sit cruciatus, qui irritationem circa dentium radices sequitur, revera tantus & tam atrox, ut excitari vix possit atrocior, quippe nervorum quinti paris propago insignis ad cujusque dentis radicem pertingit, quæ cum à sanguinis aliorumve humorum particulis acrioribus illic congestis vellicatur, corrugatione suâ acerrimum molestiæ sensum sive dolorem infert: hujus nervi vellicatio in pueris dentientibus idè contingit, quia dentibus crescentibus & adhuc intra gingivas vix dum cavatas inclusis membranæ & fibræ quaquaversus distenduntur, hinc sanguis in circuitu præpeditus tumorem infert, adeoque nervos comprimit, nec non acriores feri particulas iis suffundit, quibus nervi insigniter vellicati corrugationibus & spasms dolorificis torquentur: Hæc acutissimus *Willisius*. Unde gravibus istis rationibus & experienciâ rerum magistrâ edoctus nunquam dubitavi, hanc quoque Serenissimi Principis Filio-

Filiolam five ab ὀδοντοφυΐα germinatione, aut ex ὀδοντοφυΐα eruptione dentium fato decessisse, quod ad oculum monstrare potuisset culter anatomicus, si Mater Serenissima corpusculi apertionem concedere voluisset.

~~~~~

## OBSERVATIO LXXXVII.

*Exomphalus.*

*Viro Clarissimo & Eruditissimo*

DN. JCH. MELCHIORI WALTHERO

Medicinæ Doctori & Physico

*Tannensi meritissimo*

Amico meo colendo

BERNHARDVS VERZASCHA

S. P. D.

*Clarissime Domine Doctor,*

**E**X mandato Reverendissimi Domini Egroti nunc communis nostri Te V. C. de illis certiore reddo, quæ in præfato Domino heic *Basilea* juxta artis præscripta observavi: inspecto abdomine umbilicus nucis moscharæ magnitudinem excedens prominuit, tumorem hunc, qui ob tussim excitatam secundum omnes dimensiones augebatur, supino corpore comprimens animadverti,

madverti, portionem omenti & tenuium intesti-  
 rum huc appulsam esse, quippe istis retrusis tumor  
 omnis evanuit, in cujus basi simul foramen inveni,  
 quod minimum digitum adæquavit. Certè con-  
 sideratis istis signis nequaquam dubitandum est,  
 exomphalum (quem alii rupturam umbilicalem  
 vocant, sed malè, cùm potius sit laxatio peritonæi  
 in illo loco, ubi arctè vasa umbilicalia colligare so-  
 let) esse hunc morbum, in quo processus peritonæi  
 valis umbilicalibus olim dicatus juxta omnes di-  
 mensiones dilatatur, & foramen per membranam  
 nervosam huic processui à natura concessum ita  
 ampliatur, ut laxior factus omentum & intestina  
 tenuia prolabi sinat. Causæ processum hunc & fo-  
 ramen ampliantes non sunt flatus aut serum extra  
 intestina in cavitate abdominis occlusum, aliàs  
 enim omnes ascitici & tympanitici exomphalum  
 paterentur. Potius cum Viris clarissimis affirman-  
 dum censeo, processum hunc cum foramine am-  
 pliari, quoties intestina flatu distenta ad hunc lo-  
 cum violenter impelluntur, quod in conatibus in-  
 tensioribus sæpissimè contingit. Sic Fœminæ præ-  
 sertim pinguiore in laborioso partu facilè exom-  
 phalis corripuntur, uti in duabus mulieribus ob-  
 servavi, rara exempla leges apud *Fabricium Hilda-*  
*mun centur. III. observation. LXIII. & LXIV.* Idem ma-  
 lum accidere potest in violenta redditione fæcum  
 alvi induratarum, & ponderis gravioris gestatio-  
 ne, ab ascensu equorum altiorum & vomitibus  
 enormibus: quippe in istis violentis conatibus  
 diaphragma deorsum adigitur, hinc constrictis un-  
 dique abdominis musculis intestina tenuia in fa-  
 scicu-

sciculum quasi coguntur, sicque fortiori impulsu foramen cum peritonæo vel confestim vel iteratis vicibus sensim dilatatur: ad promptiorem distensionem facit obesior corporis habitus, unde pinguiores magis quam macilenti exomphalis obnoxii sunt, ut in simili casu ante quinque annos ad me scripsit celeberrimus Seculi Medicus, *Johannes Jacobus Wepferus*. Ex istis omnibus facile colligis V. C. quænam potior causa ad hujus affectus productionem in Reverendissimo isto Domino concurrat, illa nempe, quæ flatibus materiam copiosam subministrat, nam totum illius abdomen à flatibus distentum & repletum esse observavi, ad quorum generationem inserviunt computationes largiores & convivia lautiora, quæ Reverendissimum Dominum sæpius frequentare ipsemet mihi libere confessus est. E supradictis satis superque elucescit V. C. nostrum commune studium huc dirigendum esse, ut intestina cum omento in umbilicum prolapsa commodè reponantur, & reposita in naturali suo loco conserventur: reponenda sunt blandâ manu: in cavitatem abdominis recondita manebunt vel curatione palliativâ, quæ convenienti subligaculo absolvitur, vel vera & solida, in qua processus peritonæi laxatus contrahendus, ampliatus foramen coarctandum, & omnes occasiones, quæ dilatationis ansam præbent, declinandæ sunt. Sed cum Reverendissimus Dominus sit sexagenario major, & multivarios errores in victu commiserit, foramen ac peritonæi processus ad naturalem statum vix reduceretur. Chirurgiâ si quid  
tentare

tentare liceat, illa experientissimum, ut nosti, Artificem poscit, qui nostris

*Rara avis in terris nigroq̃ simillima cygno est.*  
 Sanè patientem morbi tolerantiam periculosis remediis anteponendam censeo, quia tales ægri ad canam senectutem sine manifesto damno pervenire possunt, si solummodò exomphali incrementum prohibeatur, quod apud Reverendissimum Dominum diætâ, medicamentis & subligaculo præstabitur. In diætâ cibi flatuum copiam excitantes cane pejus & angue vitandi sunt, hinc mecum persuadeas Reverendissimo Domino, ut remedia ad flatus discutiendos diligenter usurpet, nam absque hac sollicitudine omnis noster labor frustraneus erit, imò ampliorem umbilici distensionem vix præcavebimus; flatuum proventui occurreretur sequentibus tabulis. R̃. cinnam. elect. ℥iij. caryophyll. ʒj. nucistæ ℥ij. zingiber. galang. ā ʒß. piper. rotund. ʒß. rad. liquir. ras. ʒij. sem. anis. fœnicul. ā ʒiij. ol. destill. cinnam. gt. viij. caryophyll. nucist. ā gt. iiij. sacch. opt. aq. meliss. & cinnam. solut. ℥xiiij. F. s. a. tabulæ ad lûbitum usurpandæ. Si alvus nimium adstricta fuerit, commodè & tutò clysteres injiciuntur, nam illi intestinum colon propter valvulam Riolano litigiosam rectè vocatam (quod suo loco, pace Viri cujusdam Clarissimi, sine phaleris & morso demonstrabo) transcendere nequeunt: aliquas clysterum formulas adjiciam, quas ad beneplacitum tuum mutare potes. R̃. rad. alth. ʒj. herb. 4. emollient. ā Mj. flor. aneth. Pj. sem. lini ʒß. coq. in aq. font. q. s. in colat. ʒx. solv. elect. lenitiv. ʒj. mell. violar. ʒiß. ol. chamam. ʒj. F. clyster.  
 vel

vel ℞. rad. bryon. ℥j. herb. veronic. betonic. ā Mij. flor. chamæm. Pj. sem. carui. ℥ij. coq. in aq. font. q. s. in colat. ℥x. solv. elect. diacatholic. ℥j. mell. anthos. ℥i℔. ol. aneth. ℥j. F. clyster. vel ℞. rad. enula ℥j. herb. meliſſ. menth. ā Mij, flor. sambuc. Pj. sem. anis. ℥ij. coq. in aq. fontan. q. s. in col. ℥x. solve mell. mercurial. ℥ij. ol. violar. ruta ā ℥℔. terebinthin. cum vitell. ovi solut. ℥iij. F. clyster. Si injectio clysterum molesta esse incipiat, passulæ laxativæ *Angeli Salæ* usurpentur, quarum formulam superius observat. XXXIX. proposui. Vehementiora medicamenta purgantia in primis vomitoria Reverendissimo Domino maximè nocent, leniora autem præsertim repetitæ infusiones, quæ humores vitiosos blandè educunt, ipsi proficua erunt. ℞. folior. fenn. elect. ℥iij. rhabarb. elect. ℥ij. crem. tartar. ℥i. sem. anisi, fœnicul. ā ℔. aq. veronic. betonic. ā. q. s. infund. per noctem, mane bulliant parùm, in colat. ℥iij. sol. syr. flor. persicorum ℥j. aq. cinnam. ℥ij. F. infusio purgans mane cum regimine diætæ usurpanda. Exomphalo multa fomenta adhibere tutum non est. Parti affectæ solum emplastrum contra rupturam, cum convenienti subligaculo applicare soleo, sed illud violenter contrigendum non est, ne enterocœle in alterutro inguinum excitetur, intestina enim flatibus turgida facilè processus peritonæi in hisce corporibus laxiores distendunt, ac prolapsui exitum parant. Hæc sunt Vir clarissime, quæ in gratiam Reverendissimi Domini, ut amicæ petitioni illius satisfacerem, Tecum conferre volui. Vale feliciter, & me constanter, quod facis, amare perge. *Basilea die X. Septembr. Ann. cId Idc LXXI.*



## OBSERVATIO LXXXIIX.

*Convulsiones à lochiorum sup-  
pressionē.*

**P**uerpera viginti quinque annorum secundo puerperii die convulsionibus correpta fuit. Cum ad illam sub vesperā vocarer, retulit obstetrix lochiorum fluxum in ægrota omnimodè suppressum esse. Adstantibus indicavi, à lochiis retardatis elevari vapores malignos, qui nervosam cerebri compagem vellicando convulsiones excitent, fluxionem lochiorum omni curâ excitandam esse, quam conveniens clyster promovebit. R̄. rad. bryon. ℥j. aristoloch. long. ℥ss. herb. meliss. puleg. artemis ā Mj. flor. chamæm. Pj. baccar. laur. ℥iij. sem. anisi ℥ij. coq. in colat. ℥x. solve elect. benedict. laxat. ℥j. hier. picr. Logad. ℥ij. ol. ruta, chamæm. ā ℥ss. sal. gemm. ℥j. F. clyster. Ad inhibendas & præcavendas convulsiones aqua hysterica Zvvelferi cum mea anti-epileptica & species marchionis correctæ usurpatæ fuerunt. [Formula aquæ hujus hystericæ præstantissimæ sequens est. R̄. rad. pæonia debito tempore collectæ & recentis, bryonia recentis ā ℥ij. Zedoaria ℥iss. allij recent. ℥j. herb. artemis. rubr. abrotan. mentha, aristoloch. rotund. omnium recent. ā. ℥iss. baccar. laur. ℥j. sem. pæon. carui, cumini, ā ℥vj. myrrha ℥iss. macis ℥vj. croci ℥iij. camphora, opii Thebaic. præpar. ā. ℥ij. castor. recent. ℥iss. incisæ & contusæ nec non concurbitæ vitæ immixtis superaffundantur aq. meliss. cum vino destill. ℔ iij. spirit. cerasor. nigr. ℔ ij. factaq; digestionē destillentur ad siccitatem specierum: ex spe-

ex speciebus residuis beneficio spiritus vini repetitis affusionibus paretur extractum non admodum spissum, quod aquâ destillatâ jungatur, postea ubi aliquandiu adhuc conjuncta in digestionē servata fuerint, filtretur essentia, usuique asservetur. Si cui libuerit aquam & extractum singula scilicet seorsim asservare, nec prius, quam ubi necessitas postulat, ipsa conjungere vel conjunctim propinare, is malè non fecerit, quod & ego facere soleo. ] Secundo die unguentum & sacculi hypogastrii admoti sunt. *R. ol. cheirin. chamam. lil. albor. ā 3ij. stillat. puleg. ʒj. sabinae ʒʒ. unguent. resumptiv. q. s. F. linimentum tepidè usurpandum. R. rad. bryon. ʒiʒ. aristoloch. ʒj. herb. artemis. pulegii, meliss. ā Mij. flor. sambuc. chamam. ā Pij. semin. lin. ʒj. baccar. junip. ʒʒ. incisa dentur ad sacculos duos quadratos in vino albo coquendos & hypogastrio tepidè admovendos.* Tertio die pulverem anti-epilepticum cum remediis lochia pellentibus mixtum præscripsi. *R. spec. marchion. correct. ʒij. fœcul. bryon. pœon. ā ʒj. trochisc. de myrrh. ʒʒ. F. pulvis in sex doses aequales dividendus & in aqua prædicta anti-hysterico-epileptica sumendus.* Vespere rursum clyster injectus fuit. *R. radic. lilior. albor. ʒj. angelic. ʒʒ. herb. 4. emollient. ruta, centaur. minor. ā Mj. flor. cheirin. sambuc. ā Pij. sem. lini ʒʒ. coq. in colat. ʒx. solve mell. rorismar. ʒij. ol. aneth. ʒi. elect. hier. picr. Gal. ʒvj. terebinth. cum vitell. ovi sol. ʒiij. F. clyster.* Die quarto electuarium ad cerebri & nervoli generis robur ac lochiorum fluxum promovendum consului. *R. conserv. fl. betonic. ʒj. major. lilior. convall. meliss. ā ʒʒ. nuc. Indic. cond. ʒij. spec. marchion. ʒij. fœcul. bryon. ʒj. syr. pœon. q. s. F. electuarium, de quo ad libitum magnitudo nutrista sumatur.* Vespere julepum



usurpavit: R̄. aq. artemis. puleg. ā. ʒiʒ. syr. artemis. & alth. Fernelii ā ʒj. spec. marchion. ʒj. trochisc. de myrrh. ʒʒ. misce pro una dosi. Die quinto saphena pedis dextri mane, & vesperi suffitus uterinus ex trochiscis hystericeis Londinensibus per infundibulum exceptus, fuit. [Formula horum trochiscorum sequens est, quam celeberrimi Medici Londinenses, Practici exercitatissimi, in pharmacopœa sua p. m. 241. proponunt. R̄. asa foetid. galban. ā ʒiʒ. myrrh. ʒij. castor. ʒiʒ. radic. asar. aristoloch. long. folior. sabin. matricar. nepeth. ā ʒj. dictamn. ʒʒ. F. s. a. trochisci cum succo aut decocto ruta. Subsequenti die lochia rursus apparuerunt, convulsionones cessarunt, & Aëgra omnimodè convaluit.



## OBSERVATIO LXXXIX.

*Tumor cancrusus in mammâ  
dextrâ.*

**F**œmina annorum triginta tuberculum exiguum in mammâ dextrâ vix conspicuum passa fuit, cum autem illud sensim ad avellanæ magnitudinem accresceret, me vocavit: animadverti tumorem rotundum, lividum durum & firmiter parti inhaerentem, ægra insignem dolorem non accusavit, saltem de punctationibus, quasi acu contingerent, in loco affecto conquesta fuit. Pro felici cura sequentem sacculum præscripsi. R̄. rad. lipod ʒʒ. cort. tamaric. ʒij. herb. veronic. be-

*nic. hepatic. nobil. artemis. cardui bened. summit. centaur. min. flor. borrag. ā Pi. folior. senn. elect. ʒiij. rad. hellebor. nigr. legit. præpar. ʒij. crem. tartar. ʒß. rasur. ebor. ʒii. sem. anisi ʒiij. pœon. excortic. ʒß. cinam. elect. ʒj. caryophill. ʒß. incisa dentur ad sacculum ex sindone albo, cui mensura vini albi veteris affundatur, de quo alternis diebus ʒvj. manè cum regimine diata bibantur. vino hoc purgante ad finem perducto ob mensium suppressionem saphena pedis dextri aperta fuit, inde menstrua redierunt, & tumor in mammâ decrevit: hinc sequentes pilulas consului, R. extract. catholic. ʒii. magist. scammon. gutt. gamandr. ā ʒi. extr. helleb. nigr. legit. præpar. ʒß. pœon. ʒß. ol. major. gt. vj. misce omnia diligenter, formentur pilula ex ʒj. numer. XI. de aur. consperg. pulv. cinam. sumantur undecim pro dosi manè singulis septimanis cum convenienti diata. Ægra per septem septimanas pilulis istis usa fuit, & tumor omnis in mammâ disparuit. Cùm emollientia remedia in cancris occultis cane pejus & angue vitanda sint, tumori huic nullum cataplasma & emplastrum applicare volui, illa enim malum exacerbare & mortem accelerare præcellentium Chirurgorum exempla comprobant. Matrona nobilis apud Guilielmum Fabricium Hildanum centur. III. observat. LXXXVII. posteaquam quinquagesimum ætatis annum complevisset, menstruaque substitissent, tuberculo ad papillam dextram correpta fuit, quod licet ab initio durum & aliquo modo molestum, attamen quia exiguum & indolens fuerat, ægra flocci pendit: quum autem illud subsequenti anno accresceret, & dolorem excitaret, Chirurgus in consilium accersitus fuit, hic cùm emollientia remedia per mensem ferè inte-*

grum adhibuisset, paulatim acuto dolore ruptum est tuberculum, solaque sanies loturæ carnis instar exstillavit: mox ulcus fœtidum, dolorificum & adeo malignum subsequēbatur, ut totam mammam ad sternum & sub axillam usque eroderet, tandem ob maximum dolorem, continuum cibi fastidium & nausēam perseverantem Ægra exspiravit. Sic alia nobilis fœmina, quæ tumorem cancrōsum juglandis magnitudine in mamma sinistra patiebatur, cū se cujusdam Medici, promptam sanitatem audacter pollicentis, curæ submitteret, vitæ dispendio experta fuit, quā dammosa sit cancri medela reliquorum ulcerum more suscepta; dum enim Medicus iste remediis emollientibus, calefacientibus & attrahentibus mali sublationem aggressus est, majori excitato dolore & inflammatione tumor mammam distendens in tantam molem accrevit, ut instar mali granati nimia maturitate dissiliētis media rupta fuerit, unde obortā hæmorrhagiā effreni ad eam compescendam Medicus coactus fuit pulveres causticos inspergere, verū hinc efferata inflammatione & dolore superveniens syncope Ægram è medio sustulit, uti *Ambrosius Pareus lib. VI, Chirurgia cap. XXX. refert.* Quod in hac cura ad fortiora remedia nempe extractum catholicum & hellebori nigri descenderim, *Galenus in commentar. sect. VI, aphorism. XLVII, ansam præbuit.* γυναικα τινὰ καρκινώδη ποτὶ ὄγκον ἐν μαστῇ ἔχουσαν ἰασάμεν, ἰχυρῶς κενώσας ποτὶ ἁλὶς ἀλγὲ φαρμάκῳ καθάρῳ Ⓞ μίλανα, καὶ εἰ παραληφθῇ ποτὶ ἡ κάθαρσις, ἰδυίῃ ἀλγὲ βάθῳ αὐτῇ γίνεται, καὶ ἕως αὕτη μέγα καλυμμένη με, παραχρῆμα κελδεὶ καθάρειν. *wulverem quandam cū aliquando tumorem cancrōsum in mamilla pateretur, forti atq; frequenti medica-*

medicamento atrabilem purgante, ad sanitatem perduxit, si aliquando purgatio omitteretur, dolorem profundam sentiebat & me advocato statim volebat evacuari. Cæterum in cancris exulceratis incurabilibus, quorum plures in utroque sexu observavi, ad acerbissimos dolores mitigandos & exulcerationes profundiores præcavendas cum magno Ægrotorum solamine ac levamine sequentia remedia præscripsi. R̄. succor. recent. express. solani & plantagin. ā ʒiʒ. plumb. usti & lot. ʒʒ. thur. ʒj. misceantur omnia in mortario plumbeo cum pistillo plumbeo, dein lintea intincta mamillis applicentur. R̄. ceruss. ʒʒ. plumb. usti & lot. pompholyg. ā ʒij. succ. solan. plantag. recent. express. ā ʒʒ. ol. rosar. rec. ʒj. ungnent. diapomphol. q. s. F. unguentum molle, quo pars affecta illinatur. R̄. rad. scrofular. recent. ʒij. herb. geran. Rob. recent. Mij. ornogloss. solan. plantagin. scabios. caprifol. agrimon. omnium recent. ā Mj. sem. cydonior. fœnigr. ā ʒj. ranar. aquatil. albumin. ovor. num. XII. alumin. ʒij. camphor. ʒʒ. aq. rosar. solan. plantag. ā q. s. F. destillatum in alembico plumbeo, quo locus affectus sape abluendus est. In hoc casu monendi sunt ægrorum famuli, ut exactam sui rationem habeant, exulcerata enim carcinomata inter morbos contagiosos referri, amplissimus *Tulpius lib. IV. observat. med. IIX.* suo & aliorum exemplo comprobavit. *Adriana Lamberta* ætatis provectæ, post devoratam aliquot annorum molestiam, ulceratum mammæ carcinoma ad eum putredinis gradum pervenit, ut halitu suo inficeret famulam continuè operam ipsi navantem, & quidem eò majore labe, quò diutius suppetias tulerit, ac familiaris cum illa vixerit; è quibus conceptæ perniciæ scintillis tandem exortum ingens incendium,

P


quod

quod & Dominam & famulam pessundedit, infidente utriusque pectori ac alis tam foedo ac inæquali ulcere, ut aliquando animi penderem, utra illarum graviori sævitiâ excarnificaretur: imò mihi ipsi solus foetentis hujus carcinomatis interitus præter insignem cordis defectum aliquando guttur adeo exulceravit, ut quotidie non solum mercurio præcipitato, verum etiam forfice opus fuerit ad auferendas crustas à depascente veneno in faucibus excitatas: unde vel cæco apparet, ulceratum cancerum & cominus & eminus contagium suum disseminare, ac proinde satius esse fidem habere experimentis indubitatis, quàm incautæ juventuti frivolis argutiis atque excogitatis captiunculis illudere.



## OBSERVATIO XC.

*Cordis Palpitatio.*

 Dolefcens nobilitatis ftemmate inclytus viginti quatuor annorum, palpitationi cordis obnoxius, dum equo frenis obluſtanti diutius infideret, vehementiffimum cordis arteriarumque motum paſſus erat, qui ipſum adeo diſcruciabat, ut fere in ſyncopen incideret. Ad illum in hoſpicio coronæ decumbentem vocatus venam in brachio dextro aperire, & ſanguinis uncias octo educere juſſi, qui maximam partem ſerofus fuit: inſuper ad præavendam ſyncopen de ſequenti aqua

aquâ cardiacâ sæpe cochlear plenum sumpsit. R̄. aq. cardiac. officin. borragin. ā ʒiʒ. cinam. ʒij. margarit. præpar. ʒj. lapid. bezoar oriental. ver. ʒʒ. [Formula aquæ cardiacæ in officinis nostris pharmaceuticis consuetæ sequens est. R̄. aq. rosar. ʒiij. cinamom. flor. tilia ā. ʒij. cerasor. nigr. meliʒ. violar. ā ʒj. julep. rosar. ʒiii. misce.] Secunda die ad humores serofos blandè evacuandos sequenti syrupo purgante usus fuit. R̄. Syrup. rosat. compos. ex infus. senæ, rhabarb. & ageric. supra observat. LXXIX. propositi ʒiʒ. elect. de succo rosar. ʒij. aq. borragin. q. s. F. potiunculâ. Vesperi julepum usurpavit R̄. aq. borragin. bugloʒ. acetos. ā. ʒii. syrup. ribium, rubi idai, citri ā ʒj. F. julepus pro duabus dosibus. Tertio die venam in brachio sinistro aperuit, sed sanguis non ita serofus apparuit. Vesperi ad robur cordis electuarium præscripsi. R̄. conserv. rosar. rubr. ʒj. borragin. ʒʒ. bugloʒ. ʒiij. roob ribium. ʒʒ. confect. alkerm. ʒij. hyacinth. ʒj. oss. de cord. cerv. ʒj. lapid. bezoar oriental. ʒʒ. syr. rub. idai q. s. F. electuarium, de quo ad lûbitum magnitudo nucisfæ sumatur. Quarto die motus cordis inordinatus omnimodè cessavit. Ut malo huic molestissimo præveniret Adolescens iste nobilis, vere & autumno venam aperuit, hoc enim in praxi meâ semper observavi, ad palpitationem cordis tollendam & præcavendam venæsectiones in corporibus plethoricis præsentaneum auxilium afferre, quapropter Galenus lib. V. de loc. affect. cap. II. verissimè scripsit.

ἰ παλμὸς τῆς καρδίας πολλοῖς ὑγιαίνουσιν ἀμέμπλως νεανίσκοις τὸ καὶ παρακινᾷσθαι ὥσθι γενόμενον ἐξ αἵφνης ἀνδρὶ φανερὴ συμπλώματ' ἐτέρῃ, καὶ πάντες ἔτοι φλεβοτομηθίντες ἀνέλωτο, καὶ τελείως αὐτῶν ἔνιοι τῷ συμπλώματι ἀπηλλάγησαν ἐπὶ τῇ φλεβοτομίᾳ λεπτυνύσῃ Ἀλγίτῃ καὶ φαρμάκων ὁμοίων θεραπευθέντες. ἔνιοι δ' αὐτῶν αὖτις πάλιν τῷ συμπλώματι ἐπιφανέιντο, ὁμοίως θεραπευθέντες, οἷδα δὲ ὅτι καὶ ἰναιῶν

ἥρως πάχοντα τῷ καλμῷ συμπιωμα, καὶ ἐπειδὴ τοῖς ἐτε-  
 ροῖς ἐπειράθη τῆς φλεβοτομίας ἀφελύσσει ἴφθασεν ἐπὶ τῷ τείρειν  
 φλεβοτομηθεὶς πρὶν ἀλῶναι τῷ συμπιωμα, καὶ ἔτι ἐπὶ πρᾶττε κατὰ  
 τὸ ἐξ ἧς ἐτῶν πλείονων, καὶ τῷ καὶ τὰλλα ποιεῖν ἐπὶ τῇ φλεβοτομίας  
 ὡροσηκόντως. *Palpitatio cordis pluribus integra valetudine de-*  
*gentibus tum adolescentibus tum adultis subito sine alio mani-*  
*festo accidente evenire visa est, atq; omnes eos sanguinis detra-*  
*ctio juvit, atq; hoc accidente planè liberati sunt, qui post san-*  
*guinis missionem tenui victu medicamentisq; similibus usi*  
*sunt; quos verò hujusmodi accidens rursus infestavit, eadem*  
*curâ curati sunt. ceterum novi quendam quotannis verno*  
*tempore hujusmodi palpitationis accidente vexatum, qui cum*  
*per tres annos à sanguinis detractioe se adjutum intelligeret,*  
*anno quarto, antequam accidens ipsum invaderet, sanguinem*  
*misit, idq; pluribus deinceps annis faciendo, quæq; post san-*  
*guinis missionem facere oportuit, diligenter observavit. Ante*  
*venæsectionem vere sacculum & autumno apoze-*  
*ma sequens usurpavit. R. rad. doronic. scorzoner. ā 3ij.*  
*herb. hepatic. nobil. ceterach. fragar. cichor. ā Mß. flor. IV.*  
*cordial. ā Pi. folior. senæ elect. 3iijß. rhabarbar. ver. 3ß. cre-*  
*mor. tartar. 3iij. sem. fœnic. anis. ā 3j. rasur. ebor. 3ij. cin-*  
*nam. 3j. incisa & contusa dentur ad sacculum ex sindone al-*  
*bo, cui mensura vini albi veter. affundatur, de qua alternis*  
*diebus 3vj. cum regimine diætæ sumantur. R. rad. polypod.*  
*3ß. contrajeru. acetos. ā 3ij. cort. tamaric. 3j. herb. hepatic.*  
*nobil. cichor. beton. ā Mj. flor. IV. cordial. ā Pj. coq. in aq.*  
*font. q. s. in colat. 1ß ij. infund. per noct. folior. senæ elect.*  
*3iijß. rhabarb. elect. 3ß. sem. fœnic. anis. ā 3j. mane bulliant*  
*parùm, cum colat. solve syrup. flor. persicor. 3iij. F. s. a. apo-*  
*zema, de quo alternis diebus 3ii cum regimine diætæ usurpen-*  
*tur. Porro de aqua nostra contra palpitationem*  
*cordis sæpe cochlear plenum sumpsit, cujus formu-*  
*la sequens est. R. cor cervinum in particulas incisum, ab-*  
*luatur*

luatur vino albo, adde radic. scorzonæ. ℥℞. contraierv. ℥iij. folior. hepatic. nobil. fragar. acetos. cichor. betonic. melissæ omnium recent. ā Mj. flor. IV. cordial. ā. Pi. croci opt. ℥ij. macis, cinamom. caryophyll. specier. diatrionsantal. ā ℥j. incis. & contus. affund. vini alb. veter. aq. rosar. borragin. bugloss. ā q. s. ut aliquot digitis emineat, infund. per aliquot dies, dein in B. M. destillentur. Aqua hæc contra palpitationem cordis à quacunque causa ortam utiliter conceditur.

## OBSERVATIO XCI.

### *Gravis auditus.*

**V**ir quadraginta annorum catarrhis obnoxius subito auditum in utraque aure perdidit, sic ut adstantium sermones, nisi alta voce clamaverint, percipere nequiverit, ad illum manè vocatus mox sequentes pilulas purgantes præscripsi ℞. extr. pilul. aurear. catholic. ā ℥℞. ol. salviæ gt. ij. F. pil. XI. deaurentur. vesperi cucurbitulæ cum scarificatione scapulis admotæ sunt. Secundâ die venæsectio in brachio dextro instituta fuit. Tertiâ die potiunculam purgantem usurpavit. ℞. folior. senn. elect. ℥iij. cremor. tartar. ℥j. semin. coriandr. præpar. frenic. ā ℥℞. aq. betonic. q. s. infund. per noct. mane bull. par. in colat. ℥iij. solv. elect. de succo rosar. ℥j. syr. fl. persicor. ℥j. aq. cinam. ℥ij. F. potiuncula purgans mane cum regimine diata sumenda. Quartâ die cucurbitulæ rursus scapulis admotæ fuerunt. Vesperi ut & sequentibus diebus suffitum per infundibulum usurpavit.

℞. radic.



*R̃. radic. ireos florent. ʒij. herb. abrotan. mar. majoran. calaminth. carduibened. absinth. ā Pj. flor. lilior. convall. lavendul. ā Ps. sem. anis. caryophyll. ā ʒj. incisa coq. in vino alb. q. s. pro suffitu. Quinto die errhinum præscripsi. R̃. succ. betæ recent. ʒiij. major. ʒij. aq. lilior. convall. ʒiij. misce. ex cujus usu continuato piritam per nares & palatum in magna copia excrevit. Sexto die aquam Plateri contra gravem auditum & tinnitum aurium apud nos commendatissimam consului. R̃. aq. ad auditum Plateri ʒß. vitæ cum castor. ʒij. succi majoran. recent. ʒj. misce: intingatur gossipium moschatum & auribus indatur. [ Formula aquæ ad auditum Plateri sequens est. R̃. radic. raphan. porri, capar. ā ʒj. cyclaminis ʒß. belleb. alb. ʒj. herb. siccar. origan. ʒiij. rutæ, majoran. ā ʒij flor. lavendul. sem. fœnic. cymmin. ā ʒj. baccar. laur. num. XV. contundantur omnia, ad. fell. vaccin. ʒj. vini alb. q. s. ut velut in pulvem redigantur, postea in B. M. destillantur. Formula aquæ vitæ cum castoreo talis est. R̃. herb. salv. meliss. rorisinarin. betonic rutæ ā Mß. nuc. moschat. Zingib. caryophyll. cardamom. cinamom. ā ʒij. castor. ʒiß. specier. diapliris archont. diamb. ā ʒj. opiat. aureæ Alexandr. ʒß. spir. vini rectific. ℥ iv. per aliquot dies infundantur, postea in B. M. destillantur. ] Succum majoranæ recentem aquæ Platerianæ addidi, quoniam Vir excellentissimus Osvaldus Grembsius lib. II. cap. I. §. X. refert, quod alicui surdastro post adhibita multa remedia solus succus majoranæ auribus instillatus amissum auditum restituerit. Ex usu hujus aquæ per aliquot dies continuatæ Ager auditum recuperavit & omnimodè convaluit. Interim ad recidivam præcavendam vere & autumnosequenti sacculo purgante usus fuit. R̃. radic. enulæ ʒiij. herb.*

*3iij. herb. betonic. major. salvia, carduibened. summit. absinth. ʒ Pj. folior. senn. elect. 3iib. agaric. rec. trochisc. 3B. rhabarbar. elect. 3ij. cremor. tartar. 3B. sem. anisi 3ib. coriandr. prepar. 3j. incisa dentur ad sacculum ex sindone albo, cui mensura vini albi veter. affundatur, de qua alternis diebus uncia sex cum regimine diætæ bibantur. Cæterum in gravi auditu tollendo, dum praxin medicam exerceo, præter aquam Platerianam sequentium remediorum felices effectus etiam observavi. R̄. succ. recent. major. ruta ʒ 3B. sem. cumin. 3j. colocinth. 3B. F. decoctio in vino rubro & ol. amygdal. amarar. usq; ad vini consumptionem, postea exprimantur & gossipium moschatum succo intinctum auribus indatur. R̄. folior. organ. salviæ, majoran. ʒ MB. flor. stæchad. lavendul. ʒ Pi. cinamom caryophyll. ʒ 3ij. coq. in vin. alb. q. s. colaturâ foveatur auris affecta cum spongia mane & vesperi. R̄. ol. amygdalar. amarar. 3j. castor. 3j. radic. hellebor. alb. gr. xv. spir. vini 3B. ol. destillat. fœnic. carui ʒ 3B. bulliant lento igne ad spiritus vini consumptionem, colaturâ intingatur gossipium moschatum illudq; auribus indatur. R̄. radic. cyper. sem. cumin. anisi, baccar. junip. ʒ 3j. castor. ʒi. F. pulvis, quo impleatur cæpe magnum excavatum, quod postea supra prunas coquatur succusq; exprimatur, quo gossipium moschatum intingatur & auribus indatur. In gratiam juniorum Medicorum diversas remediorum formulas proposui, rectè enim monet Tulpius lib. IV. observat. medicar. XVI. Plurima gravis auditus sunt remedia, neque semper VNI obtemperat, sed ex deterfo ritè tympano & infuso liquore flatus discutiente maximum plerunque emolumentum percipitur: nihil utilius est urina leporina sive seorsim sive cum spiritu vini auribus calidè instillata, cujus frequentior usus multis opitulatus*

fuit, & præcipuè cuidam proxenetæ *Ambstelredamen-*  
*fi*, qui eò surditatis jam devenerat, ut necesse foret,  
 palimpsesto vel chartæ inscribere, si quid illi verbis  
 communicandum esset.

~~~~~

## OBSERVATIO XCII.

*Pica.*

**P**armacopolæ Filius octo annorum ab ali-  
 quot mensibus picâ correptus fuit, cretam  
 & calcem muris abrafam avidè devoravit,  
 nullisque severis comminationibus à tali opere de-  
 terreri potuit. Pater ipsi vinum emeticum cum  
 croco metallorum paratum me suatore exhibuit.  
*R. croci metall. gr. iii. vin. alb. ℥j. infund. per noct. manè*  
*filtr. per chart. sumatur cum regimine diata: unde aliquo-*  
*ties per vomitum humores acidos, austeros & bi-*  
*liosus ejecit. Postea sequentem trageam præscripsi.*  
*R. sem. amios ℥j. cardamomi 3℔. spec. aromat. caryophill.*  
*3i. diaxyloal. 3℔. diacinam. ʒi. cornu cervi philosoph. præ-*  
*par. ʒii. rasur. ebor. 3j. corall. rubr. præpar. 3℔. sal. absinth.*  
*ʒj. sacch. opt. ʒiiij. F. s. a. tragea manè & vespèri usurpan-*  
*da.* His egregius iste puer à picâ liberatus fuit. Af-  
 fectum istum graviditas sæpius corripere, cum Viris  
 fide dignis in praxi medica aliquoties observavi.  
 Nota mihi est nobilissima Domina adhuc super-  
 stes, quæ graviditatis tempore triticum crudum  
 deglutivit, alia etiam nobilitatis stemmate inclyta  
 carbones arenamque comedit, & se in illis gratissi-  
 mum dulcorem experiri liberè confessa est. Sic Tul-  
 pius

*pius lib. II. observat. medicar. XXIV.* refert, quòd mulier  
*Daventriensis* prægñans tam impensè hælecibus salit-  
 tis delectata fuerit, ut ante partum mille ac qua-  
 dringentos comederit, ita *Consulis Amstelodamensis*  
*Filia* apud eundem *lib. IV. observat. medic. XXIII.* ad  
 satietatem fruita fuit cespite sulphureo ac plumbi  
 laminis minutatim concisis. *Forestus lib. XIIIX. obser-*  
*vat. medic. VII.* testatur, mulierem gravidam *Del-*  
*phensem* comedisse pellem ovillam cum lana, aliam  
*Alcmariensem* cochlearibus picem navalem exce-  
 pisle atque deglutivisse, nonnullas autem crudas  
 anguillas devorasse. *D. Casparus Theophilus Bierlingius*  
*tomo II. miscellan. medic. observat. CCIX.* de mu-  
 liere rusticâ recenset, illam prægñationis tempore  
 panem similagineum emptum in vas unguenta-  
 rium restionis intinxisse, & tam avidè comedisse, ac  
 si Malvaticò vino madefactum fuisset: de duabus  
 mulieribus *Dresdensibus* Idem refert, unam prima vi-  
 ce gravidam duodecim vivorum mullonum capita  
 devorasse, alteram verò cyprinum sive carpionem  
 vivum pondere unius libræ à capite usque ad cau-  
 dam comedisse. Nobilissimas Fœminas prædictas  
 à molestissimo hoc malo sequentibus remediis li-  
 beravi. Cùm illis propter periculum abortus cro-  
 cum metallorum in vino exhibere non licuisset, po-  
 tionem blandam purgantem præscripsi. *R̃. rhabarb.*  
*elect. ʒiij. herb. betonic. cardui bened. ʒi. Pi. cortic. arantior.*  
*sicc. ʒß. aq. cichor. q. s. infund. per noct. mane bull. par. in*  
*colat. ʒiii. solve syr. de cichor. simplic. cum rhabarb. ʒj. F. po-*  
*tio manè cum regimine diætæ sumenda.* Postea convenien-  
 tes rotulæ præscriptæ sunt. *R̃. spec. aromat. rosat. ʒj.*  
*diamargar. frig. ʒß. rasur. eboris ʒj. corall. rubr. præpar.*  
*ʒß. con-*

3ß. confect. alterm. incompl. 3i. sacch. opt. aq. cichor. solut. 3iiij. F. s. a. rotula pro lubitu usurpanda. Sæpe ante prandium aliquot amygdalas amaras ac nucleos persicos comederant, & vesperi ante cœnam scrupulum feminis amios in vino generoso usurparunt, in mensa autem capparibus & radicibus cichoreæ cum oleo & paucio aceto paratis magno cum fructu usæ fuerunt.



## OBSERVATIO XCIII.

*Phrenitis.*

**M**ercatoris Filius octodecim annos natus, febre, delirio & vigiliis inopinatè correptus fuit, vocatus cum illius faciem purpureo colore suffusam & oculos torvos nunc fixos nunc vagabundos conspexissem, ægerque delirans sæpius altâ voce clamasset, & è lecto dictorum factorumque immemor profiliisset, illum phrenitide afflictum esse Parentibus indicavi. Præmissio clystere statim vena in brachio dextro aperta fuit, R. rad. alth. 3j. folior. malv. violar. ā Mij. flor. nymph. Pij. sem. anisi 3ii. coq. in aq. font. q. s. in colat. 3x. solve elect. diacatholic. 3j. mell. violar. 3ß. F. clyster. Vesperi julepum usurpavit, R. aq. lactucæ, portulac. ā 3iiij. syr. berber. 3ij. spir. vitriol. gt. vj. F. julepus pro duabus dosibus. Secunda die venam in brachio sinistro aperire jussi, & julepum pro quatuor dosibus præscripsi. R. aq. cichor. acetos. ā 3vj. syr. citri 3iiij. spir. vitriol. gt. vj. F. julepus. Tertio die, cum delirium maximè urgeret, frontale & po-

& potiuncula somnifera præscripta fuit. R. aq. rosar. nymphaeæ, plantagin. lactuc. ā ʒiij. aceti rosat. ʒiβ. F. frontale. R. syr. papav. alb. simplic. ʒj. aq. nymphaeæ ʒβ. F. potiuncula, sumatur horā somni. Quarto die venæsectio repetita & vesperi emulsio concessa fuit. R. amygdal. dulc. recent. excorticat. ʒj. sem. cucumer. melon. recent. excorticat. ā. ʒβ. papav. alb. ʒij. aq. nymphaeæ; lactuca, papaver. erratic. ā ʒiij. sacchar. rosat. tabul. ʒβ. F. emulsio pro tribus dosibus. Quinto die ob incendium febrile carpis & cordi epithema appositum, nec non electuarium refrigerans præscriptum fuit. R. aq. rosar. fragrant. ʒiiij. violar. acetos. ā. ʒj. aceti rosat. ʒiβ. spec. cordial. ʒii. F. epithema. R. conserv. rosar. rubr. ʒiβ. citri ʒvj. roob ribium ʒj. spir. vitriol. gt. x. syr. berber. q. s. F. electuarium, de quo ad libitum magnitudo nucis moschate concedatur. Sexto, septimo, octavo, nono & decimo die præcedentes julepi, emulsiones & horā somni bis potiunculæ somniferæ repetitæ fuerunt. Undecimo die febris remisit, ratiocinatio rediit, præscriptâ potiunculâ purgante blandâ ægro valedixi. R. folior. senæ elect. rhabarb. elect. ā ʒij. cremor. tartar. ʒj. sem. anisi ʒβ. aq. endiv. q. s. infund. per noct. manè bulliant par. in colat. ʒiij. solve syr. rosat. solut. simplic. ʒj. F. potio purgans manè cum regimine diætæ sumenda. Per totum morbi decursum victu tenui, refrigerante, jusculis borragine, acetosâ, lactucâ & endiviâ alteratis usus est, ac pro potu ordinario vel tincturam rosarum aut aquam divinam sequenti modo paratam bibit. R. flor. rosar. rubr. ʒiij. aq. font. lb̄ iiij. bulliant par. colatur ad. julep. rosat. ʒiij. sacchar. opt. ʒij. spir. vitriol. q. s. ad gratam aciditatem. R. pomum citri, incidatur minutim, aq. fontan. lb̄ iiij. infundantur per aliquot horas,

Q

colen-

colentur & exprimantur, ad sacch. opt. ℥ij. spir. vitrioli q. s. ad gratam aciditatem. vel ℞. succi citri recent. ℥iiij. sacch. opt. ℥ij. aq. font. ℥b iiij. F. s. a. aqua divina.

## OBSERVATIO XCV.

*Mania.*

**M**onachus annos triginta natus, calido & sicco temperamento præditus, sanguine abundans, posteaquam noctes aliquot insomnes transegisset, inopinatè Symmystis suis corpore ferociente commentitias fabellas protulit, & blateravit inania verba, paulo post oculis toruis vestem religiosam dilaceravit, & omnes Cœnobii angulos horrendo ejulatu pervagatus, ipsosque symmystas tanto cum animi furore & corporis vigore aggressus est, ut quatuor robusti Viri illum vix ac ne vix coercere potuerint. Primâ die scrupulum dimidium extracti hellebori nigri usurpavit, quod in aquâ borraginis solutum concessi, unde per superiora & inferiora humores à bile corruptos copiosè dejecit: vesperi ad furorem demulcendum epithema frontale præscripsi. ℞. aq. rosar. ℥iiij. nymphae ℥ii. nitri præpar. ʒj. opij Di. sacch. ℥b. camphora gr. v. F. epithema frontale cum linteis complicatis tepidè admovendum. Secundo die manè vena in brachio & vesperi in pede sinistro ad pollicem excurrrens aperta fuit. Tertio die vinum emeticum ex scrupulo dimidio croci metallorum paratum sumpsit, unde rursus *ἄνω τε καὶ κάτω* supra & infra purgatus fuit.

fuit. Sub vesperam pro conciliando somno emul-  
 sionem usurpavit. R̄. *semin. cucum. melon. rec. excort.*  
 ā 3i℔. *papav. alb. 3ij. aq. nymph. 3iij. borragin. 3i. sacch.*  
*rosat. tab. 3ij. F. emulsio.* Quarto die vena in brachio  
 dextro aperta fuit: vesperi ad vigilias arcendas li-  
 nimentum præscripsi. R̄. *unguent. alabastr. 3iij. popu-*  
*leon. 3ij. opij ʒ℔. ol. nymph. q. s. F. linimentum,* quo horā  
*somni frons & tempora inungantur.* Quinto die salva-  
 tella in manu aperta fuit. Sexto die vinum eme-  
 ticum cum *Ἀποεῖα* rursus concessi, septimo die  
 apertionem venæ frontis consului. Pro potu ordi-  
 nario bibit decoctum C. C. cujus cyatho pleno sy-  
 rupus aperitivus *Mindereri* juxta *Zuelferum* correctus  
 cum aliquot guttis spiritûs nitri commixtus fuit.  
 Ex usu horum remediorum furor cessavit, & ratio-  
 cinatio rediit. Ad recidivam inhibendam singulis  
 mensibus pilulas convenientes usurpavit. R̄. *extract.*  
*pilular. tartarear. Quercetani ʒii. catholic. 3℔. helleb. nigr.*  
*ʒj. mercur. dulc. ʒij. mag. radic. jalap. ʒj. ol. majoran. gt.*  
*viii. misc. diligenter, forment. pilul. ex ʒj. num. xiiij. deau-*  
*rentur & conspergantur pulvere cinam. dosis est. xiii.* Tem-  
 pore verno sacculum & autumnali apozema pur-  
 gans consului. R̄. *rad. polypod. 3iij. cort. tamar. 3ij. herb.*  
*betonic. scolopendr. veronic. carduibened. summit. centaur.*  
*min. flor. borragin. ā. Pi. folior. senæ elect. 3ii. radic. helleb.*  
*nigr. præpar. 3iij. sem. pæon. excort. 3j. anis. 3i℔. cremor.*  
*tartar. 3℔. cinam. 3j. incisa & contusa dentur ad sacculum*  
*ex sindone albo, cui ℔ iiiij. vini albi veteris affundantur, & e*  
*cujus colaturâ mane alternis diebus cum regimine diætæ uncia*  
*sex sumantur: quo potu finito vena in brachio dex-*  
*tro aperiatur. R̄. radic. polypod. 3℔. cort. tamaric. 3ij.*  
*herb. ceterach, cuscuta, agrimon. chamadr. ā M℔. flor. bor-*



ragin. Pi. sem. anisi ʒiʒ. pæon. excortic. ʒj. coq. in aq. font. q. s. in colat. ʒiʒ. infund. per noct. folior. senæ elect. ʒij. radic. helleb. nigr. præpar. ʒiij. manè bulliant parùm in colaturâ solvæ syr. ros. sol. simplic. & flor. persicor. ā ʒiij. F. s. a. apozema, de quo alternis diebus manè uncia tres cum regimine diatæ usurpentur: hoc finito vena in brachio sinistro aperienda est. Intermedio tempore electuarium & rotulas convenientes usurpavit. R. conserv. rosar. rubr. ʒj. borragin. bugloß. ā ʒʒ. citri ʒij. confect. alkerm. hyacinth. ā ʒʒ. spec. diamargar. frig. ʒij. marchion. ʒj. syr. cort. citr. q. s. F. electuarium de quo magnitudo nucistæ sumatur. R. confect. alkerm. ʒiij. spec. latifcantis Galeni, diamargar. frigid. de gemmis frigid. ā ʒj. sacchar. opt. aq. rosar. & borrag. solut. ʒvj. F. s. a. rotula pro lubitu usurpandæ. Quod in debellando hoc affectu toties ægro venam aperiri mandaverim, ansam mihi præbuit Platerus lib. I. prax. med. cap. III. asserens, innumeros per repetitas venæsectiones sanitati restitutos fuisse à Chirurgis quibusdam & aliis, qui ex professo hisce morbis tollendis operam dabant, & vigesies imò sexagesies venas tundendo insanos ita restituebant, ut postea incolumes longam vitam vixerint: hi in venâ certâ eligendâ non laborant, sed nunc brachii, mox pedis, nunc alterius partis venam sine discrimine aperiunt. Quod remedii genus monitore Platero etiam nos, sed majori curâ & prudentiâ, quàm illi qui non nisi tanquam deploratos curandos suscipiunt, methodicè internixtis purgationibus usurpare, minimeque negligere debemus: itaque vena brachii magis patens primùm aperienda, dein salvatella in manu secunda erit; etiam in pedibus vena malleoli saphenadietâ, si menses non rectè

rectè fluant, vel quæ ad pollicem pedis excurrit, utiliter aperitur : quando malum perseverat, & si causa præcipuè circa caput latere deprehenditur, apertio venæ frontis maximè prodest.



## OBSERVATIO XCV.

*Peripneumonia.*

**M**ercator quadraginta annorum post mediam noctem intenso calore universum corpus pervagante correptus fuit, cum manè vocatus febrim continuam acutam, tussim siccam, difficultatem respirationis summam cum suffocationis metu, genarum & faciei ruborem, sitim vehementem & pulsum magnum in illo observassem, inde ægrum peripneumoniâ laborare satis superque collegi. Statim vena in brachio dextro magis conspicua aperta & postea clyster injectus fuit. *℞. radic. aleb. ℥i℔. herb. scabios. farfar. violar. malv. ā Mj. flor. papav. rhead. Pi. sem. anis. ℥ij. coq. in aq. font. q. s. in colat. ℥viij. solv. mell. violar. ℥ij. elect. diacatholic. ℥i℔. F. clyster.* Ad ardorem febrilem & sitim mitigandam sequenti decocto usus fuit. *℞. radic. acetos. ℥iij. liquir. ras. ℥j. C. C. ussi ℥ij. aq. font. q. s. coq. in colat. ℔ iiij. solve syr. violar. purpur. & papav. erratic. ā ℥vj. spir. sulphur. q. s. ad gratam aciditatem: misce pro potu ordinario.* Vesperi ad promovendam materiæ concoctionem, febris mitigationem & virium robur conservandum julepus & aqua cardiaca præscripta fuit. *℞. aq. farfar.*

*farfar. papav. erratic. cichor. ʒij. syr. violar. purpur. granat. papaver rhead. ʒj. F. julepus pro duabus dosibus. R. aq. cardia. officin. nostr. ʒij. scabios. papav. rhead. farfar. ʒj. margarit. præpar. ʒj. F. aqua cardiaca. Secundo die venæsectio in brachio sinistro instituta fuit: vesperi ut calor febrilis mitigetur & concoctio humorum promoveatur, emulsionem usurpavit. R. amygdal. dulc. rec. excort. ʒʒ. sem. cucum. melon. rec. excort. ʒij. aq. farfar. ʒiij. cichor. papav. rhead. ʒʒ. sacch. rosat. tab. ʒii. F. emulsio pro duabus dosibus. Tertiâ die Ager liberius respiravit, & sputa subflava, striis sanguineis mixta, excrevit, inde syrupos sequentes præscripsi. R. syr. farfar. jujubin. papav. rhead. ʒj. aq. scabios. ʒʒ. misce, sumatur cochlear. plenum pro lubitu. Quarto die cum febris adhuc urgeret, alvusque adstrictior esset, julepum & clysterem consului: R. aq. farfar. cichor. papav. rhead. ʒij. syr. granator. ʒj. ribium papav. rhead. ʒʒ. spir. sulphur. gt. viii. F. julepus, cujus altera portio ante clysteris injectionem, altera post ejus operationem sumatur. R. radic. acetos. ʒi. herb. violar. endiv. malv. ʒ Mij. flor. sambuci Pi. sem. anis. ʒii. coq. in colat. ʒviii. solve mell. rosat. ʒii. electuar. lenitiv. ʒj. ol. violar. ʒi. F. clyster. Quinto die julepus præcedens reperitus fuit. Sexto die emulsionem prædictam usurpavit. Septimo die cum majorem humorum concoctionem in sputis animadverterem, conveniens electuarium & rotulas præscripsi. R. conserv. rosar. rubr. ʒʒ. violar. ʒʒ. betonic. ʒij. spec. diatrag. frigid. ʒii. ocul. cancr. præpar. ʒj. syr. farfar. jujubin. ʒ. q. s. F. electuarium, de quo ad lubitum magnitudo nucistæ sumatur. R. spec. diatragac. frig. ʒij. ocul. cancr. præpar. ʒij. confect. alkerm. ʒj. sacch. opt. aq. farfar. solut. ʒiij. F. s. a. rotula pro beneplacito usurpanda. Octavo die ad humores noxios*

xios blandè per alvum evacuandos potiunculam purgantem præscripsi. R. folior. *senæ elect.* ʒiij. *tamiz-rindor. recent.* ʒij. *agaric. rec. troch.* ʒj. *sem. anisi ʒij. tremor. tartar.* ʒj. *aq. farfar. cichor. ʒq. f. infund. per noct. manè bulliant par. in colat.* ʒiii. *solv. manna Calabr. elect. colat.* ʒß. *aq. cinam.* ʒij. F. potio purgans manè cum regimine diætæ usurpanda. Nono die cum omnia symptomata remitterent, Ægro valedixi.



## OBSERVATIO XCVI.

*Icterus niger.*

**S**acerdos Episcopatus *Basiliensis* propter valetudinem adversam me vocavit, qui de universâ vitium jacturâ, appetitu ad quemcumque cibum prostrato & aggravante præcordiorum compressione mihi conquestus fuit; cum præterea in illo febrem lentam, contumacem alvi constipationem, colorem in oculis, facie reliquisque corporis partibus flavum & subnigrum ac urinam nigram observassem, Ægrum ictero nigro correptum esse, Matri & Sororibus præsentibus indicavi. Inspecto abdomine, quum in hypochondriis nullam duritiem advertere potuerim, ægro animum addidi indicando affectum nondum, uti adstantes sibi imaginantur, ultima minari, chronicum quidem longas post se trahere moras, sed medicamentis potentioribus adhuc profligari posse, modò in remediis usurpandis exactam diligentiam teneat,

atque æger Medici jussis obtemperet æquis. Ante omnia convenientem sacculum purgantem præscripsi. ℞. radic. polypod. ℥℞. cort. tamaric. ℥ij. herb. scolopendr. fragar. carduibened. summitat. centaur. minor. absinth. ā Pi. folior. sena elect. ℥ij. cremor. tartar. ℥℞. radic. helleb. nigr. prapar. ℥ij. sem. anisi ℥i℞. rasur. eboris ℥ij. cinam. ℥j. incisa dentur ad sacculum ex sindone albo, cui asfundantur vin. alb. veter. ℥iij. aq. chelidon. ℥bj. de colatura sumantur manè uncia sex cum regimine diata. Contra contumacem alvi adstrictionem prunis laxantibus usus est. ℞. Folior. sena elect. ℥i℞. cremor. tartar. ℥℞. sem. anisi fœnic. ā ℥i℞. aq. cichor. borragin. ā q. s. infund. per noctem, manè cum colat. sufficiente coq. par. prunor. recent. efficat. ℥iij. ad. sacch. opt. ℥ii. aq. cinam. ℥j. F. s. a. pruna laxativa, de quibus quinque cum aliquot cochlearibus brodia plenis horâ ante cœnam sumantur. Cùm ab usu horum remediõrum Æger meliusculè se haberet, præmisso clystere apozema sequens usurpavit. ℞. radic. alth. ℥j. bryon. ℥℞. herb. scolopendr. malv. centaur. min. absinth. ā Mj. flor. chamam. melilot. ā Pi. folior. sena elect. ℥i. radic. helleb. nigri prapar. ℥iij. coq. in colat. ℥x. solve elect. benedict. laxat. ℥j. hier. picr. Logad. ℥℞. ol. cappar. ℥j. F. clyster: qui aliquoties repetitus fœces nigras carbonibus similimas eduxit. ℞. radic. fœniculi ℥j. polypod. apii ā ℥℞. cort. cappar. tamaric. dulc. amar. ā ℥ij. herb. hepatic. nobil. cichor. beton. agriman. ā Mj. flor. borragin. bugloss. genist. ā Pj. tamarind. recent. ℥ii. sem. anis. ℥i℞. pœon. excort. ℥℞. cinam. ℥j. coq. in aq. font. q. s. in colat. ℥i℞. infund. per noct. folior. sena elect. ℥i℞. rhabarb. elect. ℥℞. radic. hellebor. nigr. prapar. ℥ij. manè bulliant par. in colat. solve syrup. rosat. solut. simplic. & flor. persicor. ā ℥iij. F. s. a. apozema, de quo alternis diebus manè uncia tres cum regimine diata

diata usurpentur: hoc excrementa croco & atramento similima copiosè eduxit, ita ut æger cibum sensim appetere & vires recolligere inceperit. Cùm obstructions hypochondriorum nondum sublata viderentur, electuarium & rotulas ex croco martis aperiente paratas commendavi. *R. croci mart. aperient. ʒj. spec. aromat. rosat. ʒj. cinam. mac. santal. rubr. ʒi. ol. nucista gt. vj. caryophyll. gt. iiij. mell. despumat. & sacchar. alb. ʒ q. s. F. s. a. electuarium: vesperi aliquot horis ante cœnam quinque aut sex rotulas usurpavit, R. croci martis aperient. ʒß. confect. alkerm. ʒij. spec. aromat. ros. ʒj. sacch. opt. aq. chelidon. & rosar. sol. ʒiiij. ol. cinam. macis ʒ gt. iij. F. s. a. rotula. Remediis istis usurpatis denuo reliquias humorum noxiorum per *expansiv* eduxi. *R. extr. pilular. tartarear. Quercet. ʒij. catholic. ʒß. gutt. gamandr. ʒj. extr. ammoniac. Quercetan. ʒß. helleb. nigr. prepar. ʒij. absinth. ʒj. ol. macis gt. vj. anisi. gt. iiij. cinam. gt. ij. misce diligenter, formantur pilula ex ʒj. num. xviii. deaur. & conspergantur pulvere cinamomi: de istis pilulis qualibet septimanâ bis novem sumpsit, unde appetitus ciborum rediit, gravans præcordiorum dolor cessavit, urina clara naturali similis apparuit, colorque faciei flavus & subniger evanuit. Ad recidivam præcavendam jussi illum vere & autumnopozema vel sacculum purgantem usurpare: tempore vindemiali vinum medicamentosum ex musto recente vini albi paratum fuit. *R. radic. apij, fœnicul. enula ʒ ʒiiij. cort. tamaric. ʒij. cappar. ʒj. herb. betonic. hepatic. nobil. scolopendr. chamædr. carduibened. chelidon. maj. ʒ Mvj. centaur. min. absinth. ʒ Miiij. concisis XL. mensur. ex musto recente vini albi affundantur: quod si deferbuerit, de illo cyathum plenum***

num manè & in prandio pro primo haustu evacua-  
re conducit.

~~~~~

## OBSERVATIO XCVII.

### *Renum hæmorrhagia.*

**M**ercator quadraginta annorum plethori-  
cus, dum manè è lecto surgeret, sanguinem  
copiosum cum urinâ sine dolore reddidit,  
& ex inopinato hujus sanguinis effluxu conster-  
natus me vocavit. Indicavi ægroto apertionem  
vasorum in renibus factam esse à sanguine fervido;  
qui vasorum oscula dilatarit, unde sanguis in sinus  
renum effusus per ureteres in vesicam manavit &  
cum urinâ excretus fuit. Statim venam in brachio  
dextro aperire jussi: ad vasorum laxitatem leniter  
constringendam regio renum linimento inuncta,  
& emulsio conveniens præscripta fuit. *R. unguent.*  
*Comitiss. santalin. ʒiij. albi camphorat. rosat. Mesue ʒij.*  
*sacch. ʒj. camphor. ʒss. ol. nymph. q. s. F. linimentum.*  
*R. amygdal. dulc. recent. excortic. ʒss. semin. papav. alb. ʒii.*  
*aq. plantagin. ʒiij. bursapastor. ʒj. sacch. rosat. tab. ʒij. C. C.*  
*philos. prepar. ʒj. F. emulsio pro duabus dosibus.* Frequen-  
ter etiam de sequenti aquâ cochlear plenum sum-  
psit: *R. aq. cardiac. officinal. ʒiʒ. plantagin. bursapastor.*  
*polygon. ʒj. boli armen. ver. ʒii. lapid. hamatit. prepar. ʒj.*  
*confect. alkerm. ʒj. misce.* Pro potu ordinario deco-  
ctum C. C. & emulsionem amygdalinam bibit.  
Secundâ die, ut sanguis à sero & bile acriori eva-  
cuetur, potionem blandam purgantem usurpavit.

*R. Ta-*

℞. Tamarindor. rec. ℥iij. rhabarb. elect. ℥ij. crem. tartar. ℥j. sem. anisi ℥℔. aq. cichor. q. s. infunde per noctem, manè bulliant parùm, in colat. ℥iii. solve syr. flor. persicor. ℥j. aq. cinnam. ℥ii. elect. de succo rosar. ℥i. F. potio purgans manè cum regimine diætæ sumenda. Tertiâ die manè remedium usurpavit, quod Forestus lib. XXIV. observat. medic. XIII. maximè commendat. ℞. Lact. ovill. ℥iiii. boli armen. ver. pulv. ℥j. misce, sumatur tepidè. ℞. aq. polygon. bursæpastor. ā ℥iij. syr. plantagin. ℥i℔. berber. ℥j. F. julepus pro duabus dosibus. Quinto die pulverem convenientem in tribus dosibus cum aquâ plantaginis sumpsit. ℞. corall. rubr. præparat. bol. armen. ver. ā ℥j. C.C. philosoph. præpar. lapid. hematit. præpar. ā ℥℔. F. pulvis. Quinto die scrupulum trochiscorum Gordonii in pulverem redactorum cum aquâ bursæpastoris usurpavit. Sexto die trochiscorum de carabe drachmam dimidiam in aquâ plantaginis concessi, quo remedio Christophorus à Vega lib. III. de arte medend. sect. IX. cap. I. familiarem in collegio S. Bernhardi sanguinem sincerum cum urina reddentem sanitati restituit. Septimo die syrupum convenientem præscripsi: ℞. radic. alth. ℥i. liquir. ras. tormentill. ā ℥℔. consolid. maj. bistort. ā ℥ij. herb. plantag. Mii. heder. terrestr. veronic. betonic. agrimor. ā Mj. flor. 4. cordial. balaustior. ā Pi. sem. 4. frigid. major. ā ℥i℔. anisi ℥j. jujubar. recent. par. XX. coq. in aq. font. q. s. ad. sacch. F. syrupus: de quo sæpius aliquot cochlearia plena sumantur. Octavo die cum urina naturali similis apparuerit, Ægro valedixi. Ad recidivam præcavendam prædicto syrupo & sequentibus rotulis ac tragea usus fuit. ℞. confect. alkerm. ℥ii. spec. diatrion santal. ℥i℔. boli armen. ver. trochisc. gordonii pulv. ā ℥j. corallor. rubr. præpar. ℥ii. sacchar. opt. aq. rosar. sō-



*far. solut. ℥iij. F. s. a. rotula. R. spec. diarrhod. abbat. ℥ii. corallor. rubr. preparat. ℥i. trochisc. de carabe pulv. 3℔. lapid. hamatit. preparat. C. C. philos. preparat. ā 3j. sacchar. rosat. tab. ℥iiii. F. s. a. tragea. Ex usu horum remediorum usque ad hunc diem ab omni renum hæmorrhagiâ liber fuit.*



## OBSERVATIO XCIIIX.

*Renes exulcerati.*

**V**Ir quadraginta annorum è celebri familiâ natus, cum per tres dies materiam purulentam cum urinâ sine dolore reddidisset, me vocavit, & inter alia retulit, se per aliquot temporis spacium in lumbis dolorem cum gravitate percipere, & nunc à tribus diebus verum pus urinæ permixtum emittere. Indicavi ægro, me ex omnibus signis fatis superque colligere, aliquam in renibus exulcerationem sublatere. Primâ die purgationem blandam præscripsi. *R. conserv. rosar. rubr. 3℔. mag. rad. jalap. gr. xij. sacch. q. s. F. bolus purgans cum regimine diata sumendus. Pro potu ordinario sequens decoctum bibit. R. rad. china recent. 3℔. liquir. ras. ℥ii. lign. sassaf. ℥iiii. sem. anisi 3j. jujubar. rec. par. vj. incisa coq. in aq. fout. ad t̄b viij. colat. ad sacch. opt. ℥ij. misce. Secundâ die emulsionem detergentem sumpsit. R. amygdal. dulc. recent. excort. 3℔. sem. cucum. melon. rec. excort. ā 3ij. papav. albi 3j. aq. malva 3vj. sacch. rosat. tab. 3ij. ocul. canet. preparat. 3j. F. emulsio pro duabus dosibus. Regio te-*

gio renum convenienti linimento tepidè inuncta fuit. R̄ unguent. alb. camphorat. ℥℔. refriger. Gal. rosat. Mesue ā ℥iij. diapompholyg. ℥ij. sacch. ℥. ℥ii. camphor. ℥℔. ol. hypericon. q. s. F. linimentum. Tertio die syrupos præscripsi, de quibus sæpe aliquot cochlearia plena sumat. R̄ syr. alth. Fern. ℥ij. jujubin. liquirit. ā ℥j. aq. malua ℥℔. misce. Quarto die majoris deterfionis causa pilulas & julepum consului. R̄ Terebinth. opt. cum aq. plantagin. coct. ℥j. trochisc. gordon. & alkekeng. pulv. ā ℔. misce diligenter, formentur pilula ex ℥j. num. xv. pro dosi & sumantur hora ante cœnam. R̄ aq. malua ℥vj. veronic. heder. terrestr. ā ℥i℔. syr. alth. Fern. ℥ij. jujub. julep. rosat. ā ℥i. spir. salis gt. vj. F. julepus pro tribus dosibus. Quarto die quum pus in minore quantitate cum urinâ excerneret, rotulas & electuarium præscripsi. R̄ spec. diatragac. frig. ℥ij. corall. rubr. præpar. oculor. cancr. præpar. ā ℔. C. C. philosoph. præpar. ℥j. sacch. opt. aq. rosar. solut. ℥iij. F. s. a. rotula pro lubitu usurpanda. R̄ conserv. rosar. rubr. ℥i. violar. ℔. radic. symphyt. cond. cichor. cond. ā ℥iij. ocul. cancr. præpar. ℥ii. boli armen. ver. ℥i. syr. alth. Fern. q. s. F. s. a. electuarium. Sexto die jussi illum per octiduum manè trochiscorum Plateri contra exulcerationem renum & vesicæ commendatorum scrupulos duos in lacte caprino sumere. [Formula excellentium horum trochiscorum talis est. R̄ nucleorum & medulla sequentium seminum & fructuum exco-  
 ticatorum recentium, ut sunt amygdalarum dulcium, avellana-  
 narum, pistaciorum, pinearum ā ℔. amygdalarum amara-  
 rum, persicorum cerasor. ā ℥ij. castanear glandium, cucurbit.  
 ā ℔. melon. ℥ii. hordei mundat. oryza mundat. ā ℥iij. radic.  
 consolid. ℥ij. glycyrrhiza ℔. flor. rosar. rubr. baolaustior.  
 sem. portulac. lactuc. endiv. psyllii, lini, gossipii, cydonior.  
 malva,

maluæ, altheæ, myrti, coriandr. alkekengi, anisi, apii, petroselin. ā 3j. sem. papaver. alb. 3℔. hyoscyam. 3ii. ossa dactylor. n. v. gummi cerasor. prunor. ā 3ij arabici, tragacanth ā 3j. terebinthina vera 3℔. thuris, succini ā 3j. succi glycyrrhizæ, amyli ā 3ij. acaciæ, hypocistid. ā 3i℔. sanguin dracon. 3℔. opij 3j. boli armen. terræ sigill. ā 3vj. corall. rubr. lapid. osteocoll. oculor. cancr. ā 3ij. spodij 3j. santal rubr. ℥ii. sacchari candi & perid. ā 3i. F. pulvis. cujus dosis a 3℔. ad 3j. per se vel in aquis appropriatis. Ne citò corrumpatur ad. sacchar. 3x. & cum aqua maluæ fiant tabellæ aut cum infusione gummi tragacanthi recente parentur trochisci] Cum per septimanam hujus remedij usum Æger continuasset, urina ab omni pure vacua apparuit, unde prædictis tabulis sive trochiscis Platerianis ad recidivam præcavendam manè & vesperi diligenter usus fuit.



## OBSERVATIO XCIX.

*Dolor ischiadicus.*

**M**ercator quadraginta annorum cum è nundinis Bernensibus domum rediret, acerbissimum dolorem in dextrâ regione ossis sacri passus fuit, qui dum in femur, tibiam & extremum pedem se extenderet, dolorem ischiadicum esse pronunciavi, rectè enim Hippocrates in libro de affectionibus §. XXX. asserit. ἰχιάσονται ῥῆνται, ὁ δὲ ὤνη λαμβάνει ἐς τὴν πρόσφυσιν & ἰχίον ἐς τὸ γαστόν, τέλει δὲ καὶ διὰ παντὸς & σκέλει κλαίεται ἡ δὲ ὤνη. Coxendium morbus quum fit, dolor corripit coxæ juncturam & summōs nates ac coxen-

coxendicem, tandem etiam per totum crus dolor vagatur. Sub vesperam vocatus clysterem in dolore coxendico familiarem præscripsi. *Rj. radic. bryoniae. ʒj. altheæ ʒß. herb. betonic. chamadr. chamæpith. malv. ā Mj. flor. chamam. melil. ā Pj. semin. lini. ʒß. anisi ʒii. pulp. colocynth. in nodulo ligat. ʒj. coq. in aq. font. q. s. in colat. ʒx. solve mell. rorisinar. ʒiiij. elect. benedict. laxat. ʒj. terebinth. cum vitello ovi solut. ʒiiij. F. clyster.* Noctu ad doloris mitigationem laudani mei opiatum granum unum concessi. Pro potu ordinario sequens decoctum bibit. *Rj. radic. chinæ ʒvj. sarsaparill. ʒß. lign. sassafr. ʒiiij. coq. in aq. font. ad t̄b xij. colatura detur ad usum.* Secundâ die potiunculam purgantem usurpavit, vomitorium enim propter respirationis difficultatem præscribere non audebam. *Rj. folior. senn. elect. ʒiiij. agaric. rec. trochisc. ʒi. rhabarb. elect. ʒß. sem. anisi ʒi. cremor. tartari ʒii. aq. cichor. betonic. chamæpith. ā q. s. infund. per noctem, manè bulliant parùm, in colat. ʒiii. solve elect. de succo rosar. ʒi. syr. flor. persicorum ʒß. aq. cinam ʒij. F. potiuncula purgans.* Tertio die ad revulsionem vena in brachio dextra aperta fuit: noctu ob ferociam doloris grano laudani mei ususest. Quarto die, cùm in sanguine emisso ac universo corpore magnam humorum pituitosorum & biliosorum copiam advertissem, sequentem bolum purgantem præscripsi. *Rj. conserv. rosar. rubr. ʒi. mercur. dulcis ver. ʒj. diagrid. gr. viij. cum saccharo fiat bolus manè cum regimine diate sumendus: ex hujus remedii mercurialis usu multoties dejecit & manifestum levamen percepit.* Quinto die manè vena ischias in pede aperta fuit: vesperi potiunculam sudoriferam usurpavit. *Rj. aq. betonic. ʒi. mithrid. opt. ʒi. misce.* noctu propter contumaciam

ciam doloris granum laudani mei opiat conceffi. Quinto die linimentum præscripsi, quo pars affecta quotidie bis, præmissâ aquâ sequenti, tepidè illinatur. R. aq. viâ cum castor. & mastich. in exercitat. de apoplex. §. XII. proposit. ā ʒiij. spirit. iuniper. cerasor. nigr. melissa ā ʒj. ol. destill. salvia ʒj. rorisinar. ʒß. misce. R. unguent. martiat. ʒiß. alth. Fernel. ʒj. ol. lumbricor. terrestr. ʒvj. vulpin. terebinth. ā ʒiij. castor. ʒij. olei destillat. de lateribus ʒi. succini ʒß. cera q. s. F. linimentum molle. Sexto die potiunculam sudoriferam & noctu granum laudani opiat mei repetiit. Septimo die electuarium nervoso generi amicum præscripsi. R. conserv. flor. betonic. ʒiß. major. lilior. convall. ā ʒß. meliß. cort. arantior. cond. ā ʒiij. mithrid. opt. ʒii. theriac. opt. ʒi. spec. marchion. ʒii. laud. opiat. nostr. gr. vj. syr. pæon. q. s. F. electuarium, de quo ad lubitum magnitudo nucistæ sumatur. Ab usu horum remediorum diligenti dolores mitigati sunt, quos tandem vesicatorium parti dolenti admotum sustulit. Rec. pulv. cantharid. ʒiß. euphorb. sem. sinapi. ā ʒß. fermenti & aceti ā q. s. E. s. a. vesicatorium. Ad recidivam præcavendam fonticulus in pede dextro inustus fuit, nec non vere & autumnosequentem potiunculam purgantem clystere præmissio usurpavit. R. radic. alth. ʒj. bryonia ʒß. herb. betonic. malv. chamædr. chamæpith. meliß. ā Mj. semin. lini ʒß. anis. ʒii. coq. in aq. font. q. s. in colat. ʒx. solv. mell. rorisinar. ʒii. elect. lenitiv. ʒj. hier. picr. Logad. ʒß. F. clyster. R. syr. ros. sol. compos. ex infus. senæ, agaric. & rhabarb. in exercitat. de apoplex. §. XI. proposit. ʒiß elect. de succo rosar. ʒij. aq. betonic. q. s. F. potiuncula purgans.

Inde ad hunc usque diem ab omni dolore  
coxendico liber vivit.

OBSER.



## OBSERVATIO C.

*Rarus Pulmonis affectus.*

**S**erenissimus & Celsissimus Princeps  
 CAROLVS FRIDERICVS  
 MARCHIO BADENSIS ET  
 HOCHBERGENSIS, &c. Dominus  
 meus clementissimus, mense præteriti anni  
 novembri *Basileam* appulit, ut propter pe-  
 riculosum affectum se curæ meæ concre-  
 deret. Ex mandato Principis ad consulta-  
 tionem vocatus fuit Medicus excellentis-  
 simus, *Dn. Johannes Jacobus Wepferus*, qui  
 posteaquam de Celsitudinis suæ affectu  
 mecum candidè & amicè contulisset, ani-  
 mum nostrum induximus, historiam mor-  
 bi consilio medico includere, quod à nobis  
 humiliter oblatum vultu sereno accepit  
 Princeps togâ & sago supra ætatem com-  
 mendatissimus,

*Stirpis grande decus columnen præ-  
 lustre Badensis,  
 Delicia invicti Caesaris, Orbis  
 amor.*

R

Affectus

**A**ffectus, de quo Serenissimus Princeps præcipuè conqueritur, est dyspnœa quædam cum molestissimâ tussi, quæ tum inprimis evenit, quando corpus aliquot passibus ambulando & acclivia scandendo movetur. Causa hujus mali proxima, seu morbus à quo pendet, tum nomen affectui impertiet, tum omnem curam & sollicitudinem Medicorum ad se trahet. Quoniam habitus corporis apud Serenissimum Principem consumitur, pulsus frequentior & celerior est, nec non manifestè purulentâ tussi ejiciuntur, supervacuum erit inquirere, num tubercula cruda vel lapilli in pulmonibus? anne verò catarrhi ad bronchia ruentes hujus mali Autores forent? quamvis fortè negari non possit, tubercula cruda hanc calamitatem præcessisse, & nunc catarrhos purulentæ per tussim ejectioni accedere, sæpe enim pauxillum puris, multo sputo pituitoso pellucido involutum, conspicitur, imò his diebus vidimus uvulam elongatam, & fauces rubicundas à sero acri, hæc loca alluente & exasperante. Potius operæ pretium erit indagare, unde pus hoc proveniat, an ab empyemate? num à vomica pulmonum peculiari folliculo vestita? an verò à substantiâ eorundem primùm induratâ & tandem suppuratâ? Empyematis latentis suspicionem movere posset pleuritis Serenissimum Principem mense Augusto *Anni c l o l o c L X X I I I.* affligens, quæ nec sputi ejectione, nec sudore, nec aliter judicabatur, nam ab illo tempore tussis & dyspnœa inceperunt, magis magisque increverunt & hucusque perdurârunt. Verùm licet hæc indicia  
suspicio-

suspicionem empyematis probabilem reddant, neutiquam tamen illud evincunt; nam Serenissimus Princeps à mense Augusto prædicti anni usque ad principium Aprilis *Anni c l o l c c L X X V.* obambulavit, equitavit, castra sequutus est & præliis interfuit, imò utcunque dyspnœa cum tussi post motum molestaret, illa tamen protinus cessavit, quando humi decubuit: adde quòd in pectore nullus unquam tumor apparuerit, & utriusque lateri situ etiam pumili incumbere valuerit, quæ tum præstare tanto temporis intervallo impossibile fuisset, quamprimum enim pus in cavitatem pectoris ex abscessu rupto stillare incipit, indies augetur, & sæpe brevi ad insignem copiam cumulatur, nisi exitus alicubi pateat, nam à congestâ puris colluvie pulmonum distensio impeditur & diaphragma deprimitur, unde summa respirandi difficultas vel orthopnœa subsequitur, & sæpe in pectore, ubi empyema est, tumor excitatur. Vomicam apud Serenissimum Principem intra pulmones potius latuisse, multa sunt, quæ fidem indubiam faciunt, nam à Septembri prædicti anni usque ad Aprilem *anni c l o l c c L X X V.* semper difficulter post motum respiravit, & quamvis multum ac vehementer tussiret, ne guttulam quidem puris eiecit, quod signum erat tum obstaculi cujusdam in pulmonibus, ob quod usu respirationis à motu aucto non sufficiens aër pulmones subire potuit, tum aliqujus irritaminis ad tussim inanem impellentis, hoc autem omnino vomicam fuisse inde manifestum evasit, posteaquam Serenissimus Princeps thermas *Aquigranenses* prædicto mense Aprili bibe-



re incepit, nam vomicâ hac per aquam calidam, atomis sulphureis imbutam, copiosius hauſtam, emollitâ, atq; poſt in itinere ruptâ, pus tam copioſè & affatim exſpuit, ut uno atq; altero quaſi rivulo propulſo protinus novum puris effluvi-  
um è pulmonum bronchiis fauces impleret, illudq; ſine magna tuſſi vel leviculo impulſu aut ſimplici ſcreatu ejiceret. Inſuper Sereniſſimus Princeps vomicâ hac maximam partem depletâ nondum finitâ curâ facilimè reſpiravit, adeo ut ſcalam concitato curſu ſcandere valuerit, quod ad hunc uſq; diem nondum licuit, unde firmiter credit, ſi poſt potum aquarum quieti vacaſſet, aut aliter valetudini ſuæ conſuluſſet, quin integram ſanitatem recuperaveſſet. Vomicae exordium præcipuè adſcribi poteſt potui frigide, æſtuate corpore, cui Sereniſſimus Princeps nimium indulſit: nam à potu frigida ſuperſtuo ſanguis ſubitò coagulatur, unde portiuncula ſanguinis grumoli intra veſiculas pulmonum ſubſiſtit: adde, quòd natura ſanguinem coagulatum & grumolum præſertim in partibus principibus peculiari folliculo quaſi circumvallare ſoleat, ne gravius damnum inferat, interim cum iſte ſanguis non moveatur, ille in pus convertitur, quod ſenſim augetur; cùm autem folliculi vaſis peculiaribus dotentur, ex illis perpetim aliquid ſtillat, ut ex indole omnium tumorum cum folliculis conſtat, qui ſæpe à minutiffimis exordiis ad inſignem magnitudinem excrescunt. An verò à menſe Aprilis *Anni* cl<sup>o</sup> Id<sup>o</sup> LXXV. uſq; ad diem quintum Novembris ſubſtantia pulmonum indurata & cavernoſa ſeu ſinuoſa evaſerit? vel ut uno verbo

verbo dicamus, num pulmones cum labiis duris exulcerati sint? indagationem seriam postulat, atque in hujus notitiâ rei cardo verti videtur. Tale vitium pulmonibus inesse minantur dyspnœa post absolutum thermarum potum rediens, tussis vehementissima, veri puris ejection, febris lenta pulsu se prodens, habitus macilentus, & lassitudo spontanea universalis: confirmant idem compages corporis valde gracilis, scapulæ alarum instar prominulæ, proclivitas ad febres intermittentes, continuas & malignas, quarum omnium vehementiam non semel Serenissimus Princeps expertus est. Licet autem talis in pulmonibus labes adsit, illa tamen nondum magna observatur, nam Celsissimus Princeps placidè dormit citra ullum stertorem aut sibilum inter respirandum, pumili situ utrique lateri pro lubitu incumbit, expergefactus manè parùm puris absque labore excernit, nec ad copiosiorrem ejectionem post somnum stimulatur, quod aliàs phthificis solenne est, postquam scilicet somni indultu aliquandiu à tussiendo quieverunt: insuper color faciei vividus est, benè appetit, non sitit, nec sudat, urina prorsus naturalis est cum laudabili sedimento, habitus non valde emaciatus, cutis nondum squalida & scabra, nec capilli defluunt vel à pastu corpus æstuat. Quæ cum ita sint, apud Serenissimum Principem ulcus detergendum ac consolidandum, & quoniam à pure inquinamenta sanguini immiscentur, quæ febrim consumentem efficiunt, ipsis occurrendum & tabes diligenter præcavenda erit. His indicationibus, DEO benedicente, congruis auxiliorum remediis satisfieri

R 3 posse

posse spem faciunt ætas juvenilis, temperantiæ amor, qui à primis unguiculis aquæ porum persuasit, omnesque animi motus ita compositi, ut nunquam nimii sint, & labes pulmonum nondum ad supremum gradum deducta: quomodo autem singulis satisfaciendum sit, sequens methodus docebit. Manè horâ sextâ detur remedium ulceri detergendo & consolidando conveniens, præscripta nempe aqua & electuarium antiphthiticum [Formula aquæ antiphthiticæ sequens est R<sup>x</sup>. radic. irios florentin. ℥℞. enula ℥ij. herb. scabios. pulmonar. veronic. bellid. minor. heder. terrestr. farfar. betonic. auricula-mur. hepatic. nobil. ā Mij. flor. bellidis minor. 4. cordial. pæon. papav. rhead. ā Piiij. sem. anisi, fœnic. urtica ā ℥ij. cinamom. elect. ℥i℞. caryophyll ℥ij. macis, nucisl. ā ℥j. hepar, cor & pulmonem cervinum & vitulinum recens, spec. diatrionsantal. ℥ij. diamb. diamosch. aromat. ros. ā ℥j. santal. citrin. ℥j. vini albi ℞vj. aq. scabios. farfar. ā ℞ij. cicbor. papav. rhead. cerasor. nigror. ā ℞ij. Destillentur s. a. Dosis sunt quatuor aut sex cochlearia plena pro lubitu. Formula electuarii anti-phthitici talis est. R<sup>x</sup>. radic. liquir. ras. ℥℞. tussilag. irid florent. ā ℥ij. herb. scabios. pulmonar. farfar. bellid. min. ā Mj. incisa coq. in aq. scabios. farfar. ad ℞ij. decoctum coletur atq. clarificetur, adde sacch. opt. q. s. denuo coq. ad consistentiam syrupi, cui admisce pulmon. vulp. præpar. ℥i℞. hepat. vulp. præpar. ℥℞. pulver. anonym. Augustar. ℥i℞. spec. diatrag. frig. diatr. simplic. ā ℥j. diatrionsantal. diamar-gar. frig. ā ℥℞. confect. alkerm. ℥℞. hyacinth. ℥ij. ol. anisi ℥j. syr. papav. alb. farfar. alib. Fern. ā q. s. F. electuarium, de quo ad beneplacium magnitudo nucis moschata usurpetur. Alii remedia ex ligno guajaco & sulphure parata ex arte commendant, verum illa Serenissimi Prin-

cipis

cipis temperamento calido & sicco non convenient. Decocta antiphthifica, qualiacunque fuerint, maturè ventriculus fastidiet. Opiatæ ex conservis ignaviores sunt, quam ut possint prædictis indicationibus satisfacere. Quid de conservâ rosarum rubrarum nonnullis decantatâ, Vir experientissimus, *Franciscus de le Boe Sylvius* judicet, illum ex lib. IV. prax. med. tract. IV. audiamus. Cæterum ad mundati ulceris consolidationem solent commendari rosæ rubræ atque ex ipsis parata conserva, cujus effectum magnum hætenus non vidi, quoniam ubi copiâ majore sumitur, quod ejus Laudatores præcipiunt, ventriculus & intestina multo phlegmate replentur, unde non saltem appetitus prosternitur, sed & chylicatio læditur, imò non semel molestum frigus in ventriculi regione oboritur, à quo vix aliquot mensium spacio ægri liberantur, uti hoc aliquoties observavi. Omnibus istis remediis præferimus pulverem anti-hesticum *Poterij*, qui legitimè præparatus & ulceri & feбри egregiè resistit, cujus grana undecim aut tredecim in aquâ scabiosæ concedantur. Sumpto hoc pulvere aqua antiphthifica usurpetur: hisce medicamentis iterum indormiscere potest *Serenissimus Princeps*. Manè horâ octavâ & vesperi horâ quartâ assumat duo vel tria cochlearia sequentis gelatinæ. R. rasur. C. C. non usti ℥iiii. affund. aq. font. ℔ iiij. stent benè cooperata in digestionem in loco calido horis viginti quatuor, postea adde radic. tussilag. ℥ss. flor. bellid. minor. Mij. (si recentes haberi possint, efficacius evaderet medicamentum) herb. endiv. recent. alchymill. sanicul. ā Pi. passular. major. exacinat. ℥iii. coq. lento igne paulum ultra remanentiam medietatis;

colatura fortiter expressa & adhuc colenti misce confect. al-  
 kerm. ʒij. indantur fictili & servantur in loco frigido. Gela-  
 tinæ superbibat jusculum alteratum, aut quod  
 ventriculo gratus foret, gelatinæ cochlearia ali-  
 quot immisceantur jusculo alterato, quod ex her-  
 bā endiviæ & floribus bellidis minoris recentibus  
 paretur. Interdium subinde electuarium an-  
 tiphthisum & tussis urgente rotulas sequentes usur-  
 pet. R. spec. diatragac. frigid. ʒij. diatrios simplic. ʒj. boli  
 armen. ver. ʒʒ. pulver. anti-hædici Poterij ʒj. confect. al-  
 kerm. ʒij. sacch. opt. aq. scabios. solut. ʒiiij. F. s. a. rotulae pro  
 beneplacito sumenda. Ne molesta tussis somnum in-  
 terrumpat & pulmones nimium concutiat, in-  
 terdum tempore decubitus emulsio præscribatur.  
 R. amygdal. dul. recent. excortic. ʒij. papaver. alb. ʒiss.  
 aq. scabios. farfar. ā ʒj. sacchar. rosat. tab. ʒj. F. emulsio,  
 vel quandoque grana tria pilularum de cyno-  
 noglossio Benedicti Faventini aut Johannis Zvvelferi  
 concedantur. Purgantia in hoc morbo penitus  
 proscribenda sunt, hoc vel sola diarrhæa sponte  
 nonnunquam superveniens & plerumque letha-  
 lis docet: Imò observavimus, nonnullos ab usu  
 purgantium subito enecatos & alios in phthisin  
 immedicabilem præcipitados fuisse. Chirur-  
 gorum auxiliorum nullum hoc tempore adhi-  
 bendum novimus præter fonticulum, cujus ta-  
 men excitationem nec brachia nec pedes maci-  
 lenti facile admittent. Diæta accuratissima, sine  
 quā omnia medicamenta frustranea sunt, diu  
 exactè observanda erit. Aer sit temperatus ad  
 caliditatem magis vergens; nam frigidus & hu-  
 midus admodum nocet, cum iste omnibus ul-  
 cri-

ceribus, imprimis autem pulmonum damnosus sit. Serenissimus Princeps vescatur cibis boni succi & facilis digestionis, nempe carnibus vitulinis, agninis, vervecinis, ferinis junioribus, pullorum, aviculis montanis, piscibus carnem friabilem habentibus, ovis forbilibus, oryzâ cum lacte aut jusculo carnis coctâ & hordei cremore, nec penitus denegandi fructus cocti scilicet prunorum, pruneolorum, pomorum, pyrorum, passulæ majores & minores, nisi diarrhœa adsit. Pro potu ordinario sequens decoctum bibat: *℞. radic. china recent. ℥ij. aq. font. ℥ij coq. par. in colat. sol. syr. violar. purpur. ℥iiij. papav. rhead. ℥ij. spir. sulphur. ℥j. misce.* Parcior cœna lautiori præstat. Somnus pomeridianus declinandus est. Conducit in hoc affectu alvum adstrictiorem quàm fluidiorem esse, si diarrhœa invalescat, emulsio amygdalina cum decocto C. C. usti paretur. Num potus thermarum *Aquisgranensium* tempore verno repetendus sit? ambigimus; licet enim thermæ istæ potenter detergant & ulcera interna emundent, atque hoc nomine forsan phlegmaticis naturis prosint, nihilominus illas ob temperamentum Serenissimi Principis calidum ac siccum & febrem lentam gliscentem suadere vix audemus.

Consultatum *Basilea die V. Novembris A. S.*

*ed de LXXV.*

POSTeaquam Serenissimus Princeps per aliquot septimanas nominatis in præcedenti consilio remediis cum manifesto emolumento usus fuisset, mihi demandavit, ut de valetudinis suæ statu & medicamentorum effectu *Dn. D. Wepferum* certiozem reddam, quod sequenti epistolâ à me præstitum est.



*S. P. Amplissime & Excellen-  
tissime Domine,*

**V**Naniami consensu inchoata cum Serenissimo Principe medendi methodus feliciter succedere videtur, nam febris lenta hecticæ prodromus, decrementum sumit, tussis molesta imminuitur, materia per exscreationem ejecta rarè purulenta observatur, per duas noctes cum levamine nihil exscreavit, blandè dormit, benè appetit ac concoquit, & urina semper laudabilis conspicitur, imò in brachiis carnem generari nuper advertimus. Ob metum diarrhœæ per aliquot dies ab usu diaphoretici Jovialis sive pulveris antihectici *Poterij* nobis abstinendum erat, hodiè verò illum rursus usurpavit. Aquâ & electuario anti-phthifico, gelatinâ cervinâ & exactâ diætâ aliisque in consilio nostro præscriptis Serenissimus Princeps diligenter utitur. Unde si felix iste remediorum suc-

successus, DEO Medico Opt. Max. favente, per aliquot menses porrò continuet, nisi que imper-scrutabile pulmonum sublateat malum, quotidie meliora speramus. Interim nullus dubito, quin post discessum (cognita enim est Serenissimo Principi sollicitudo Tua in restituendâ suâ valetudine secundâ) ingenii Tui acies perspicua adhuc alias remediorum formulas suppeditarit, quas ut nobis communicare velis, officiosè precor. Supremum Numen publico artis Medicæ bono & multorum ægrotorum solatio ad plurimos annos Te incolumem servet! *Basilea XXII. Novembr. 1670 LXXV.*

Celeberrimi Nominis Tui

*Cultor officiosissimus*

BERNHARDUS VERZASCHA.



EPISTOLA PRIMA

D N. D. W E P F E R I.

*Salve plurimùm Cl. Domine.*



Lurima in literis Tuis occurrunt, quæ optima quæque de valetudine Serenissimi Principis in integrum reditura pollicentur, plenius apud me gaudium evaderet, si quoq; accli-



acclivia scandentem facilius respirare intelligerem; hac enim ratione persuaderer, nullum imperscrutabile vitium in pulmonibus latere. Pulvis anti-hecticus *Poterij* aliàs alvum non movet, nam nitrum crebris lotionibus ita sublatum fuit, ut ne minimus stimulus in ipso superesse possit, imò aliquibus magis alvum suppressit quàm movit. Diarrhœa ista aliud principium agnosceret, nam dum aderam, nondum exhibito pulvere anti-hectico molesta erat: Si illa fortè rediret, speciebus ut ita loquar, ex quibus gelatina C. C. paratur, drachma una ichtiocollæ addatur, hæc sæpius utor, quando fluxum aliquem colliquativum timeo, qui non rarò phthificis cum magnâ virium jacturâ supervenit. In methodo nostrâ nihil hac vice immutandum, nec Serenissimum Principem aliis medicamentis onerandum existimo, cum illa hætenus votis nostris responderint: pertinaci proficuum continuatione semper plus præstatur quàm alternatione incertâ & dubiâ plerumque non sine ægrorum tædio. Quidam deprædicant medicamenta ex sulphure parata, nempe flores simplices & compositos, lac & balsamum sulphuris, at hæc pluribus malè cessisse novi, quod etiam *Hæchstetterus* in observationibus suis factum memorat. Dum hæc scribo, à Sacerdote quodam literas accipio, qui refert, se ex desperatione quadam nunc uti balsamo sulphuris, dum cætera medicamenta in phthisi inveterata ignaviora experiatur; verùm exiguo cum emolumento, nam addit, sibi inde fauces exarescere ac deglutionem difficilem fieri. Novi quon-

quendam Phthysicum, cui fauces antea profundè ad gulam usque à tussis violentiâ excoriatæ erant, brevi ita ab usu lactis sulphuris erosas fuisse, ut vitio ad gulam pertingente ipsa quoque in asperam arteriam sub larynge pervia redderetur, unde paulo post ab assumptis æger suffocatus fuerit. Laudant alii pilulas ex terebinthina, mastiche & succo seu potius gummi ligni guajaci omni spiritus vini nidore crebrâ frigidæ loturâ sublato concinnatas; verùm & has Serenissimo Principi nimium siccando nocituras crediderim, hoc nomine nec methodus *Freitagij* locum haberet, qui cum *Arceo* decoctum Guajaci laudat: Si alia facies morbi fortè alia auxilia postulaverit, non deero, & quæcunq; excogitare potero, lubenter subministrabo. Lactis usum inprimis muliebris diu animo volutavi, procul dubio ceu analepticum suo tempore multum præstabit: Interea cum illis, quæ ulcus detergunt & consolidant, strenuè pergemus, eoque magis quia jam sine fructu lac caprinum bibit, & hac vice hujus generis remedia præcipuè necessaria sunt. Morbi diuturnitas longiorem medicamentorum unius generis usum nobis imperare videtur, maximè cum opem manifestam afferant: si verò tibi alia succurrent, quæ congrua putaveris, illis lubens meum calculum addam, nec laudabiliter inventa morosè improbabo, persuasus à probi & Christiani Medici candore alienissimum esse, sua tantum obtrudere velle, & solum illud bonum credere, quod vel *Pernelius* vel alius pridem statuit; quasi hætenus nihil salutiferi Medicinæ  
acces-

accesserit, omnisque sapientia hisce scriniis conclusa esset. Vale & Fave. Scriptum Scaphusij die XXX. Novembr. A. S. 613 Ico LXXV.

E. T.

*Cultori devotissimo*

JOHANNI JACOBO WEPFERO.

~~~~~

R E S P O N S U M  
ad hanc Epistolam.

*S. P. Amplissime & Excellen-  
tissime Domine,*

**P**ost transmissam nuper die Veneris epistolam statim subsequente Sabbathi die Serenissimum Principem catarrhus corripuit, unde majori cum difficultate respiravit, molestius tussivit, copiosius sed sine ullâ notabili puris quantitate excreavit, & aliquoties capite doluit. Hæc omnia animum meum vehementer discruciant, nisi apud nos isto tempore hyemali catarrhi essent malum epidemicum, quod ferè nulli familiæ parcat, etiamque puerperas lecto decumbentes corripit, uti & hoc Serenissima Princeps experitur. Potiorem causam catarrhi hujus epidemici adscribo maximæ aeris anomaliz, qualem

qualem ullâ hyeme nunquam observavi. Erigit animum meum, quod prædicta symptomata remittere incipiant, ad quorum sublationem, quoniam remedia in nostro consilio notata sufficiunt, nulla alia præscripsi. Cæterum lubens sententiæ Tuæ subscribo, gaudium nempe nostrum plenius evasurum, si Æger acclivia scandens facilius respiraret. Pulverem anti-hesticum *Poterii* alvum movisse inde collegi, quoniam post usum illius semper spacio viginti quatuor horarum quater dejecit, & excrementa aluina simili colore tincta apparuerunt, econtra quando pulverem istum non usurpavit, saltem bis eodem temporis spacio alvum reddidit, excretaq; alium colorem exhibuerunt: nullus dubito, quin nitrum crebris lotionibus in pulvere anti-hestico *Poterii* ita sublatum fuerit, ut ne minimus stimulus in illo superesse potuerit, nam si in isto pulvere ulla vis purgatrix sublateat, illam non in nitro sed in antimonio quærerem, quippe multi-variâ experienciâ compertum est, antimonium diaphoreticum & bezoardicum minerale etiam ab experientissimâ manu elaboratum aliquando unâ cum sudoribus alvum movere, præsertim si illa corporibus cacochymicis concedantur: verum est, nondum exhibito pulvere anti-hestico *Poterii* diarrhœam Serenissimo Principi molestam fuisse, hinc iniquus essem, si illius causam soli huic pulveri ascriberem, quem Princeps porro diligenter usurpabit: contra diarrhœam bibit emulsionem amygdalinam cum decocto C. paratam, si illa rursus minetur, ichthiocolam

spe-

speciebus cervinæ gelatinæ addemus, nam fluxui colliquativo nobis omni arte præveniendum erit. Addo calculum meum in methodo nostra nihil hac vice immutandum, nec Serenissimum Principem aliis medicamentis onerandum esse, cum illa hætenus votis nostris satisfecerint; hinc candidè & eruditè in Tuis mones, pertinaci proficuum medicamentorum continuatione in hoc affectu semper plus præstari quàm alternatione incertâ & dubiâ, imò longiorem morbi diuturnitatem remediorum unius generis usum nobis imperare. Interim nisi calidum & siccum Serenissimi Principis temperamentum mihi obstaculum poneret, illi tractu temporis medicamina ex sulphure & guaiaco composita tutò concederem; ista enim phthisicis temperamento frigido & humido præditis magnum emolumentum attulisse, propriâ experienciâ edoctus sum. Adhuc apud nos in vivis est Coriarius, qui ante quindecim annos phthisi laboravit, & multivariis remediis *Galenicis* frustra usus fuit, hunc solo balsamo sulphuris anisato, ac elixire proprietatis *Paracelsi* alternatim pro lubitu ad guttulas decem in vino albo sumptis, secundæ valetudini restitui: de utroque eleganter disserit *Franciscus de le Boe Sylvius lib. IV. prax. med. tract. IV. §. 186. & 211.* nullum hætenus reperi medicamentum, quod vel externè vel internè usurpatum citiùs tutiùsque munda-verit & consolidaverit recentia ulcera atque balsamum sulphuris anisatum, dummodo ægri eo uti potuerint & voluerint. Cum elixir proprietatis *Paracelsi* constet myrrhâ, croco & aloe cum  
sul-

fulphuris oleo per campanam parato & spiritu vini simul digestis, illud myrrhæ & croci nomine convenit tussi, aloë autem humorem puitosum incidit, blandè educit, pus attenuat, ulcus mundat ac consolidat, unde in phthisi remedium convenientissimum meritò celebratur. Ante decem annos alium Civem nostrum simili temperamento præditum, qui contra phthisin plurima remedia incassum usurpavit, cum decocto guaiaci è faucibus mortis liberavi. *℞. Lign. guaiac. ℥iiij. radic. sarsaparill. lign. sassufr. ā ℥℔. passul. minor. ℥j. liquir. ras. ℥ij. sem. anisi ℥℔. coq. in aq. fontan. ℔xvj. ad remanent. ℔xij. vase benè clauso colatura detur ad usum.* Bibit hoc decoctum pro potu ordinario per tres menses, inde ab omni tussi ac puris ejectione liber adhuc hodie vivit, & apud Institores Scribæ ordinarii officio fungitur. Verùm hæc medicamenta calidum & siccum Sere- nissimi Principis temperamentum non admittit. Per omnia amicitiae nostræ jura Te precor, ut curam lactis muliebris, num Principi conducat, acerrimi judicii Tui indagine examinare, & de illâ mentem Tuam nobis aperire velis. Interea candorem Tuum ingenuum exosculor, quòd à Christiani Medici fide alienum esse existimes, supercilioso præjudicio asserere, universam scientiam Medicam in Hippocratis & Galeni scriptis in- primisq; Fernelij scriniis conclusam esse. Ego antiquam veterum Medicorum auctoritatem, quam in jacendis Medicinæ fundamentis immortalj nominis gloriâ impetrarunt, semper in magno precio habui: interim homines fuerant, & hu-

mani à se nihil alienum putarunt, unde ipsemet  
 Galeus lib. II. de compositione medicamentor. secundum  
 loc. cap. IIX. rotundè fatetur. Μέγιστον γὰρ ἐστὶ τοῖς  
 ἰατροῖς ἀληθῶς βυλομένοις ὡς ἴνα οὐδὲ τέχνη λογικὴ, ὅταν γε  
 καὶ πεφυκότες ὦσιν ἀγγίνοιτο καὶ γεγυμνασμένοι καὶ τῶν τῶν  
 παιδῶν ἡλικίας ἐν τοῖς πρώτοις μαθήμασιν, οἱ πολλοὶ δὲ τῶν ἰα-  
 τρῶν τὰς τέχνας μετὰ χειρὸς μαθόντων, καὶ γενέσθαι σοφοὶ κατ' αὐτοὺς,  
 ἀλλὰ τοῖς πολλοῖς φασὶν ἰατροὺς ἀποδιδόναι. Αρχιγένους ἐπὶ  
 τῆς καὶ ἄλλου ἰατρικῆς ἔτι καὶ τῆς ἰατρικῆς θεωρίας, ἀπο-  
 δίδας, εὐκότως ἀξιόλογα συγγραμμάτια πάντοτε κατέλιπον,  
 καὶ μὴ ἐν ἀσασί γε οἷς εἶπαι ἀμεμπτοῦ εἶναι μοι φάνηται, ἀλλ'  
 ὡς περ αὐτοῦ ὑφ' ὧν ἀνδρῶν ἀφελήθη ἀρετῶν ἐγένετο, τῶν  
 ἐλπίσιν πολλὰ, ἔτι καὶ αὐτῶν εὐκός ἐστιν, ἀμαρτάνοντα, πρὸς ἡμῶν  
 τῶν μετ' αὐτοὺς γεγονότων ἐξιλέγχεσθαι. Χαλεπὸν γὰρ ἀνδρῶν  
 ἄντα μὴ διαμαρτάνειν ἐν πολλοῖς, καὶ μὲν ὅλως ἀγνοήσαντα, καὶ  
 ὃ κακῶς κολούοντα, καὶ ὃ ἀμελείτερον πράσσοντα. Maximum  
 hoc censeretur debet, his, qui artem quancunque tandem ra-  
 tionalem ediscere ritè volunt, quum naturâ apti ad eam  
 fuerint, ingeniosi & à puero disciplinis eruditi. Pleriq;  
 autem, qui ejusmodi artes tractant, non ut ipsi sapientes  
 in his evadant, sed ut vulgo tales videantur, studio ha-  
 bent. At verò Archigenes ut si quis alius, quæ ad me-  
 dicam speculationem attinent, diligenter ediscere studuit,  
 atq; ob id meritò scripta quàm plurima memorabilia re-  
 liquit, non tamen in omnibus, quæ tradidit, irreprehen-  
 sibilis mihi videtur, verùm velut ipse pleraq; eorum viro-  
 rum, à quibus adjutus optimus evasit, reprehendit, sic  
 par est ipsum delinquentem à nobis posteris redargui. Dis-  
 ficile enim est, ut qui homo sit, non in multis peccet,  
 quædam videlicet penitus ignorando, quædam verò malè  
 judicando, & quædam tandem negligentius scriptis tra-  
 dendo. Unicum adhuc de Fernelio monendum  
 censeo, nonnullos novo paradoxorum callopi-  
 fimate lapsus Fernelianos oblinire: præclarum sci-  
 licet inventum, quò Magistrum decorant egregii  
 Vindi-

Vindices! Vale Vir amplissime feliciter & amare  
porro perge.

Basil. III. Decembr.

A. S. cD De LXXV.

Excellentissimi Nominis Tui


*Cultorem addictissimum*

BERNHARDUM VERZASCHAM.



Secunda DN. D. WEPFERI  
epistola.

*Salve plurimum Cl. Domine.*

 Atarthos ab anomaliâ aeris ubique lo-  
corum plurimis infestos esse undiquaque  
auditur. Symptomata remittentia apud  
Serenissimum Principem bona quæque prænun-  
tiant, eoque magis, quia sputum tussi molestif-  
simâ copiosè rejectum purulenti inquinamenti  
expers erat. Majus gaudium evaderet, si intel-  
lexero, respirationem liberiores existere. Præ-  
scriptis medicamentis aliquandiu adhuc pergen-  
dum; detergo ulcere & aliquo modo consolidato  
tutius corporis habitum reficiemus, & tunc in-  
S 2 primis



primis lactis potus commodissimus erit. Certè divini aliquid in lacte later : id antehac nunquam credidissem, nisi id sensibus comperiissem apud illos, quibus ad podagræ truculentiam mitigandam & tandem eliminandam illud suasi. Vidi his meis oculis, quasi novos homines inde factos fuisse; nam legitimo ejus usu habitum firmiorem, colorem nitidiorem & vires robustiores plurimi acquisiverunt, quin etiam ab illo Symptomata hypochondriaca & nephritis auferebantur, quod quibusdam incredibile videtur. Exempla hujus rei aliquot viva sistere possem. Id tamen in curâ hac summopere cavendum, ne lac in grumos aut bilem convertatur, quod haud difficulter apud Serenissimum Principem præstabitur. An lactis muliebris suctio persuaderi possit? valde dubito, cum se cœlibi vitæ devoverit; nec fortè omnino necessarium erit, quum idem effectus à lacte caprino aut asinino impetrari queant. Cras Deo volente *Altorsium* apud *Uranios* proficiscar & vix ante quatuordecim dies domum redibo. Vale & Serenissimo Principi me humiliter commenda. *Scaphusii die VI. Decembr. A.S. cD Idc LXXV.*

E. T.

*Sincerus Cultor*

JOHANNES JACOBUS WEPFERUS.

RE-



# RESPONSUM ad hanc Epistolam.

*S. P. Amplissime & Excellen-  
tissime Domine,*

**B**ono cum DEO Te feliciter domum rediisse spero. Interim quatuordecim dierum spacio aliquoties autumavit Serenissimus Princeps, se circa horam nonam nocturnam paroxysmo febris tertianæ corripī, hinc prædictâ horâ sexies illum invisi, sed nullam febrim tertianam observare potui, pulsus enim rarè febrilis urinæq; semper laudabilis erat. Quæ per tussim adhuc molestant & exscreationem rejicit, pauca sunt & illis similia, quorum in consilio mentionem fecimus, imò aliquot noctes transegit, in quibus nihil exscreavit. Excrementa aluina sanorum similima semper apparent, si aliquando fluida redduntur, biliosa sed nullo chylo commixta observantur. Certè exactam Serenissimi Principis diligentiam in usurpandis remediis, unanimi consensu præscriptis, satis laudare nequeo, hinc mihi continuum calcar addit, ut in promovendâ illius sanitate nulli studio nullique tempori parcam. Animus est, Te consentiente, ad ulceris deterfionem ac virium conservationem, essentiam meam corallorum &

ambrae exhibere : essentia corallorum paratur cum spiritu foliorum quercus ; ambrae autem essentiam omisso zibetho & moscho, tanquam nimium calidis & siccis, cum solo spiritu rosarum Pharmacopola extrahet. Quæ de usu & virtute Lactis in eruditâ Tuâ epistolâ mones, omnia mihi perplacent : an autem tempore hoc hyemali methodica cura caprini vel asinini lactis institui possit ? dubius sum, cum animalia ista convenientibus herbis recentibus nutriri nequeant. Vir summæ eruditionis & experientiæ *Dn. Fridericus Hoffmannus in Schræderianâ clavi pharmaceuticâ p. m. 661*, omnibus lactis generibus muliebri præfert, tanquam naturæ nostræ magis familiare, præsertim si ex mammis fœminæ bono temperamento præditæ sugatur, quippe omnes indicationes ad phthysicorum curationem necessarias adimplet, nam parte suâ serosâ abstergit, caseosâ conglutinat, butyrosâ corpus nutrit & reficit, unde aliquos hujus usu restitutos se vidisse testatur *Felix Platerus tomo III. prax. medic. p. m. 499*. & ex illis unum non solum convaluisse, sed etiam tantas recepisse vires, ut ne lac in posterum sibi deficeret, nutricem imprægnarit. Sic *Dn. Grandprelius* in observationibus *Riverio* communicatis de filio Præsidis *Gratianopolitani* refert, qui anno ætatis suæ decimo quarto *Genevâ Gratianopolim* adventus est octavo morbi mense, consumptus macie & phthysi cum alvi fluxu insigni, ita ut cum brevi moriturum Medicus Patri prædixerit propter ulcus pulmonis, cujus frustula rejecta gravissimum odorem exhalabant, anhelitusque fœtor cada-

cadaverofus non solum ægrotantis cubiculum sed etiam vicina loca inficiebat. Hic adolescens, posteaquam jussu Medici per duos menses lac muliebri è nutricis sanæ uberibus suxisset; etiam integræ sanitati restitutus fuit: quod remedium in pluribus aliis etiamque in semetipso, nec non duobus Nobilibus Viris tanquam præstantissimum prædictus Dn. D. Grandpresius expertus est. Tandem quærit Serenissimus Princeps, an chocolata tutò uti possit? responsum proximè expecto & constanti pectore persevero. *Basil. XXII. Decembr. A. S. cD Dc. LXXV.*

Excellentissimi Nominis Tui

*Cultor sincerus*

BERNHARDUS VERZASCHA.



Tertia DN. D. WEPFERI  
epistola.

*Salve plurimum Cl. Domine.*

**S**erenissimum Principem à febris tertianâ immunem esse confido, cum hætenus nullæ febriles accessiones à te deprehensæ sint, pulsusque & urina naturaliter se habuerint:

quoniam verò in suspicionem paroxysmi febrilis venit, procul dubio aliquod symptoma passus erat, quod illam primò movit: fortè horrorem aliquem expertus fuit, qui sæpe evenit, quando pus generatur, quod in virgine nobili hoc ipso tempore animadverto; aliquot enim noctibus fermè circa horam nonam horrores perpessa est, nunc purulenta exspuit cum manifesto phthisis incremento: meliora tamen sperabo, quia pulsus est naturalis, purulenta ejectio non augetur, & Serenissimus Princeps aliquot noctes citra tussim transegit. Diarrhœæ in hoc affectu semper mihi suspectæ sunt, quas omni ingenio semper declinavi, ne in colliquativas degenerarent. Tincturam corallorum & essentiam ambrae improbare nequeo, cum spiritus mirè reficiant, augeant & plerumque in parvâ quantitate porrigantur, quamvis spiritus, qui illarum menstrua vocantur, inflammabiles sint, utpotè præviâ fermentatione parati: etiam tinctura corallorum, quæ cum spiritu ligni querni, per retortam prolicito, maximè acido & corrosivo, paratur, Serenissimo Principi non conveniet. Cui chocolam non facile suaserim, medicamentum aliàs mihi satis notum, quod non semel Magnatibus ipsemet propinavi, verùm plerisq; sanis, aut vix effatu dignis affectibus obnoxiiis, nescio quod robur & perditarum virium instaurativum expetentibus. Cur improbem apud Serenissimum Principem, plures causas referre possum. Primùm de qualitate seu seminis aut nuclei Cacao, quod basis hujus medicamenti con-

constituitur, Autores dissentiunt : quidam frigidum & siccum intensè dicunt ut *Antonius Colmenerus de Ledema* in libello de *chocolata Indæ qualitatibus & natura* cap. I. Frigidum statuit *Franciscus Hernandez* lib. III. *rerum medicar. novæ Hispan.* p. m. 81. Ideo hæcticâ febre consumptis, tabidis atque extenuatis mirè commendat. *Paulus Zachias de affectione hypochondriacâ* lib. II. cap. XV. absque dubio calidum esse affirmat, à quo non multum dissentire videtur *Caspar Caldera de Heredia* tom. I. *tribunal. med. tract. de potion. varietate sect. III. cap. V. p. m. 467. & seqq.* ubi prolixè de hoc medicamento differit. Deinde formulæ chocolatæ non ejusmodi sunt & fermè omnes variant. Si simplex medicamentum esset, & de cujus ingredientibus certò constaret, solidius judicium de illo ferre liceret : ajunt aliter à *Lusitanis*, aliter ab *Hispanis*, optimè à *Mexicanis* confici, sunt nunc, qui chocolatam *Francforti & Ambsterodami* parant : vivit apud nos Mercator, qui diu in *Hispaniâ* vixit, jactat se optimam parandi rationem nosse, nec aromata illi admisceri negare audet. Ad Venerem stimulam nonnulli mirè commendant : meo calculo tutius omittitur remedium anceps, quàm si in morbo difficillimo ejus periculum fieret. Lactis muliebris suctionem neutiquam omittendam esse existimo : qualis autem nutrix seligenda & quomodo nutrienda, non necessum est pluribus exponere : illud maximè observandum, ut omnibus modis caveatur, ne lac in grumos aut bilem convertatur. Illis qui lacte vaccino contra podagram usi sunt, imprimis prohibui omnia acida, pinguis & valde

saccharata: fructuum horæorum usum nocentis-  
 simum expertus sum. Cœnam parcam semper  
 commendavi, attentè omnes mutationes in hac  
 curâ evenientes consideravi, & maturè emergen-  
 tibus symptomatibus occurrî. Quoniam lactis  
 muliebris suctio potissimùm nutritionis causâ  
 præscribitur, à detergentibus & consolidantibus  
 remediis non abstinendum esse censeo, quamo-  
 brem ulterius Serenissimo Principi pulveris anti-  
 hectici *Poterii*, & aquæ ac electuarii antiphthifici  
 continuationem persuaderem. Si Celsitudo sua  
 lactis muliebris suctionem è mammis planè  
 horreret, lac caprinum etiam hyeme non prorsus  
 rejiciendum foret: podagrici mei lac salubrius  
 experiuntur, quod suppeditant vaccæ fœno & a-  
 venâ, quàm herbis recentibus pastæ; nam subinde  
 succus herbarum crudior lacti admixtus ventri-  
 culum gravat. Plura non addo. Vale & vive  
 feliciter hoc novo ineunte anno ac plurimis su-  
 perventuris ad Reipublicæ vestræ & Medicinæ  
 incrementum, meque Serenissimo Principi hu-  
 millimè commenda. *Scaphusii die XXIX. Decembr.*  
*A. S. c. p. p. c. LXXV.*

E. T.

*Cultor addictissimus*

JOHANNES JACOBUS WEPFERUS.

RESPON-



# RESPONSUM ad hanc Epistolam.

*S. P. Amplissime & Excellen-  
tissime Domine,*

**M**agno cum delectamento & animi satietate eruditæ Tuas literas legi, sed antequam ad illas respondeam, necessarium esse duco, cursum morbi describere, qualem post ultimas meas in Serenissimo Principe observavi. Decem sunt dies elapsi, quod Celsitudo sua, cum in conclavi Principis *Sybilla* commoraretur, circa horam secundam pomeridianam inopinatò dolorem ferè per duas horas pungentem in parte lateris dextri passus fuerit, qui ex præscripto julepo cum aquâ scabiosæ, farfaræ & syrupo papaveris rheados parato & unguento resumptivo *Fernelii* cum spermate ceti mixto eadem die disparuit: verùm tussis molestissima mox supervenit, excrementaque purulenta, compacta & subviridia, non sine aliquâ virium jacturâ rejecit. Ad promovendum novæ hujus materiæ exitum sollicitus celebriores Præcticos consului, tandemque syrupum pectoralem *Zwelferi*, hederæ terrestris *Quercetani*, de altheâ *Fernelii* & erysimo *Lobellii* præscripsi, ex quorum syruporum usu facilimè exspuit, unde cum illis pergendum esse censeo:



cenſeo: an autem nova iſta materia ex nuper apertâ vomicâ vel ex collectione recenti in veteri ſinu vomicæ, cùm per quatuordecim dies fere nihil exſcreaverit, ortum trahat, iudicio Tuo accuratiori examinandum relinquo. Cæterùm intra prædictos decem dies Sereniſſimus Princeps per duos dies excrementa alvi liquida, bilioſa & ſeroſa reddidit, quæ factorem intolerabilem ſparſerunt, huic fluxui obviam ivi emulſione amygdalinâ cum decocto C. C. paratâ: contra omnis generis fluxus alui nos tincturâ meâ corallorum feliciter utor, paratur illa non ex ſpiritu ligni querni, ſed ex ſpiritu foliorum quercus, & nequaquam corroſiva eſt. Cùm lactis muliebris uſum Celſitudini ſuæ mecum conſulueris, & Viri excellentiſſimi Domini Doctores Cloſius ac Möglinus calculum ſuum addiderint, hâc ipſâ horâ conſenſit Sereniſſimus Princeps, poſt octiduum à Te plenius conſilium exſpectans, ut methodo exactiſſimâ curam hanc abſolvere poſſit. Plura addere temporis anguſtia non permittit. Felicia novi anni auſpicia, feliciorem progreſſum & feliciffimum egreſſum, cum plurimis ſubſequentibus annis, Tibi toto pectore reprecor. *Baſil. die ultimo Dec. A. S. clv lvc LXXV.*

E. T.

*Cultor addictiſſimus*

BERNHARDUS VERZASCHA.

Quarta



## Quarta DN. D. WEPFERI epistola.

*Salve plurimum Cl. Domine.*

**S**erenissimi Principis sputum purulentum, fœtidum, tenacissimum & consistentiâ prorsus compactum non nuper natum esse his indiciis manifestè apparet, quod etiam confirmat dolor punctorius sævissimus excretionem præcedens; ipse excretionis modus cum vehementiâ junctus, & debilitas illam consequens: an verò ex vomica recenter rupta prodierit, vel in sinu antiquo delituerit, & tussis violentiâ ex latibulo tali productum fuerit? certò definiri non potest, ex vomica ruptâ illud credidissem, si sputum cruore tinctum fuisset, vix enim vomica est, cujus folliculus vasis capillaribus non dotetur. Tincturam corallorum spiritu foliorum quercus extractam non rejeci, cum inflammabilis & sulphureus sit, non salinus & acidus, utpote qui procul dubio præviâ fermentatione per vesicam, non per retortam, ut spiritus ligni querni acidus, prolicitur. Cæterum cura lactis muliebris sequente methodo instituenda mihi videtur. Serenissimus Princeps manè horâ quintâ & nonâ, vesperi autem horâ quartâ lac è mammis ad aliquam satietatem exsugat: post suctionem ad minimum per integram horam ab omni cibo, potu & me-

& medicamento abstineat , & se ad quietem componat : manè horâ septimâ pulverem antihæsticum *Poterii* & postea aquæ anti-phthificæ cochlearia quatuor usurpet : si tussis urgeat, tunc uti & aliis horis intermediis electuarium anti-phthificum & syrupos, quorum mentionem fecisti, lambere atque ita excretionem facilitare licet : semper tamen attendendum erit, ne lac in grumos vel bilem convertatur. Grumi innotescunt ex ructibus acidis, ventriculi aggravatione, distensione, vomitu acidorum & torminibus. Bilis patet ex oris amaritie, siti, nausæâ, ructibus nidorosis, aphthis, cardialgiâ, torminibus & diarrhœâ biliosâ. Grumis lacteis resistunt tabulæ de nuce moschata in officinis vestris consuetæ, de quibus subinde frustulum sumatur. Lacte in bilem converso concedantur juscula cum endiviâ & borragine recenti parata. Prandeat Serenissimus Princeps horâ decimâ. In prandio victus lautior concedatur, nec enim Gallis & Italici assentire possum, qui tum in hujus morbi, tum in podagræ curatione lactis beneficio ægros propemodum fame enecant. Vescatur citra scrupulum in prandio carnibus vitulinis, hœdinis, pullorum, ferinis junioribus elixis aut assis, sed nec aromatibus, vel aceto, aut succo citri conditis. Concedi etiam possent pruna *Damascena* dulcia, pruneola *Hispanica* & fercula ex passulis majoribus & minoribus, nisi diarrhœa hæc prohibeat, item pultes ex oryzâ, amygdalis, cremore hordei, & ova forbilia, quandoque etiam pisces carnem friabilem habentes, assos tamen potius

potius quàm elixos admitto. Pro potu ordinario usurpet decoctum radicis chinæ ordinarium. Post prandium aliquamdiu semper lentè obambulet, & somnum pomeridianum quocunq̃ue ingenio eludat. Cœnam parciolem suadeo. An circa mediam noctem Serenissimus Princeps lacte potandus sit? valde dubito: nam si nutrix noctu sæpius expergeret, lac minus laudabile certò suppeditaret; rectius fortè horâ nonâ aut decimâ noctis daretur unum alterumve cochlear plenum *diacodio Montani* ad tussim mitigandam. Nutricem quòd attinet, seligenda erit sana & lacte abundans: cibetur alimentis euchymis ac eupeptis ea quantitate, quæ ad lactis quantitatem sufficit & à ventriculo superari potest. Pro potu ipsi potius vinum album tenue quàm cerevisia concedatur: quando siticulosa est, vinum diluatur decocto Principis ordinario. Forsan etiam consultum erit, si Nutrici manè & vesperi propinaretur haustus decocti cujusdam grati & traumatici, ut lac magis scopis nostris accommodum esset, vel decocti loco tragea aut electuarium quoddam pectorale concedatur: quando menstrua paritur, tragea temperata necessaria est. Ab animi pathematibus & Venere arcenda erit. Præcipuum ferè præteriissem nempe panem, tum pro Serenissimo Principe, tum pro Nutrice, conficiendus est levis, albus, bene coctus, non à fermento acidus factus: apud Illustrissimum Dominum, *Franciscum Carolum, Comitem de Furstenberg*, loco fermenti massæ panis fæcem cerevisiæ admiscendam curavi, unde etiam suavissimus evadit: dulciaria

ciaria cujuscunque generis proscribenda erunt.  
Alia hac vice non occurrunt. Vale feliciter  
& Serenissimo Principi me humiliter commen-  
da, *Staphusii die XXIX. Januar. A. S. clo Idc LXXVI.*

E. T.

*Cultor ex asse*

JOHANNES JACOBUS WEPFERUS.



• Prima Continuatio & Resolutio  
Historiæ Morbi


V. E. D. D. WEPFERO  
Authore.

**S**erenissimi Principis habitum corporis  
macilentum, die decimo quinto Februarii,  
præsens observavi, non tamen multò ma-  
cilentiorum quàm post abitum meum ultimum  
erat: ante meridiem inveni pulsum minus fre-  
quentem, celerem & durum, post pastum verò fre-  
quentem, celerem, parvum: tussis adhuc per-  
durat, & à pastu, corporis motu, extensione  
subitâ brachiorum & diutiùs continuato sermone  
frecuen-

frequentior evenit quàm manè & noctu, nonnunquam noctu post tussim statim indormiscit, ut manè se tussivisse ignoret. Sputum crassum manè & quandoque interdiu post unum alterumve tussis actum facile succedit, verùm si ob titillationem quandam in faucibus ad tussim irriteretur, ut post pastum & sermonem accidit, diu nihil & tantùm mucus tenuis spumeus cum magnâ violentiâ exploditur. Sputum hoc crassum, quod ex pulmonibus procedit, est consistentiâ compactius, viscidum, tenax & in fila trahi potest, ac si in bronchiorum ramulis diversis portiones quædam condensatæ & deinde in cavernâ collectæ fuissent, quæ postmodum ceu in unum bolum conglobatæ ejiciuntur: colore est subviride, luridum & turbidum, non foetet, at nescio quem dulcorem odoratui adversum spirat: hoc sputum quantitate non semper æquale existit, notavit *D. Verzascha*, illud ab aliquo tempore viginti quatuor horarum spacio ad 3iij. 3vj. 3j. ac 3iβ. ejectum; & ego observavi ad 3j. ultraque quotidie excretum fuisse. Quod sputum ob titillationem majore tussis violentiâ explodit, spumeum, tenuius & pellucidum est. Serenissimus Princeps etiam mucum viscidum, turbidum, crassum, album & copiosum crebrò per nâres emungit ac sreatu ejicit. Quando se movet, quod rarò amplius fit, difficulter respirat. Ab aliquot septimanis semper in hypocausto manet, plerumque decumbit & quidem in dorsum, si in latus sinistrum recubet, magis tussire cogitur: dolet frequenter in latere

sinistro maximè inter costam quintam & sextam, quandoque etiam in dextro sed parte altiore, dolor iste ab attactu exacerbatur, quamvis locus affectus nec tumeat nec rubescat. Profundè dormit ad plures horas noctu & manè in multum diem, licet quandoque à tussi excitetur atque exspuat, mox tamen iterum indormiscit, ut plerumque se tussisse aut exspuisse manè non amplius recordaretur, nisi sputum in vasculo conspiceret. Appetitus mediocris, quandoque satis laudabilis est: à cibo non gravatur, nec sitit, ex quo lac fugit, nunquam diarrhoeam passus fuit. Fæces alvi sunt compactæ, subfuscae & subflavæ. Urina crassior nunc est quàm pridem & coloratior cum satis laudabili sedimento. Sudavit nuper frequentius nunc autem rarius sine notabili virium prostratione. Capilli planè non desluunt. Attactu non amplius tam calidus est quàm fuit, nihilominus calor præternaturalis adhuc circa regionem arteriæ in carpo observatur: die decimâ octavâ Februarii cum noctu ob dolorem capitis inquietè dormivisset, manè nares sanguinem laudatissimum stillarunt.

## R E S O L U T I O.

N pulmonibus ulcus latere vix amplius dubitare sinunt sputum purulentum, quod tussi rejicitur, respiratio difficilis à motu quocunq̃ue, dolor lateris præcipuè sinistri, decubitus

cubitus in latera maximè sinistrum difficilior, pulsus febrilis inprimis post partum, calor circa arteriam in carpo & habitus universi corporis macilentus. Ulcus hoc sordidum esse demonstrat pus satis copiosum (nam à pluribus septimanis quotidie ejicitur à *℥iij. ad ℥i℥.* idque non raro) turbidum, obscurum, virescens, viscidum, crassum & globosum, non quidem foetidum at nescio quem dulcorem redolens: hoc porro confirmant respiratio difficilis post motum quemcunque, dolor usque ad costarum interstitia pertingens, qui ab attactu exacerbarur & denique febris lentæ signa. Quomodo pus in pulmonibus generetur, non fingendus est Archeus pulmonum imbecillis seu Vulcanus corruptor, ut illum vocat *Helmontius de asthma & tussi* §. 10. aut nescio quod peregrinum fermentum alimenta depravans, cum ejus generatio commodè explicari possit, si ulcerum maximè in partibus membranosis constitutio rectè attendatur. Nimirum in ulcere pulmonum, prout etiam in aliarum partium ulceribus fieri solet, textura parenchymatis pervertitur, vesicularum, ex quibus pulmo componitur, membranæ tenuissimæ aranearum telis similes partim crassescunt & vel decuplo crassiores fiunt, partim perrumpuntur, ut ex plurimis vesiculis minutis una vel plures ampliæ cavernæ resultent: capillamenta extrema arteriolarum exeduntur & magis patula redduntur, ut plus succi nutritii in cavernas effundant: extrema venarum capillarium & vasorum lymphaticorum oscula vel obliterantur, vel non coherent amplius



cum capillamentis vasorum alimentum afferentium, unde superfluum non reorbetur, sed in cavernis stagnat, & quoniam pars exulcerata semper inflammata & calore præternaturali prædita est, illud quod stagnat, facile inspissatur ac lentorem contrahit, simulque turbidum, subviride & globosum evadit, quia diutius intra pulmones calidiores plurimoque sanguine turgentes in cavernis detinetur, quod etiam foeteret, si longiore morâ his in locis subsisteret. Idem quia pulmonibus molestum est, tussim excitat, & quoniam tum ob illius copiam & lentorem tum ob vesicularum crassitiem & ductulos abditos aer sufficiens pulmones subintrare nequit, respiratio difficilior redditur, imprimis si usus auctus plus aeris postuler. Insuper quod pravior est succus nutritius, eò pejus & copiosius pus producit, pravus evadit in hoc affectu non solum propter errores externos sed etiam ob febrim lentam semper ejus comitem imò ab ipso ulcere pulmonum: nam sæpe experimur, à cancro, scrophulis exulceratis, pædarthrocace & aliis ulceribus chronicis ac dysepulotidis totam massam sanguineam ita inquinari, ut quamvis cancer extirpetur & hæc ulcera consolidentur, nihilominus alibi ulcera pessimæ notæ aut alii graviotes morbi emergant, undè quod diuturnius pulmonum ulcus affligerit, eò difficilior curatu redditur. Hanc succi nutritii depravationem ipsimet *Helmontiani* agnoscere coguntur, dum in hoc & similibus morbis aurum horizontale suum aliasque panaceas commendant, quæ si laudem merentur, illam

illam inde consequuntur, quia universam sanguinis massam emendant, quis enim persuadebit? hæc decantata arcana instinctu quodam ad locum affectum proficisci, & ibidem particulare hoc vitium propellere. An verò omne sputum, quod Serenissimus Princeps tussi rejicit, ex ulcere transfudet, intraque illius cavitatem colligatur? dubium mihi videtur: valde probabile est, tempore somni multum ex faucibus per laryngem ad pulmones delabi, nam mucum crassum, album, turbidum, aliquando cruore mixtum Celsitudo sua tum emungit, tum screatu prolicit, & insuper profundè dormit, ut etiam excreationis noctu factæ sæpius obliviscatur. Quia ulcus sordidum existit, & insuper tanto temporis intervallo massa sanguinea non mediocriter inquinata est, unde habitus corporis etiam in ipsa lactis cura adhuc nullum incrementum sumpsit, inde curatio difficilior redditur, ac omnino pertinacem & diuturnum medicamentorum usum ulterius requirit. Indicationes igitur erunt, totam massam sanguineam spiritibus & particulis nutritioni aptis privatam studiosè instaurandam, inquinamenta febrilia dispellenda, ulceris sordes detergendas; ipsumque ulcus ad consolidationem disponendum esse; aliquando etiam symptomatibus occurrendum, si pus ægrius procedat, ejus excretio facilitanda, & si dolores urgeant, demulcendi sunt. Itaque Serenissimus Princeps lactis muliebris suctionem definitis horis continuet, & quò felicius omnia succedant, etiam alteram mammam inprimis manè exhauriat: dein

mututino tempore horâ unâ post primam functionem ut & vesperi octo vel decem pilulas ex pulvere antihectico Poterij paratas usurpet, atque superbibat haustum aquæ anti-hecticæ sequentis: *℞. pulmones vitulinos duos & hepar vitulinum unum, limaces esculentos viginti, radic. tussilag. ℥iij, enula, irid. florent. ā ℥ij, herb. recent. cochlear. numular. vinc. per vinc. ā Miiij. marrub. alb. Mij. flor. recent. bellid. min. scabios. ā Miiij. semin. fœnic. ℥j. incisis & contusis affunde sanguinem totum porcelli domestici dimidiij anni, aquar. hyssop. salvia, veronic. scabios. ā ℥ij, heder. terrestr. flor. acaria ā ℥iij. papav. erratic. ℥j. stent in digest. in vase vitreo benè clausa per noctem in loco calido, postea in B. M. destillentur. Noctu antequam indormiscat, conservam bellidis minoris solam vel cum conserva rosarum mixtam & haustum aquæ hujus anti-hecticæ usurpet. Si sputum difficulter succedat, ejus excretio adjuvetur rotulis nuper ordinatis aut hisce syrupis. *℞. syr. flor. bellid. minor. ℥ij. de althea Fernelii ℥j. aq. fl. bellid. minor. ℥℔. misce. Quando dolor in latere urget, illud unguento resumptivo Fernelij inungatur & sequens emplastrum imponatur. ℞. emplastr. diachyl. simplic. ℥j. melilot. ℥℔. antimon. diaphoretic. ℥ij. ol. amygdal. dulc. qf. F. magdalon. In victus ratione nuper præscripta Serenissimus Princeps pergat. Nutrici porro prospiciatur cibus euchymis & eupeptis: insuper ut lac ipsum traumaticum evadat, manè post jentaculum & vesperi horâ post functionem uncias quatuor hujus decocti bibat. *℞. radic. tussilag. ℥j. herb. veronis, agrimon. ā Mj. flor. bellid. minor. Mij. passular. major. exacinat. ℥j. sem. anisi***

*anisi 3j. incisis affunde aq. fontan. ℥vj. vini alb. veter. ℥iiij. coq. par. colatura detur ad usum. Et hæc sunt, quæ hac vice notanda occurrerunt.*



## Secunda continuatio & resolutio Historiæ Morbi,

Eodem AUTORE.

**S**erenissimum Principem die decimo Maji rursus conveni. Facies erat pallida, subcineritia, macilentior; labia rubicunda non tamen tam rutila ac nuper: habitus corporis tam macilentus apparuit, ut vertebrae valde prominuerint, & quemadmodum in proverbio dicitur, omnes costae numerari potuerint. Pulsus fuit frequens, celer, subdurus, attactui renitens. Respiratio decubuo non difficilis, anhelosa aut intercepta est. In dextro latere inter costam quartam & quintam à contactu doluit. Tussit frequenter interdiu & noctu. Sputum ejecit ab aliquot diebus copiosum ad uncias duas, est rotundum, turbidum, subflavum, subviride, aliquando subfuscum, tenax & viscidum, non quidem summopere foetet, nihilominus tamen quendam adversum odorem spirat, qui tum imprimis animadvertitur, quando repente ex loco liberiori aeri exposito aditur, sæpe demum post

iteratos tussiendo nixus & tunc quidem pleno ore succedit. Jam ab aliquot diebus non sine molestiâ nares obstructæ erant, circa os sacrum exulceratur, perpetuò decumbit, extra lectum diu persistere nequit: quando erectus in sella sedet amplius ad tussim quàm decubitus stimulatur, appetitus ab aliquot diebus prostratus rediit, impensè non sitit, diarrhœa ab aliquot diebus valde molesta fuit, die nonâ Maji vesperti alvum exonerans ob diarrhœam propè in leipothymiam incidit: die decimâ fæces adhuc liquidæ & aliquo modo pultaceæ erant, quibus frustula alba ceu fragmenta amygdalarum contusarum immixta erant, die undecimo nunquam dejecit, die duodecimo fæces naturales compactas sed flavas absque molestia reddidit. Urina ab aliquot diebus citò turbatur, clarificata crassum sedimentum retinet, quod etiam statim post emissionem observatur, dum adhuc clara est. Ob tussis vehementiam statim post pastum invadentem nonnunquam assumpta evomit. Sudor nocturnus aliquoties molestus fuit non sine virium dispendio: die undecimo & duodecimo Maji sudor ferè nullus apparuit, posteaquam manè & vesperti spina dorsi sequente linimento inuncta fuerit. *R. unguent. rosati Mesue, refrigerantis Galeni ā 3ß. olei violar. q. s. F. linimentum.* Capillorum nullum defluvium advertitur. Naribus attracto lacte cum succo sempervivi & syrupo violarum mixto plurimum muci pellucidi è naso & faucibus prolectum fuit. Post pastum animadverti æstum pungentem præsertim in  
vola

vola manus. Jam diu dextro lateri soli aut dorso incumbere valet, si in sinistro cubet, magis tussire cogitur, nuper hæmorrhoidibus dolebat: duodecimo Maji toto die & noctu dolorem capitis sensit, inde decimo tertio multum sanguinis emunxit. Dum ad alvum solvendum surrexisset, ejecit citra tussim solo sreatu sputum purulentum, ac si bronchia pulmonum pure plena & sursum unico hoc motu protrusum fuisset, quamvis nec vox rauca nec respiratio cum sibilo observetur, nisi sinistro lateri incumbat, totâ nocte dormivit & nihil tussi rejecit, die decimoquarto Maji demum post lactis suctionem tussire & sputum purulentum excernere cœpit, cui parùm cruoris admixtum fuit.

## R E S O L U T I O.

**Q**UAMVIS Serenissimus Princeps à principio Martii usque ad finem Aprilis parùm & quandoque per unum alterumve diem nihil purulenti exspuerit, nihilominus tamen pus intra pectus latuisse obscurum esse non potuit, quia semper adhuc febris lenta continuavit cum totius habitûs emaciatione & imbecillitate quadam, ob quam extra lectum diu persistere nequii. Pus tamen hoc non detinebatur in cavo pectoris, nec in ulceribus in bronchia apertis; nam post retentionem sputi à tot septimanis respiratio non difficilior reddebatur, nec cum stertore aliquo fiebat, Potius credibile est, vomitum aliquam

T 5

aliquam derepentè ruptam fuisse , nam copiosior rejectio puris subitò evenit cum raucedine forti & vehemente tussi : non fœtuit , quia undique membranâ coercebatur , fœtor autem non emanasset , si vi quadam detentum fuisset , & liber aeris aditus ad illud patuisset. Interea oportet labem in pulmonibus insignem esse , nam primò pus turbidum , luridum & crassum copiosè ejecit , cum in habitu corporis emaciato laudatissimis alimentis hætenus refecto , minus rejicere deberet. Deinde febris lenta continuat , ut ex pulsu , emaciatione & languore virium apparet , ob quem extra lectum permanere nequit. Color vividus faciei magis perit , nam ferè cineritius est , & versùs livorem aliquem vergit , imò febris nuper incrementa sumpsisse videbatur , uti hoc probant sudores ferè colliquativi , diarrhœa biliosa , cui pinguedo innatavit cum urinâ tinctâ & turbidâ : fortè sudores , quæ in hoc affectu plerumque funesti sunt , adhuc continuarent , nisi illi inunctione spinæ arcerentur. Narium obstructio à muco exsiccatò debetur etiam calori præternaturali , quum ille à vapore calido è pulmonibus emissio induretur. Cessante diarrhœâ ventriculus rursus benè concoquit. Viscera sanguificantia etiam suum officium præstant , quippe sanguinem laudabilem generant , ut ex narium hæmorrhagiâ patet , quamvis negari nequeat , illum calidiorem esse. Tandem cum omnes sensus vigeant , cerebro nulla noxa adscribenda erit. Indicationes præcipuæ sunt , pus detergendum , ulcus consolidandum , febrim immi-

nuendam,

nuendam, nares obstructas aperiendas, sudorem impediendum, & diarrhœam coercendam esse. Serenissimus Princeps statis horis pergat lactis suctione & pilulis *Jovialibus* sive ex pulvere antihectico *Poterij* paratis cum aquâ antihecticâ, rotulis ordinariis diligenter utatur, narium mucus cum superiori linimento educatur, spina dorsi porro inungatur, lateri dolenti emplastrum præscriptum imponatur, & diæta hætenus consueta strenuè observetur.



## Tertia continuatio & resolutio Historiæ Morbi,

Eodem AUTORE.

**S**erenissimum Principem die decimo octavo Augusti denuo conveni, & non plus emaciatum observavi, quàm erat ultimâ vice, quâ ipsum reliqueram. Labra fuerunt rubra, pulsus frequens, celer & parvus, respiratio satis libera erat, dum decubuit, unde clarâ & masculâ voce loquebatur instar sani absque ulla raucedine: decumbere potest humiliter, non altè, faciliùs tamen in sinistrum quàm dextrum latus: sputum adhuc est turbidum, subflavum, crassum, aliquando fluidum, & nonnunquam cruore tinctum, urina habet sedimentum copiosum naturale: appetit egregiè, ut duos pullos in pasta come-



comedat: non multum sitit, fauces tamen quandoque exarescunt, quas aquæ pauxillo facile humectat: nares obstruuntur frequenter ab exsiccato muco, alvus non est fluida, corpus non sudat. A decubitu non amplius exoriatur, quod imprimis emplastro de spermate ranarum præcaveretur, nares nonnunquam irritatæ sanguinem stillant, insuper observavi, Serenissimum Principem largiter comedere, nam in quolibet pastu assumit jusculi, contuso carniū & pane trito imprægnati, libram dimidiam, dein edit pullum assum integrum, & elixum ferè totum, quandoque simul cancros elixos, pulpam pomorum & pyrorum pastæ farinacæ inclusam, placentulas & frustum panis quatuor unciarum pondere: bibit suum decoctum in pastu mediocriter, quandoque extra pastum sumit unum alterumve haustum: comesta retinet, & licet ob vehementiam tussis quandoque portionem evomat, illa tamen vix centesima assumptorum pars est, eadem exactè concoquit, ut ex fæcibus & urinis laudabilibus colligitur: urcunq; autem strenuè comedat, habitus tamen corporis nulla incrementa sumit, & post pastum semper nunc plùs nunc minùs incalescit. Deniq; adverti, spacio viginti quatuor horarum insignem quantitatem puris in pectore cumulatam fuisse, quâ per validam tussim excretâ, nunc cum dolore lateris punctorio, nunc immixtis striis cruentis induciæ concedebantur, & per horas plures etiam duodecim à tussi liberius respirabat, ac masculâ, clarâ & sonorâ voce nonnunquam etiam cum quodam impetu loquebatur, sæpe citra ullum ad tussim irritamen, quod ante sputum purulentum

reje-

rejectum non licuit; imò illo adhuc copiosiore existente animadverti levicula ex causa tussim concitare, intra asperam arteriam stridere, respirationem difficilem efficere, vocem aliquo modo rancam reddere, & si nimis fluidum sit, suffocationem intentare, in primis paulò post pastum, quo tempore semper pus fluidius comperi, nam longiùs post pastum maximè somnum protractiorem crassum est, & uni alterive impulsui à tussi promptiùs cedit, ac sine magnâ vi portio in globum compacta expellitur.

## R E S O L U T I O.

**E**X omnibus istis satis superq; colligitur, sinus pulmonum exulceratos quotidie plurimum puris cumulare & producere tum ex chylo recenter sanguini advesto, tum ex sanguine ipso: insuper elucescit, sputum purulentum collectum pulmonibus molestum esse, & ad tussim validè stimulare, nec quietem concedere, donec maximam partem rejectum fuerit: num autem portiones purulentæ ex sinibus pulmonum ulcerosis intra vasa sanguifera resorbeantur? valde mihi probabile videtur ex totius habitûs consumptione, incallescenciâ post pastum & virium languore, ob quem diu moram extra lectum tolerare nequit, multò minùs incedere valer: non tamen sanguini multùm de pure permisceri credibile est, cum Serenissimus Princeps egregiè appetat, benè in ventriculo & intestinis concoquat, vegetus in lecto appareat,

pareat, & naturalia vesicæ & alvi excrementa reddat. Ad maiorem puris consumptionem sæpe cochlear plenum de sequenti syrupo sumatur. *R. radic. tussilag. ℥j. liquir. ras ℥℔. herb. tussilag. veronic. scabios. farfar. sanicula, alchimill. ā Mij. bellid. minor. Mij. flor. hypericon. Mj. sem. anisi ℥iij. ficuum recent. num. xvj. passular. major. exacinat. ℥ij. coq. in aq. font. q. s. cum colatura & saccharo sufficienti paretur syrupus.* Quoniam autem spiritum purulentum crebro seri accessu nimis tenuē evadit, & nihilominus ad excretionem irritō successu stimulat, illud necessariō inspissandum erit in primis noctu, ne tussis irrita somnum interrumpat, unde circa horam decimam nocturnam, & quando vigiliæ molestæ sunt, cochlearia aliquot plena de sequenti syrupo usurpentur. *R. Diacodii Montani ℥j. syrup. papav. alb. fl. bellid. minor. ā ℥℔. aq. lactuca ℥j. misce.* alternis etiam noctibus pilulæ tres de cynoglossō ex correctione Faventini aut Zuelferi sumantur, insuper lactis suctione & diætâ consuetâ exactē pergendū erit. Tandem superest ardua quæstio decidenda, num liceat Serenissimo Principi *Basileæ Rheinovium* proficisci. Iter hoc summopere dissuadere videntur primū vires maximē debiles, quas in primis prodit difficilis tolerantia brevioris etiam moræ extra lectum, pulsus frequens, celer, parvus & habitus corporis valde attenuatus, inde ob motum & succussionem vix evitabilem spiritus magis dissiparentur, ut facile leipothymia aut ob spirituum vitalium paupertatem periculosa syncope accerferi posset: deinde magna adest in sinibus pulmonum post vomitam relictis copia puris, quæ ab eadem corporis & pectoris concussione comoveri & uno impetu

impetu ad præcipuos bronchiorum ramos præcipitari & suffocationem intentare valeret: denique aër in via varius non parùm pulmones turbabit varièque sputum immutabit, inprimis hoc tempore autumnali, in quo semper anomalus est, cùm e contra Serenissimus Princeps hætenus aeri sicco phthificis utilissimo assueverit, adeo ut vix sine manifestâ noxa toleraturus sit aërem humidum & nebulosum, pulmonibus aliàs aggravatis nocentissimum. Ne igitur in itinere Celsit. sua gravissimo damno obruatur, primùm opera danda erit, ut quàm minimùm succutiat, quod commodissimè fiet, si portabitur à viris robustis hanc demandatam provinciam alternantibus: dein iter demum instituitur, quando aër à nebulis purus est, nec nimium fervet. scilicet ab horâ nonâ matutinâ antimeridianâ ad undecimanâ, & postea ab horâ secundâ aut terciâ pomeridianâ ad horam quintam vel sextam: tertio iter non nisi comite Medico suscipiendum est, cui in promptu sint. medicamenta spiritus vitales excitantia & refocillantia, nempe balsamum apoplecticum & spiritus salis armoniaci urinosus, aut sequens aqua & rotulæ cordiales. R̃. aq. cardiac. offic. borrag. scabios. ā ʒij. cinamom. ʒj. confect. alkerm. ʒiʒ. lapid. bezoar oriental. ʒʒ. margarit. præp. ʒj. sacch. ros. tab. ʒij. F. aqua cardiaca. R̃. confect. alkerm. ʒiij. ambr. gris. cum spiritu rosar. solut. ʒʒ. moschi opt. gr. ij. margarit. præp. ʒʒ. lapid. bezoar oriental. ʒj. sacch. opt. in aq. rosar. cinam. & scabios. solut. ʒvi. F. s. a. rotula. Si verò sputum permolestum sit, & dyspnœam aut vehementem tussim excitet, syrupi pectorales, supra nominati exhibeantur, & noctu inprimis diaçodium Montani usurpetur.

Quarto

tavit viam suam proximè *Rheinovium* ingredi, sed præpotens *Jehova* statuit gressum ejus: cum enim quinto Octobris die circa horam tertiam matutinam irritus tussiendo conatus longum durasset, è rupto vase pulmonico inopinata lethalis hæmorrhagia successit, quippe uncias duas sanguinis floridi & spumosi per pulmonis fistulam tussi ejecit, unde ex præsentanea suffocatione Serenissimus Princeps huic mundo valedixit.

Impetratâ Superiorum veniâ manè præsentibus Viris Clarissimis, *Dn. Jacobo Rothio*, Anatomico & Botanico, ac *Dn. Nicolao Eglingero*, Physico, Professoribus solertissimis, nec non *Dn. Johanne Conrado Wepfero*, Magni Patris Filio ingenuo, Philiatro industrio, ut & *Johanne Michaeli Riespachio* ac *Isaco Schvvarzio*, Chirurgis exercitatis, ad causam morbi & mortis plenius & planius indagandam, corpus evisceratum fuit. Aperto thorace, ubi fontem malorum latuisse Celebres Germaniæ Medici, *Dn. Sigismundus Closius* & *Dn. Johannes Wolfgangus Mögling*, SERENISS. PRINCIP. MARCHION. BADENS. ET HOCHBERG. Archiatri felicissimi, etiam calculum suum addiderunt, pulmo cum impetu quasi profiliens, stupendum in modum inflatus, universam pectoris cavitatem implevit, cujus tota pars dextra à lobo superiore usque ad inferiorem, sinistra pars autem ratione inferioris lobi tam firmiter pleuræ & costis annata erat, ut non sine labore illas separaverimus, quod fatum Serenissimo Principum Divo FERDINANDO Imperatore, & FRANCISCO Primo, Rege Galliarum, commune fuit. Exemptâ pulmonis com-

page observavimus ferè ubivis illam naturali suâ texturâ, spongiosâ nempe & rarâ, orbatam fuisse, etenim tota illius exterior superficies innumeris ulcusculis, instar acinorum, quos pro *Marcelli Malpighij*, insignis Anatomici, vesiculis orbicularibus dilatatis agnovimus, obsessa fuit, intermediâ saltē sinistrâ pulmonis parte, sanâ. In quibusdam cavernulis saniem recentem invenimus, in aliis plurimis pus foetidum colligebatur, unde dubio procul contigit, quòd Serenissimus Princeps aliquando à duabus vel tribus septimanis citra ullam respirationis difficultatem & tussis molestiam parùm puris ejecerit, seque tunc temporis extra jactum lethiferi teli positum esse sibi firmiter persuaserit. Porro cùm multæ cavernulæ in bronchia sive fistulæ pulmonum aut asperæ arteriæ ramulos manifestum aditum habuerint, mirum non erat, aliquando post mediam noctem, sæpius autem summo manè, pus compactum & globosum ad uncias usque duas à Serenissimo Principe ejectum fuisse; etenim tale in prædictis asperæ arteriæ propaginibus nimium dilatatis perspicuè apparuit. Insuper in dextra pulmonis parte vomicam, nucis moschatae æqualem, pure foetidissimo refertam, nec non vasa pulmonica ampliora & turgentiora, sanguinemque per pulmonem hinc inde dispersum notavimus, ut de vasis pulmonici ruptura dubitandum non sit. Fistula pulmonis tum sanguine florido, tum grumoso, repleta erat, unde causa elucescit, cur ultimus naturæ agon nec per dimidium horæ quadrantem durârit. Cor nectaris vivifici fontem deprehendimus nulla singulari labe infectum, nisi quod parenchy-

ma il-

ma illius non ita solidum, sed propter morbi diuturnitatem paulò laxum fuerit: humor serosus in pericardio copiosus erat, unde manifestum, perpetuæ veritatis non esse sententiam illorum, qui statuunt, humorem hunc pericardii in hæticorum cadaveribus exiguum reperiri: Vir clarissimus, *Dn. Victor Schneiderus lib. II. de catarrhis cap. IX.* asserit, se contrarium semper offendisse, pluribusque experimentis hoc verum cognovisse, unde excellentissimus Vir *Christophorus Maius*, Electoris Brandenburgici Archiater, atque cum eodem honore nominandus *Johannes Daniel Horstius*, ille quidem literis ad ipsum datis, hic sua septima observatione anatomicâ hoc idem confirmarunt. Aperto abdomine viscera principaliora, ventriculus, mesenterium, hepar, splen, renes reliquæque infimi ventris partes ab omni morbo liberæ inventæ sunt. Quapropter ex prædictis elucescit clariùs, quàm radii solis esse solent, cum sudum est, stupendum istum coalitum cum pleurâ in dextro latere mortem Serenissimo Principi acceleravisse, quum in istis validis accretionibus pulmones ritè se constringere, ac materiam purulentam in bronchia exprimere nequeant, virtutem enim constringentem ope nervorum pulmonibus inesse, accuratè ut omnia demonstrat accuratissimus Anatomicus *Thomas Willisius*, nuper eheu rebus humanis magno cum latices damno exemptus, in sua *cerebri anatomia cap. XXIV.* cujus verba lectu dignissima, utramque de vero pulmonum motu paginam absolventia, heic subnectere Lectori benevolo non ingratum erit. E cordis regione truncus nervi paris vagi plures insignes ramos utrinque di-

mittit, qui in omnes quaquaversus pulmonum lobos, tracheæ bronchia ac œsophagi juxta descenditunicam disseminantur, qui rami in pulmones abeunt, ubique per totas illorum compages arteriarum & venarum ramificationes, atque bronchiorum ductus assequuntur, quos equidem sanguinis ac aëris canales in toto illorum tractu variè supercandunt & circumligant. Quandoquidem tot insignes nervorum ramificationes pulmonibus impenduntur, mirum est, ipsas à nonnullis insensiles ac per se immobiles statui. Quippe recepta opinio est, istam pulmonum reciprocationem à thoracis motu omnino procedere, ejusque dilatationi & constrictioni necessariâ quâdam dependentiâ obsequi, nempe pectus dilatatum follium ritu aerem ambientem in tracheam cogere, qui in pulmones irruens ipsos inflat ac distendit; dein eodem pectore ultrò subsidente, pulmones ipsius pondere compressos aerem prius intrusum denuo expirare. Revera utrumque existimem diaphragma ac pectoris musculos respirationi multum conducere, tamen partes istas hoc munus solitariè perficere & pulmones merè passivos esse, minimè concedo: nam respiratio sanguinis ac cordis gratiâ præcipuè instituitur, ejusque actus pro varia horum crasi determinari & pro multiplici pulsus necessitate fere quâvis horæ minutâ alterari solet: ac vero ipsi pulmones sunt (ac minimè diaphragma aut thoracis musculi) quos sanguis è corde ebulliens pertransit, & juxta temperiem suam atque pulsus tenorem continuò afficit: quare hinc concludere licet, ipsos pulmones primos motuum suorum instinctus concipere



cipere, & prædictorum nervorum ope sese aliquatenus exerere, atque systolem & diastolem moliri, easque juxta propriæ necessitatis sensum designare, cum verò his fibræ pro motu locali requisitæ desint, ideo diaphragma & thoracis muscoli pulmonum inceptis è vestigio succenturianrur, atque horum connexu respiratio completa efficitur: cumque adeo nervi duplicis generis, nempe quidam à spina diaphragmati & thoracis musculis inserti, aliique à pari vago in pulmones distributi organa respirationis actuant, proinde fit ut ipse respirationis actus per se *aliquando* & involuntarius pro libitu nostro aliquantum cohiberi, interrumpi ac diversimodè alterari possit. Hæc *Willisius*.

Ex præcedentibus consiliis, epistolis & annexa historia anatomica intelligunt benigni reum Æstimatores, in promovenda Serenissimi Principis valetudine prospera nihil intermissum, omniaque medicamenta præscripta fuisse, quæ ad tollendum hunc affectum ullâ arte inveniri potuerint: sed *autem* exitusque ostendit

*Quòd morbus fuerit nullis medicabilis herbis.*  
Tandem moriendum, & sive ocyùs sive seriùs calcanda lethi via est.

HVMANA CVNCTA

FVMVS VMBRA VANITAS

SCENÆ IMAGO

ET VT LIPSÌ VERBO ABSOLVAM  
NIHIL.



# INDEX I. OBSERVATIONVM.

## I.

|                                                        |          |
|--------------------------------------------------------|----------|
| <b>C</b> oeliaca passio cum Ischuriâ singulari.        | pag. 1.  |
| II. Rara urinæ suppressio.                             | pag. 4.  |
| III. Vagitus Uterinus.                                 | p. 9.    |
| IV. Ascites Tympaniticus.                              | p. 11.   |
| V. Bubonocoele.                                        | p. 14.   |
| VI. Vermiculus cerebri.                                | p. 15.   |
| VII. Potus sanguinis humani in Epilepsia.              | p. 18.   |
| VIII. Empyema Thoracis.                                | p. 20.   |
| IX. Calculus renis sinistri.                           | p. 23.   |
| X. Lethargus.                                          | p. 25.   |
| XI. Convulsio rara.                                    | p. 27.   |
| XII. Ophthalmia.                                       | p. 28.   |
| XIII. Menstruorum rejectio per vomitum.                | p. 34.   |
| XIV. Humorisi aquei regeneratio.                       | p. 36.   |
| XV. Pleuritis periodica.                               | p. 39.   |
| XVI. Phthisis pulmonum.                                | p. 42.   |
| XVII. Asthma calculosum.                               | p. 44.   |
| XVIII. Ranula sub lingua.                              | p. 47.   |
| XIX. Pterygium.                                        | p. 48.   |
| XX. Gravidam menstruata.                               | p. 49.   |
| XXI. Febris quartana.                                  | p. 51.   |
| XXII. Casus medicinalis & responsum de calculis renum. | p. 52.   |
| XXIII. Convulsio comitialis.                           | p. 61.   |
| XXIV. Puella octennis menstruata.                      | p. 65.   |
| XXV. Ramus venæ arteriosæ rejectus.                    | p. 66.   |
|                                                        | XXVI. O- |

# INDEX OBSERVATIONVM

|                                                |          |
|------------------------------------------------|----------|
| XXVI. Odontalgia.                              | pag. 67. |
| XXVII. Secundinarum retentio.                  | p. 69.   |
| XXVIII. Ascites.                               | p. 70.   |
| XXIX. Alvus adstricta.                         | p. 80.   |
| XXX. Convulsiones à lumbricis ortæ.            | p. 81.   |
| XXXI. Dolor hæmorrhoidum.                      | p. 82.   |
| XXXII. Menstrua suppressa.                     | p. 83.   |
| XXXIII. Colica.                                | p. 84.   |
| XXXIV. Variolæ cum diarrhœa.                   | p. 85.   |
| XXXV. Icterus flavus.                          | p. 86.   |
| XXXVI. Profluvium feminis ex impuro concubitu. | p. 87.   |
| XXXVII. Hæmoptysis.                            | p. 88.   |
| XXXVIII. Fluxio hæmorrhoidum immodica.         | p. 89.   |
| XXXIX. Lochiorum suppressio.                   | p. 90.   |
| XL. Cephalæa.                                  | p. 91.   |
| XLI. Asthma.                                   | p. 94.   |
| XLII. Tortura oris.                            | p. 95.   |
| XLIII. Convulsio Universalis.                  | p. 97.   |
| XLIV. Febris hæctica in puerulo.               | p. 98.   |
| XLV. Febris continua putrida.                  | p. 99.   |
| XLVI. Tussis contumax cum orthopnœa.           | p. 101.  |
| XLVII. Tormina post partum.                    | p. 103.  |
| XLVIII. Cardialgia.                            | p. 104.  |
| XLIX. Ventriculi dolor cum tumore.             | p. 105.  |
| L. Partus difficilis.                          | p. 106.  |
| LI. De usu Cantharidum.                        | p. 107.  |
| LII. De calculo vesicæ.                        | p. 108.  |
| LIII. Pestis.                                  | p. 112.  |
| LIV. Pestis.                                   | p. 117.  |
| LV. Pestis cum anthrace.                       | p. 119.  |

# *INDEX OBSERVATIONVM.*

|                                               |         |
|-----------------------------------------------|---------|
| LVI. Pestis cum bubone.                       | p. 120. |
| LVII. Pestis sine febre.                      | p. 121. |
| LVIII. Pestis propter administratam venæse-   | p. 123. |
| ctionem funesta.                              |         |
| LIX. Pestis cum pleuritide.                   | p. 127. |
| LX. Pestis cum bubone.                        | p. 128. |
| LXI. Pestis maculosa.                         | p. 130. |
| LXII. Pestis cum IV. carbunculis.             | p. 132. |
| LXIII. Pestis cum ingente carbunculo.         | p. 134. |
| LXIV. Pestis cum hæmorrhagiâ narium le-       | p. 135. |
| thalis.                                       |         |
| LXV. Pestis.                                  | p. 136. |
| LXVI. Amuletum pestis periculosum.            | p. 138. |
| LXVII. Curatio bubonum pestilentium chirur-   | p. 141. |
| gica.                                         |         |
| LXVIII. Curatio anthracum pestilentium chi-   | p. 144. |
| rurgica.                                      |         |
| LXIX. Melancholia hypochondriaca.             | p. 145. |
| LXX. Melancholia hypochondriaca lethalis.     | p. 150. |
| LXXI. Morbus Virgineus.                       | p. 151. |
| LXXII. Dolor colicus pro nephritico habitus.  | p. 153. |
| LXXIII. Hypercatharsis ex præpostero hellebo- | p. 157. |
| ri nigri usu.                                 |         |
| LXXIV. Angina.                                | p. 159. |
| LXXV. Uvulæ relaxatio.                        | p. 161. |
| LXXVI. Uvulæ casus.                           | p. 161. |
| LXXVII. Raucedo diuturna.                     | p. 162. |
| LXXVIII. Icterus flavus cum scirrho hepatis,  | p. 164. |
| asthmate, & ascite tympanitico.               |         |
| LXXIX. Con                                    |         |

# INDEX OBSERVATIONVM.

|                                                                  |         |
|------------------------------------------------------------------|---------|
| LXXIX. Confimilis priori affectus.                               | p. 168. |
| LXXX. Dysenteria.                                                | p. 187. |
| LXXXI. Iliaca passio à ruptura.                                  | p. 192. |
| LXXXII. Abortus.                                                 | p. 195. |
| LXXXIII. Visus imbecillitas.                                     | p. 199. |
| LXXXIV. Crurum imbecillitas hepatis atonia,<br>Virium languor.   | p. 202. |
| LXXXV. Dentitio funesta.                                         | p. 209. |
| LXXXVI. Ambustio periculosa, et subsequuta<br>dentitio lethalis. | p. 217. |
| LXXXVII. Exomphalus.                                             | p. 221. |
| LXXXIIX. Convulsiones à lochiorum sup-<br>pressionem.            | p. 226. |
| LXXXIX. Tumor canerosus in mamma dex-<br>tra.                    | p. 228. |
| XC. Cordis palpitatio.                                           | p. 232. |
| XCI. Gravis auditus.                                             | p. 235. |
| XCII. Pica.                                                      | p. 238. |
| XCIII. Phrenitis.                                                | p. 240. |
| XCIV. Mania.                                                     | p. 242. |
| XCV. Peripneumonia.                                              | p. 245. |
| XCVI. Icterus niger.                                             | p. 247. |
| XCVII. Renum hæmorrhagia.                                        | p. 250. |
| XCVIII. Renes exulcerati.                                        | p. 252. |
| XCIX. Dolor ischiadicus.                                         | p. 254. |
| C. Rarus pulmonis affectus.                                      | p. 257. |



## INDEX II.

### Autorum, qui citantur.

#### B.

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| <b>P</b> aulus Barbette.      | pag. <u>142.</u>                  |
| Thomas Bartholinus.           | <u>11. 17. 24. 35. 47.</u>        |
|                               | <u>50. 63. 67. 108. 158. 185.</u> |
| Casparus Bauhinus.            | <u>7. 23. 24. 40.</u>             |
| Johannes <i>Beverovicus</i> . | <u>8.</u>                         |
| Gerhardus Blasius.            | <u>217.</u>                       |
| Theophilus Bierlingius.       | <u>239.</u>                       |

#### C.

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Cornelius Celsus.       | <u>18. 147.</u> |
| Claudius de la Courvée. | <u>50.</u>      |
| Realdus Columbus.       | <u>37.</u>      |

#### D.

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Antonius Deusingius.   | <u>10. 138. 139.</u>       |
| Isbrandus Diemerbroek. | <u>122. 125. 130. 133.</u> |
|                        | <u>136. 139.</u>           |
| Rembertus Dodonaus.    | <u>36.</u>                 |

#### F.

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Johannes Fernelius. | <u>2. 7. 24. 124. 182.</u> |
| Petrus Forestus.    | <u>17. 239. 251.</u>       |

#### G.

|                   |                                    |
|-------------------|------------------------------------|
| Claudius Galenus. | <u>31. 32. 33. 37. 46. 49. 76.</u> |
|                   | <u>121. 132.</u>                   |

# INDEX AVTORVM.

p. 121. 132. 154. 198. 230. 233.

*Oswaldus Grembsius.* 236.

*Franciscus Glissonus.* 170.

*Georgius Guarnerus.* 138.

## H.

*Johannes Hartmannus.* 82.

*Nathanael Highmorus.* 24.

*Fabricius Hildanus.* 17. 28. 32. 110. 137.

217. 218. 222. 229.

*Hippocrates.* 32. 49. 69. 76. 188. 192. 197.

210. 216. 254.

*Wolfgangus Höferus.* 214.

*Jacobus Hollerius.* 110.

## I.

*Simon Jacozius.* 93.

*Franciscus Joël.* 214.

*Johannes Jonstonus.* 9.

## K.

*Jacobus Franciscus Kotzbac.* 108.

## L.

*Johannes Langius.* 20.

*Andreas Laurentius.* 37.

*Johannes Lindenius.* 25.

*Johannes Löselius.* 8.

*Amatus Lusitanus.* 36. 40.

## M.

*Dominicus de Marchettis.* 8.

*Hieronimus*

# INDEX AVTORVM.

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| <i>Hieronymus Mengus.</i>      | p. <u>146.</u>        |
| <i>Ludovicus Mercatus.</i>     | <u>36.</u>            |
| <i>Hieronymus Mercurialis.</i> | <u>133. 138. 214.</u> |
| <i>Gothofredus Mæbius.</i>     | <u>25. 217.</u>       |
| <i>Johannes Morellus.</i>      | <u>123.</u>           |

## N.

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <i>Gualtherus Needham.</i> | <u>10.</u> |
|----------------------------|------------|

## P.

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| <i>Julius Palmarius.</i>        | <u>138.</u>                   |
| <i>Dominicus Panarolus.</i>     | <u>25.</u>                    |
| <i>Ambrosius Pareus.</i>        | <u>36. 92. 138. 215. 230.</u> |
| <i>Guido Patinus.</i>           | <u>16.</u>                    |
| <i>Simon Pauli.</i>             | <u>14.</u>                    |
| <i>Pharmacopœa Londinensis.</i> | <u>228.</u>                   |
| <i>Felix Platerus senior.</i>   | <u>4. 244.</u>                |
| <i>Caius Plinius.</i>           | <u>18.</u>                    |
| <i>Antonius Portus.</i>         | <u>138. 215. 230.</u>         |

## R.

|                           |                                              |
|---------------------------|----------------------------------------------|
| <i>Johannes Rhodius.</i>  | <u>35. 38. 147.</u>                          |
| <i>Johannes Riolanus.</i> | <u>8. 23. 24. 37. 40. 93. 156. 160. 217.</u> |

## S.

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| <i>Angelus Sala.</i>        | <u>80.</u> |
| <i>Claudius Salmasius.</i>  | <u>9.</u>  |
| <i>Philippus Salmuthus.</i> | <u>36.</u> |
| <i>Serenus</i>              |            |



# INDEX AVTORVM.

|                                        |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| <i>Serenus Samonicus.</i>              | p. <u>214.</u>        |
| <i>Hercules Saxonia.</i>               | <u>17. 65.</u>        |
| <i>Joannes Schenckius.</i>             | <u>17. 36. 111.</u>   |
| <i>Daniel Sennertus.</i>               | <u>214.</u>           |
| <i>Reinerus Solenander.</i>            | <u>85.</u>            |
| <i>Joh. Stephanus Strobelbergerus.</i> | <u>215.</u>           |
| <i>Franciscus de le Boe Sylvius.</i>   | <u>213. 217. 263.</u> |
|                                        | <u>272.</u>           |

## T.

|                                          |                                             |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <i>Balthasar Timaeus von Guldenflee.</i> | <u>213.</u>                                 |
| <i>Nicolaus Tulpus.</i>                  | <u>12. 17. 19. 22. 24. 38.</u>              |
|                                          | <u>64. 67. 70. 147. 180. 231. 237. 239.</u> |

## V.

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| <i>Christophorus à Vega.</i> | <u>251.</u> |
| <i>Johannes Veslingius.</i>  | <u>24.</u>  |

## W.

|                                          |                       |
|------------------------------------------|-----------------------|
| <i>Johannes <u>Jacobus</u> Wepferus.</i> | <u>160. seq. 204.</u> |
|                                          | <u>223.</u>           |
| <i>Thomas Willisius.</i>                 | <u>220. 309.</u>      |

## Z.

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| <i>Zacutus.</i> | <u>17. 36.</u> |
|-----------------|----------------|

## INDEX



## INDEX III.

### *Rerum precipuarum.*

#### A.

- A** Bortus. pag. 195.  
Aloetica remedia convulsiones à ventriculo  
ortas tollunt. 62.  
Alvi adstrictio. 80. remedium adversus eam. *ibid.*  
Amuletum pestis periculosum. 138.  
Angina quomodo curanda. 159. 160.  
Anthraces pestilentes. 144. eorum curatio chi-  
rurgica. *ibid.*  
Aqua anti-phthifica. 262.  
Aquæ frigidae potus æstuant corpore noxius. 260.  
Arsenicum an contra pestem profit? 139.  
Arteriotomia præstantissimum adversus cepha-  
læam remedium. 91.  
Ascites. 70. ascites tympaniticus, II. an paracente-  
sis in ea adhibenda? 12.  
Asthma. 94. asthma calculosum. 44. ejus cura.  
p. 44. 45.  
Auditus gravis. 235. remedia contra illum varia  
commemorantur. 237.

#### B.

- Balsamum sulphuris an in phthisi adhibendum?  
p. 268. 272.  
die Vesitæ dentitio spuria quid sit? 215. quomodo  
curanda? 216.  
Bubonocèle in abscessum degenerans curata. 14.  
Bubones

INDEX RERVM PRAECIP.

Bubones pestilentes. [141.](#) eorum curatio chirurgica. *ibid.*

C.

Calculus vesicae. [109.](#) calculus in uretere sinistro. [5.](#) renis sinistri. [23.](#) ureterem dilatat. [24.](#) calculos CCC. minxit anus in Belgio. [25.](#)

Cancer contagiosus morbus. [231.](#) [232.](#) in cancris occultis emollientia remedia nocent. [229.](#) [230.](#)

Cantharidum usus. [107.](#)

Carbunculi in peste, quod plures, eò gravius periculum imminet. [133.](#)

Cardialgia [104.](#) pulvis contra eam. *ibid.*

Catheter immissus calculum non semper indicat sed saepe. [109.](#) [110.](#)

Cephalaea. [91.](#)

Cerebri vermiculus. [15.](#) in cerebro generari vermiculos probatur testimoniis & exemplis variis. [16.](#) [17.](#)

Christianus II. Rex Daniae in utero vagit. [10.](#)

Chocolatae usus. [280.](#) [281.](#)

Cichoreae remedium praestantissimum adversus melancholiam hypochondriacam. [147.](#)

Cœliaca passio. [1.](#)

Colica. [84.](#) colicus dolor pro nephritico habitus. [154.](#) quæ erroris causa. *ibid.* quomodo & quibus signis distingui possint. [155.](#)

Collyria in ophthalmia non statim adhibenda. [33.](#) anodyna & exsiccantia in vulneribus oculorum profunt. [38.](#)

Combustiones membrorum & praesentissimum contra eos unguentum. [218.](#)

Convul-

## INDEX RERVM PRAECIP.

Convulsionēs ab ictu lapidis in temporibus fini-  
stris. 27. causa earum proxima. 28. Convulsio  
comitialis. 61. universalis. 97. convulsionēs à  
lumbricis ortæ. 81. à dentitione. 220. à lochio-  
rum suppressione. 226.

Cordis palpitatio venæsectione præcipuè tollitur,  
pag. 232.

Crurum imbecillitas sublata. 203.

### D.

Dentitio funesta. 209. an excrementa biliosa den-  
titionem dubiosam reddant vel potius bilis e-  
bullitionem arguant? 210. an dentitio sit mor-  
bus contagiosus? 211. quib. remediis dentitio  
infantum difficilis & periculosa præcaveri pos-  
sit. 213. Dentitio notha dicitur *Sciss* dicta. 215. den-  
titio periculosa & molesta qua ratione præca-  
venda. 219. tussicula periculosæ dentitionis pro-  
dromus. *ibid.* quomodo dentitio atroces & diu-  
turnas convulsionēs excitare possit. 220.

Dysenteria. 187.

### E.

Electuarium antiphthasicum. 262.

Electuarium prophylacticum contra pestem. 140.

Epilepsia. 18. an potu sanguinis humani curari pos-  
sit. 18. aliquando ex ventriculo originem tra-  
hit. 62. 63. aliquando ex liene. 64.

Exomphalus. 221. quid sit? 222. quæ ejus causæ. *ibi.*  
quomodo curandus. 223. multa fomenta no-  
cent. 225.

Exorcismus Medicorum. 146.

F. Febris

## INDEX RERVM PRAECIP.

---

### F.

Febris hectica in puerulo. [98.](#) Febris continua putrida. [99.](#) Febris lenta. [203.](#) Febris quartana sublata sacculo purgante. [51.](#)

Fonticuli ad pestis praeservationem maximè utiles. [137.](#)

### G.

Gravidæ [pica laborantes. 238.](#) [curantur. 239.](#) Gravidis an & quomodo sanguis mittendus? [197.](#)  
Gravida menstruata sine noxa fœtus. [49.](#)

### H.

Hæmoptysis. [88.](#)

Hæmorrhagia narium in peste lethalis. [136.](#) hæmorrhagia renum. [250.](#)

[Hæmorrhoides. 82.](#) fluxio earum immodica. [89.](#)  
quid in ejus cura notandum? [89.](#)

Hellebori nigri præposterus usus noxius. [157.](#)

Hepatis atonia. [203.](#)

Hirundines quâ cautelâ adhibendæ. [83.](#)

Humoris aquei in oculo quis usus? [36.](#) ejus regeneratio. [37. 38.](#)

Hypercatharsis ex præpostero hellebori nigri usu [157.](#)

### I.

Icterus flavus [26.](#) cum Scirrho hepatis, asthma & ascite

ascite tympanitico 164. consimilis affectus. 168.

Icterus niger. 247.

Iliaca passio à ruptura. 192.

Infantes quando dentire incipiant? 216.

Ischiadicus dolor. 254.

Ischuria miranda. 2. ejus causa, an obtusus vesicae sensus. 3.

L.

Lactis usus singularis. 276. muliebris saluberrimus. 278. quomodo instituendus. 283.

Lapilli è pulmonibus per tussim excreati. 45. 46.

Laudanum opiatum adversus dentium dolorem commendatur. 68. contra dolorem ischiadicum etiam utiliter adhibetur. 225.

Leporis urina auribus instillata gravi auditui medetur. 237.

Lethargus. 25. curatus. 26. 27.

Linaria famosum contra hæmorrhoides dolentes remedium. 83.

Lochiorum suppressio. 91. convulsiones parit. 226.

Lumbrici convulsiones causantur. 81.

M.

Majoranae succus auribus instillatus auditum amissum restituit. 236.

Mania 242. remedia illi tollendæ utilia. 242.

Melancholia hypochondriaca curata. 145. lethalis. 150.

Melancholicorum exempla varia. 64. 147. 150. illis à Medico sæpe assentiendum. 147. 148.

Menstrua

## INDEX RERVM PRAECIP.

Menstrua quinto & octavo anno in puellis observata. 65. item in gravidis 49. menstrua suppressa. 83. menstruorum rejectio per vomitum. 34. cutata. 35. exempla menstruorum per alias corporis partes ejectorum. 35. menstruorum fluxus foetui non semper nocet. 49. 50.

Mindereri syrupus aperitivus. 243.

Morbus virgineus. 151.

### N.

Nephriticus dolor quibus signis à colico distinguitur. 157. 156.

### O.

Odontalgia 67. laudano opiato mitigata. 68.

Ophthalmia. 28. quid in ejus cura observandum. 31. & seqq.

Oris tortura curata. 95.

### P.

Palpitatio cordis. vide Cordis.

Paracentesis est remedium anceps. 180.

Partus difficilis. 106.

Passulae purgantes. 80.

Peripneumonia. 245.

Pestis. 112. 117. 137. cum anthrace. 119. cum bubone. 120. 128. rara sine febre. 121. similis à Galeno observata 122. propter administratam venæsectionem fumesta. 123. cum pleuritide. 127. maculosa lethalis. 130. 131. cum quatuor carbunculis 132. cum ingenti carbunculo. 134. cum hæmorrhagia narium lethalis. 135.

- Pharmacopœi, ad medicinam exercendam furtim se ingerentes, redarguuntur. [158.](#)
- Phebotomiæ an gravidis [conducant.](#) [197.](#) in iis Veteres librarum pondere sanguinem educebant, sæpe non sine vitæ jacturâ. [198.](#)
- Phrenitis. [240.](#) ejus cura *ibid.*
- Phthisis pulmonum. [42.](#) ejus [cura.](#) [43.](#) [66.](#) [262.](#) aqua anti-phthisica *ibid.* decocto Guajaci pellitur. [273.](#)
- [Pica.](#) [238.](#) gravidæ ea maximè laborant *ibid.* remedia contra eam. [239.](#)
- Plateri* aqua contra gravem auditum & tinnitum aurium. [236.](#) trochisci contra ulcera renum & vesicæ commendantur. [250.](#)
- [Pleuritis.](#) [21.](#) venæsectio in ea summè necessaria. *ibid.* pleuritis periodica. [39.](#) ejus causa proxima. [40.](#) [41.](#) pesti accedens lethalis est. [127.](#)
- Poterii* pulvis anti-hecticus commendatur. [263.](#)
- Pulmonis affectus [rarus.](#) [257.](#) lapilli ex pulmonibus per tussim excreati. [45.](#) [46.](#)
- Pulvis contra cardialgiâ. [104.](#)

R.

- Ranula sub linguâ. [47.](#) quid in ejus curâ observandum. [47.](#)
- Rauco do diuturna sublata. [162.](#)
- Remediorum proficuorum continuatione plus præstatur, quàm alternatione incerta. [268.](#)
- Renes exulcerati. [252.](#) renum hæmorrhagia. [250.](#) eorum uno obstructo alter sæpius officio suo fungi non potest. [5.](#) hoc frustra à quibusdam negatur. [7.](#) [renum](#) calculus, *vide* calculus.

Rosarum



Rosarum rubrarum conserva an multum praestet in  
phthisi. [263.](#)

S.

Sanguinis humani potus epilepticis malè praescri-  
bitur. [18.](#) [19.](#) timidum audacem fecit. 20.

Secundinarum redditio procurata pulvere sternu-  
ratorio. [69.](#) aliis remediis. [70.](#)

Seminis profluvium ex impuro concubitu, [87.](#)

T.

Thoracis empyema. 20.

Tormina post partum. 103.

Tortura oris. *vide* oris.

[Trochisci contra pestem.](#) [140.](#) ulcera renum & ve-  
sicum. 253.

Tumor cancriosus sive cancer in mammâ dextrâ,  
[228.](#)

Tussicula in infantibus sæpe periculosa dentitio-  
nis prodromus. [219.](#)

Tussis contumax cum orthopnoea. 101. tussi gran-  
dines exscreari *Galenus* observavit. [46.](#)

V.

Vagitus uterinus [9.](#) non est portentosus & mali  
praefagus 10. 11. sæpe felicia portendit. 12.

Valvularum in vena sine pari aut *αζύα* usus stru-  
ctura, numerus. 40. 41. [42.](#)

Venæ arteriosæ ramus tussi rejectus. [66.](#)

Venæsectiones in pleuritide summè necessariae. [21.](#)  
[22.](#) in peste noxiæ. 123. an gravidis [utiles.](#) [197.](#) ve-  
næsectio ophthalmiam tollit ipsius *Galenus* exem-  
plo. [31.](#) [32.](#) in mania utilis. [244.](#)

X §

# INDEX RERVM PRAECIP.

- Ventriculi dolor cum tumore. 105.  
 Vermiculus cerebri. *vide* cerebri.  
 Vesica in nonnullis duplex. 110.  
 Vesicæ calculus. *vide* calculus.  
 Veteres non unciarum sed librarum pondere sanguinem in phlebotomiis educebant. 197.  
 Virgineus morbus. 151.  
 Visus imbecillitas curata. 201.  
 Vnguentum pro combustione. 69. optimum. 218.  
 Urinæ suppressio ad 20. dies, 4. urina leporina furditatem tollit. 237.  
 Vvulæ casus & relaxatio. 161.

## Errata Typothetæ sic corrigenda.

Pag. 7. lin. 21. Doctōri lege Doctore. 10. 13. observam l. observassem. 37. 11. oculi vi l. oculi partem vi. 58. 3. excernitur l. extenditur. 71. 12. edulceretur l. edulcetetur. 82. 21. poricina l. porcina. 110. 2. Kiolanus l. Riolanus. 194. 10. sacculis l. sacculis. 195. ult. propulsisse l. propulisse. 199. 15. fumeret l. fumeret. 203. 21. l. in medicina supra me. 208. 21. mentem l. menssem. 211. 20. eadem l. eodem. 28. elegmatis l. eclegmatis. 211. 30. primarius l. prematurus. 231. 2. profundam. l. profundum. 232. 5. interitus l. intuitus. 247. 14. vitium l. virium. 251. 10. quinto l. quarto. 253. 13. quarto l. quinto. 258. 11. purulentâ l. purulenta. 264. 8. antiphthysum l. antiphthysicum. 265. 5. pullonum l. pullorum. 292. 16. postuler l. postulet. 26. graviotes l. graviōres.

F I N I S.



